

АКАДЕМИИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ БОТАНИКА, ФИЗИОЛОГИЯ
ВА ГЕНЕТИКАИ РАСТАНИҲО

ВБД 581.11+577.19582.739 (581)

Бо ҳуқуқи дастнавис



АБДУКАРИМЗОДА
ҚОБИЛҶОН АБДУКАРИМ

ТАЪСИРИ ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ИҚЛИМӢ БА
НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОКИМИЁӢ ВА
МАҲСУЛНОКИИ НАВӢҲОИ ОҲТОБПАРАСТ
(*Heliantus annuus* L.)

Автореферати
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои биологӣ
аз рӯи ихтисоси 1.5.12. Физиология ва биохимияи растаниҳо

Душанбе – 2026

Таҳқиқот дар Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: **Эргашев Абдуллоҷон** – доктори илмҳои биологӣ, профессори кафедраи физиологияи растаниҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ: **Мирзораҳимзода Ақобир Карим** – доктори илмҳои биологӣ, профессор, ноиби президент ва раиси Шуъбаи илмҳои биологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Давлатбек Суҳайло Худоевбек – номзади илмҳои биологӣ, дотсент декани факултети биологияи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев.


Муассисаи пешбар: Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”.

Ҳимоя «17» сентябри соли 2026, соати “13:00” дар ҷаласаи шурои диссертатсионӣ 6D. КОА-038 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баргузор мегардад. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, бинои 16.Е-mail: tnu@mail.tj homidov-h@mail.ru

Бо муҳтавои диссертатсия ва автореферати дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонаи 734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ -17 ва дар сомонаи интернетии www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Авореферат дар санаи «___» _____ соли 2026 равои карда шуд.

Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои биологӣ, дотсент

 **Ҳамидзода Х.Н.**

Муқаддима

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Шароити иқлимии минтақаҳои парвариш, инчунин тафовутҳои навъии офтобпараст таъсири назаррас ба раванди ташаккул ва рушди киштзори ин зироат мерасонанд. Дар ин замина, яке аз омилҳои муҳимтарин, ки сатҳи ҳосилнокиро муайян месозад, таносуби унсурҳои майдони кишт ва андозаи сатҳи баргҳои растанӣ ба ҳисоб меравад.

Реҷаи радиатсионӣ дар минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон, нисбат ба дигар вилоятҳои мамлакат, дорои як қатор хусусиятҳои махсус мебошад. Дар ин ҷо тавозуни радиатсионӣ ҳамеша мусбат буда, ба арзишҳои баландтарин мерасад. Ба ҳисоби миёна, ҳаҷми солонаи энергияи офтобӣ, ки ба сатҳи замин мерасад, дар водии Вахш 159 ккал/см^2 , дар водии Ҳисор -151 ккал/см^2 ва дар минтақаи Кӯлоб -155 ккал/см^2 -ро ташкил медиҳад. Аз ин миқдор радиатсияи фотосинтетикӣ Ҷафол (РФФ) мутаносибан ба 71,4; 72,5 ва 75,4 ккал/см^2 баробар мебошад.

«Масоили ташаккули массаи биологӣи узвҳои рӯзаминии растаниҳо ва сатҳи ассимилятсионӣ дар аксари зироатҳои кишоварзӣ ба таври кофӣ омӯхта шудаанд» [6, 9]. «Бо вучуди ин, механизмҳои физиологӣи ҳосилхезии биологӣи офтобпараст дар Тоҷикистон, махсусан навъҳои рағандиҳандаи баландҳосили он, ҳанӯз ҳам кам таҳқиқ шудаанд. Дар ҳудуди мамлакат ин зироатро бештар дар минтақаҳои дорои захираҳои хуби гармӣ ҳамчун кишти тақрорӣ барои силос истифода мебаранд. Дар натиҷа, то 200–300 сентнер/га массаи сабз ва то 30 сентнер/га дона ҳосил ба даст оварда мешавад» [13].

Ғайр аз аҳамияти ғизоӣ, офтобпараст барои Тоҷикистон ҳамчун зироати рағанӣ низ нақши муҳиме дорад, зеро рағани бадастомадаи он аз сифати баланди ғизоӣ бархурдор аст.

Дарачаи коркарди илмӣи проблемаи мавриди омӯзиш.

Корҳои таҳқиқотии олимони Норв М., Тошов Н. ва дигарон нишон медиҳанд, ки дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ навъҳои офтобпараст ҳосили гуногун медиҳанд ва миқдор ва сифати раған дар онҳо тағйирпазир мебошанд. Заминаи муҳими баланд бардоштани ҳосили умумӣ ва ҷамъоварии дони офтобпараст аз татбиқи навъ ва дурағаҳои сермахсулу серравғани ин зироат дар истеҳсолот ба шумор меравад. Мубрам будани ин масъала мақсад ва вазифаи таҳқиқотҳоро муайян менамояд. Чунки рағандҳои физиологӣи биокимиёвӣ навъҳои серравғани офтобпараст вобаста аз хусусиятҳои иқлимӣ минтақаи парвариши он дар Тоҷикистон пурра омӯхта нашудааст.

Аммо ҳангоми татбиқи навъҳои нав реаксияи ҷавобии онҳо ба омилҳои гуногуни экологӣ (баландӣ аз сатҳи баҳр, ҳарорати ҳаво, намнокии ҳаво ва ҳок ва ғайраҳо), на ҳама вақт ба эътибор гирифта мешавад. Навъҳои дар як муҳити экологӣи мӯътадил

нашъунамокунанда, имкониятҳои иқтидори маҳсулнокии онҳо дар дигар шароити иқлимӣ кам мешаванд ва аз ин сабаб хароҷотҳои парвариш пурра ҷуброн карда намешаванд. Гарчанде, ки дар соҳаи зикршуда то андозае таҷрибаи илмӣ ва амалӣ ба даст оварда шудааст, ҳоло як қатор мушкилотҳои мавҷуданд, ки ба пуррагӣ омухта нашудаанд. Ба қатори онҳо чунин мушкилотҳо, ба монанди қонунмандии таъсири омилҳои гуногуни табиӣ-иқлимӣ ва агротехникӣ ба хусусиятҳои морфофизиологӣ, гузариши равандҳои физиологӣ ва такиботи биохимиявӣ, ки сатҳи ҳосилнокии навъҳои рағандиҳандаи офтобпарастро дар шароити шароитҳои гуногуни Тоҷикистон муайян мекунад, ба таври пурра омӯхта нашудаанд.

Аз ин лиҳоз, омӯзиши таъсири омилҳои экологӣ (минтақаҳои иқлимӣ) ба рағандҳои физиологӣ ва маҳсулнокии навъҳои рағандиҳандаи офтобпараст хеле муҳим мебошад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоихаҳо), мавзуҳои илмӣ.

Таҳқиқоти мазкур бо барномаҳои давлатӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи биология ва нигоҳдории гуногунии биологӣ робитаи мустақим дорад. Аз ҷумла, мавзуи пажӯҳиш ба стратегияи рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то солҳои 2030 ин таъмин намудани беҳатарию озуварӣ ва дастарию аҳоли бо маводи ғизоӣ мутобиқат мекунад. Илова бар ин, таҳқиқот дар доираи нақшаи мавзуҳои илмӣ-таҳқиқотии Озмоишгоҳи биохимияи фотосинтези Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ амалӣ гардидааст. Он тибқи мавзуи илмӣ-таҳқиқотии “Омӯзиши мубодилаи фотосинтетикӣ С3-дар шароитҳои гуногуни экологӣ”, (рақами давлатии мавзӯ (№ БД 000000868), иҷро гардида, ба омӯзиши хусусиятҳои физиологӣ биохимиявӣ ва маҳсулнокии навъҳои офтобпараст равона гардидааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот аз омӯзиши ҷараёни мубодилаи об, маҳсулнокии фотосинтетикӣ ва ташаккулёбии анбӯҳи биологии умумии растанӣ ва гирифтани ҳосили баланди хоҷагидории навъҳои серравғани зироати офтобпараст дар минтақаҳои гуногуни экологии Ҷануби Тоҷикистон ба шумор меравад.

Вазифаҳои таҳқиқот:

1. Омӯзиши ҷараёни рушд ва нумӯи навъҳои серравғани офтобпараст;

2. Омӯзиши ҷараёни фаъолияти фотосинтетикӣ киштзор (иқтидори фотосинтетикӣ, маҳсулнокии ҳолиси фотосинтез ва масоҳати барг);

3. Омӯзиши динамикаи рӯзона ва мавсимии нишондиҳандаҳои мубодилаи обии растанӣ (дараҷаи обнокии бофтаҳо, шиддатнокии оббухоркунӣ, қобилияти обнигоҳдории баргҳо, танқисии об, фишори осмотикӣ ва консентратсияи шираи ҳуҷайра);

4. Омӯзиши чараёни маҳсулнокии умумии биологӣ ва хоҷагидорӣи растанӣ;

Объекти таҳқиқот. Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ навъҳои барои шароити Тоҷикистон тавсияшудаи офтобпарастӣ рағанокиашон баланди аз Федератсияи Россия овардашуда: “ВНИИМК-8883”, “Саратовӣ-85”, “Дони калондона” истифода шуданд.

Мавзӯи (предмет) таҳқиқот. Таъсири шароитҳои гуногуни иқлимӣ ба нишондиҳандаҳои физиологӣ биокимиёвӣ ва маҳсулнокии навъҳои офтобпараст (*Heliantus annuus* L.) шароитҳои гуногуни иқлимӣ водии Вахш, Ҳисор ва минтақаи қуҳсори Кӯлоб иборат мебошад.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқот.

-Дар шароити минтақаҳои гуногуни экологии Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ бори нахуст хусусиятҳои физиологӣ биокимиёвӣ навъҳои рағандиҳандаи офтобпараст таҳқиқ шудааст.

-Дар таҳқиқот таъсири шароити минтақаҳои иқлимӣ, хусусан речаи ҳарорат ва намнокии ҳаво ба рағандҳои маҳсулноки ва фаъолияти фотосинтезики растанӣ вобаста аз хусусиятҳои ҳосили навъҳои офтобпараст тасниф ва илман асоснок карда шудаанд.

-Нақши омилҳои иқлимӣ дар ташаккули ҳосилнокии биологӣ ва хоҷагидорӣ навъҳои рағандиҳандаи офтобпараст зоҳир карда шудааст.

-Маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба таъсири омилҳои иқлимӣ ба маҳсулнокии биологӣ ва сифати дон ҷойгиркунии мақсадноки навъҳои рағандиҳандаи офтобпарастро дар минтақаҳои гуногуни дорои захираҳои зиёди ҳарорати мусбӣ ва намнокии кофии ҳаворо илман исбот менамоянд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои омӯзиши усулҳои самараноки парвариш ва коркарди тухми офтобпарастро дар шароитҳои гуногуни иқлимӣ Тоҷикистони Ҷанубӣ татбиқ намудан мумкин аст. Маводҳои ҷамъоваришуда ва таҳлилгардида метавонанд ҳамчун заминаи илмӣ барои таҳияи тавсияҳои амалӣ барои такмил додани усулҳои парвариши зироатҳои кишоварзӣ дар шароити гуногуни иқлимӣ истифода бурда шаванд. Истифодаи чунин маълумотҳо имконият медиҳад, ки бо дарназардошти хусусиятҳои омилҳои табиӣ минтақаҳои гуногуни мамлакат, самаранокии чораҳои агротехникӣ баланд бардошта шавад, ки ин ба рушди устувор ва ҳосилнокии растаниҳо мусоидат менамояд.

Аз таҳқиқотҳои гузаронидашуда маълум шуд, ки ҳосилнокии намунаҳои офтобпараст дар минтақаҳои парвариш гуногун буданд. Дар минтақаи захираи термикӣ зиёд ва намнокии нисбиаш нисбатан пастӣ иқлими ҷануби Тоҷикистон (водии Вахш) кишти навъҳои серрағани офтобпараст («ВНИИМК-8883», «Саратовӣ-85») ҳамчун зироати асосӣ (дар кишти баҳорӣ) тавсия карда мешавад. Ин барои ба

даст овардани 2,5-3,0 т/га ҳосили дони офтобпараст мусоидат менамояд.

Дар минтақаҳои захираи термикиашон кам ва намнокии нисбии ҳаво нисбатан баланди Ҷануби Тоҷикистон (ноҳияи Мӯъминобод ва минтақаҳои ба он ҳамшафат), хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооператив ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ кишти навъҳои рағфандиҳандаи офтобпараст («Донии калондона» ва ғайра) ҳамчун зироати асосӣ (дар кишти баҳорӣ) тавсия дода мешавад. Ин барои ба даст овардани 3,0-3,5 т/га ҳосили дон имконият медиҳад.

Нуктаҳои ба ҷимоя пешниҳодшаванда:

1. Омӯзиши маҳсулнокии биологӣ ва хоҷагидорӣ зироати офтобпараст вобаста аз таъсири омилҳои иқлимӣ минтақаи парвариш.

2. Муайян намудани маҳсулнокии навъҳои серравғани офтобпараст вобаста аз дараҷаи нишондиҳандаҳои морфобиологӣ ва биокимиявӣ;

3. Таҳқиқи нишондиҳандаҳои мубодилаи оби баргҳои зироати офтобпараст дар баробари фаъолияти фотосинтезикии киштзор, инчунин маҳсулнокии умумӣ ва хоҷагидорӣ навъҳои гуногуни офтобпараст дар давраи нашъунамои зироати офтобпараст вобаста аз фарқияти байни навъҳо аз таъсири зохиршавии онҳо аз омилҳои иқлимӣ минтақаи парвариш.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Асоснокӣ ва эътимоднокии ҳар як натиҷаи бадастоварда бо коркарди миқдори зиёди маводҳои таҷрибавӣ ба исбот расонда шудааст. Таҳқиқот дар мӯҳлати 3 сол дар се минтақаи водии Вахш: ноҳияи А. Ҷомӣ - қитъаи Мушкурот, водии Ҳисор - қитъаи таҷрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растанӣ АМИТ, минтақаи кӯҳсори Кӯлоб - ноҳияи Мӯъминобод- қитъаи Навбаҳор, гузаронида шуданд.

Таҳқиқот дар асоси равишҳои васеи методологӣ, ки он ҳам усулҳои классикӣ анъанавӣ ва ҳам методҳои муосири таҳлили илмиро дар бар мегирад, гузаронида шуданд. Маълумотҳои дар раванди таҳқиқоти илмӣ бадастомада бо дар асоси тафсириҳои математикӣ ҳамаҷониба коркард гардида, он ба таъмин намудани объективият ва эътимоднокии тафсири натиҷаҳо мусоидат менамояд. Баррасии ҳулосаҳои таҳқиқот бо дарназардошти таҳлили муқоисавии маводи қаблан ҷамъшудаи илмӣ, ки дар адабиёти махсуси вобаста ба ин масъала инъикос ёфтааст, сурат гирифт. Ҳулосаҳои калидӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастомада дар маърузаҳо зимни конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявӣ байналхалқӣ ифода гардида, ҳамчунин дар шакли мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда нашр шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 1.5.12. физиология ва биохимияи растанӣ бандҳои 5,9,11 мутобиқат мекунад: Таҳқиқоти

гузаронидашуда ба илми биология, махсусан, ба бахшҳои физиологияи растаниҳо ва биохимия мансуб мебошад. Соҳаи таҳқиқоти физиология ва биохимияи растаниҳо мебошад.

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 1.5.12. Физиология ва биохимияи растаниҳо мутобикат мекунад.

Банди 5. Фотосинтез. Рушноӣ ҳамчун омилҳои танзими афзоиш ва инкишофи растаниҳо. Пигментҳо, таҳқиқоти таркиб ва нақши амалкардии онҳо. Асосҳои физиологӣ - биохимиявии фотосинтез.

-Маҳсулнокии ҳолиси фотосинтези навъҳои офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимӣ – зербоби 3.4., масоҳати барг ва иқтидори фотосинтезикии киштзори навъҳои офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимӣ-зербоби 3.5., маҳсулнокии биологӣ ва хоҷагидорӣи навъҳои офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлимӣ зербоби 3.6.

Банди 9. Физиологияи мубодилаи об ва речаи обии растаниҳо. Сохтор ва фаъолияти аквапоринҳо.

-зербоби 3.1. Мубодилаи об дар навъҳои растаниҳои офтобпараст омӯхта шуд -зербоби 3.2., танқисии ҳақиқии об ва қобилияти обнигоҳдорӣи барги навъҳои офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлимӣ нишон дода шудааст -зербоби 3.2.2.

Банди 11. Асосҳои физиологӣ -биохимиявии муқовимати растаниҳо ба шароити ногувори муҳити беруна. Физиология ва биохимияи мутобиктавии растаниҳо ба шароити ногувор. Вокунӣи растаниҳо ба ксенобиотикҳо, нанозарраҳо ва таҳти партави радиатсияи муҳити зист.

-Ғизлатнокии шираи ҳуҷайра ва фишори осмотикии он дар барги навъҳои офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимӣ- зербоби 3.2.3.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.

Довталаби кори диссертатсионӣ дар ҳамаи марҳилаҳои иҷрои таҳқиқоти илмӣ фаъолона ва бевосита иштирок намудааст. Фаъолияти ӯ доираи васеи вазифаҳо: аз банизоддорӣи раванди таҳқиқот, таҳлил ва баррасии интиқодии адабиёти махсуси илмӣ то коркарди маълумоти бадастомада, тафсиру маънидод намудани онҳо ва таҳияи хулосаҳои асоснок дар бар мегирад. Нақши назарраси муаллиф ҳамчунин дар таҳия ва сохторбандии маводҳои илмӣ мутобик ба мавзӯи диссертатсия, инчунин дар таҳияи мустақилона ва омода сохтани матни кори илмӣ ифода ёфтааст. Қисми амалӣ-таҷрибавии таҳқиқот ҳам дар шароити таҷрибаҳои саҳроӣ ва ҳам дар озмоишгоҳ амалӣ карда шудааст. Ҳамаи марҳилаҳои асосии таҷрибаҳо бевосита аз ҷониби муаллиф бо дастгирии машваратии роҳбари илмӣ иҷро гардидаанд. Саҳми муҳаққиқ дар ташкилу баргузори ва таҳлилу баррасии илмӣ натиҷаҳои таҷрибаҳои саҳроӣ ва озмоишӣ ҳалқунанда буда, зиёда аз 95 ғоизи ҳаҷми умумии кори иҷрошуда ро ташкил медиҳад.

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ, дар як қатор чорабиниҳои илмӣ-амалӣ, аз он ҷумла: дар форуми байналмилалӣ, баҳшида ба 120-солагии академик Н. И. Вавилов (Душанбе, 2007), конференсияи байналмилалӣ илмӣ таҳти унвони «Танзими равандҳои рушд, инкишоф ва ташаккули ҳосилнокии растанӣҳо» (Минск, 2007), конференсияи ҷумҳуриявӣ баҳшида ба 75-солагии академик Ю.С.Носиров (Душанбе, 2008), конференсияи ҷумҳуриявӣ, баҳшида ба 100-солагии профессор О.Шукуров (Душанбе, 2008), конференсияҳои илмӣ ҳамасолаи апрелии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ (солҳои 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025) бо маърузаҳо иброз ёфтаанд.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 14 мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла 9-то дар маҷаллаҳои ба номгӯи маҷаллаҳои бонуфузи илмӣ воридшуда, ки мувофиқи талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, ба нашр расонда шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 155 саҳифаи матни ҷопи компютерӣ ифода гардида, тибқи талаботи тартиб ва услуби илмӣ сохторбандӣ шудааст: қор аз қор боби асосӣ иборат буда, дар дохили онҳо 21 зерқаб ҷудо карда шудааст, ки пайдарҳамӣ ва мантиқии пешниҳоди маводро таъмин менамояд. Барои возеҳият ва тасдиқи натиҷаҳо муаллиф аз 24 ҷадвал ва 11 маводи иловагии тасвирӣ (расмҳо) истифода бурдааст. Илова бар ин, ба матни диссертатсия мулоҳизаҳо ва баҳсҳо, як замима ва хулосаи ниҳой дохил карда шудаанд. Феҳристи адабиёт 154 манбаъро дар бар мегирад, ки аз онҳо 55 адад ба осори муҳаққиқони хориҷӣ тааллуқ доранд, ки ин густариши мавод ва хусусияти байналмилалӣ таҳлили анҷомдодаро нишон медиҳад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар боби 1 тавсифи мухтасари адабиёти илмӣ доир ба мавзуи рисола дода шудааст. Дараҷаи таҳқиқгаштаи мавзӯ дар шароитҳои хокию иқлимии мамлакатҳои ИДМ ва дигар мамлакатҳои хориҷи кишвар таҳлил карда шудааст. Оид ба таъсири омилҳои табиӣ ва абӣ, ба монанди ҳарорат ва намнокии ҳаво, сатҳи таъминоти обӣ ва маҳсулнокии биологӣ хоҷагидорӣ навъҳои офтобпараст диққати махсус дода шудааст. Хусусан, маъсалаҳои таъсири омилҳои иқлимӣ минтақаҳои кишти офтобпараст ба нишондиҳандаҳои миқдории сифатӣ навъҳои он таҳлили ҳаматарафа ёфтаанд. Инчунин маълумотҳо доир ба кишти навъҳои офтобпараст ҳамчун зироати пураириши ҳуҷра (равғандиҳанда), ҳуҷраи қорво, ки дар кишти асосӣ, тақрирӣ, омехта истифода мешавад, пешниҳод шудааст.

«Баъзе маълумотҳо доир ба масъалаҳои пайдоиш, панҷшавӣ, захираи растанӣ ва хусусиятҳои физиологияи биокимиёвии офтобпараст чамъ оварда шудааст» [3, 10, 16, 19].

Таҷрибаҳои саҳроӣ дар 3 минтақаи иқлимии Тоҷикистони Ҷанубӣ гузаронида шудааст: водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ, қитъаи Мушкурот, 350м баланд аз сатҳи баҳр), водии Ҳисор (қитъаи таҷрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АМИТ, 834 м баланд аз сатҳи баҳр), минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯминобод, қитъаи Навбаҳор, 1680 м баланд аз сатҳи баҳр).

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ навъҳои барои шароити Тоҷикистон тавсияшудаи офтобпарастии равшанокиашон баланди аз Федератсияи Россия овардашуда: “ВНИИМК-8883”, “Саратовӣ-85”, “Донии донкалон” истифода шудаанд.

Миқдори умумии об дар барг тибқи усули вазнии дар термостат хушк намудан ва шиддатнокии оббухоркунӣ бо усули пешниҳоднамудаи Л.А. Иванов ва дигарон (1950), қобилияти обнигоҳдории баргҳо аз рӯйи усули А.А.Ничипорович (1961), танқисии ҳақиқии об аз рӯйи усули Чатский ва Славик (1960) бо модификатсияи нави Т.К.Горишина ва А.Ш. Самсонова (1966) чен карда шуд. Концентрацияи шираи ҳуҷайра ва фишори осмотикии онро бо истифодаи дастгоҳи рефрактометр РПЛ-1 (Гусев, 1981), нишондиҳандаҳои маҳсулнокии фотосинтез аз рӯйи усули А.А. Ничипорович ва дигарон (1961), равшаннокии дон тибқи тавсияи Б.П. Плешков (1985), таркиби кимиёвии унсурҳои мағзи дони офтобпараст мувофиқи методи Морда шуда (1984) муайян карда шуданд. Коркарди математикии маълумотҳои таҳқиқот бо усули Б.А. Доспехов (1985) гузаронида шуданд.

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Яке аз омилҳои муайянкунандаи дараҷаи маҳсулнокии растанӣ равандҳои рушду нумӯ ба шумор меравад.

Маълум аст, ки омилҳои асосии бамеъёрдарорандаи равандҳои рушду нумӯи растанӣ, хусусан офтобпараст, аз дараҷаи ба гармӣ ва намӣ таъмин будани кишзор ба ҳисоб меравад. Чунки дар растании офтобпараст рушди босуръати поя ва афзудани сатҳи ассимилятсионии растанӣ асосан дар давраи ташаккулияти узвҳои генеративӣ (тӯдагул) ба амал меояд. Аз гармӣ ва намӣ таъмин нашудани растанӣ дар ин давра ба суръати рушди пояи асосӣ ва ташаккулияти масоҳати барг таъсири манфӣ мерасонад, ки он дар тағйирёбии маҳсулнокии растанӣ зоҳир мешавад. Омӯзиши алоқамандии талаботи офтобпараст ба чунин омилҳои асосӣ, ба монанди гармӣ ва намӣ, имконияти медиҳад, ки чараҳои рушду нумӯи растанӣ дар шароити мушаххаси ҳокию иқлимӣ парвариш пешгӯӣ ва истифода бурда шавад. Дар байни омилҳои асосии фаъолияти ҳаётии растанӣ маълум аст, ки вазифаи калидӣ ба дараҷаи речаи равшани ва обии муҳит тааллуқ дорад.

Мувофиқи маълумотҳои натиҷаҳои бодуҳавошиносӣ «омилҳои иқлимӣ ба сабаби растанӣҳои мазрӯӣ таъсиркунанда дар ҳудуди Тоҷикистон рӯзи гармӣ ва обии давраи нашеству растанӣ ба шумор меравад. Давраи нашеству растанӣ фаъоли қисми зиёди зироатҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла офтобпараст, дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзи аз 11°C боло (ҳарорати фойданок) мегузарад, ки ин давра дар қисми ҷануби Тоҷикистон аз моҳи март сар мешавад. Миқдори рӯзҳои ҳарораташ аз 10°C зиёд дар қисми ҷануби ҷумҳурӣ 105-115 рӯзро ташкил медиҳад. Ҳосили ҷамъи ҳарорати самаранок дар давраи нашеству растанӣ (апрел-май) дар қисми ҷануб ба 1550 ҳарорат мерасад. Солҳои алоҳида ҳосили ҷамъи ҳарорат то андозаи муайян тағйир меёбад» [1].

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки шароити иқлимӣ минтақаи парвариш ба рушду нумӯ ва маҳсулнокии нашеству таҳқиқшавандаи офтобпараст таъсири назаррас мерасонанд.

Ҷадвали 1. - Ҷараёни сабаби пояи асосии (см) растанӣ офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимӣ ҷануби Тоҷикистон

Навъ	Давраи нашеству растанӣ, рӯзҳо							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушкурот)								
«ВНИИМК-8883»	9,7	18,6	39,4	88,7	136,2	158,8	185,4	186,5
«Саратовӣ-85»	10,4	20,5	42,3	92,3	141,5	167,2	191,9	192,4
«Дони калондона»	11,5	22,8	45,2	98,5	147,3	179,1	215,0	213,1
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибаии ИБФ ва ГР)								
«ВНИИМК-8883»	8,8	15,2	33,6	79,5	230,0	177,4	198,6	201,7
«Саратовӣ-85»	9,1	17,3	35,5	82,7	132,8	180,9	206,8	209,6
«Дони калондона»	9,4	18,7	39,4	88,8	138,0	185,6	236,8	239,8
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯминобод, қитъаи Навбаҳор)								
«ВНИИМК-8883»	8,3	14,0	30,5	72,7	122,5	181,2	200,5	206,6
«Саратовӣ-85»	8,9	15,2	31,4	78,1	125,8	186,5	220,1	222,3
«Дони калондона»	9,2	16,6	34,6	84,0	129,9	190,3	249,2	255,6
ФМН (НСР)=0.05; М%=2.8	0,4	0,8	1,4	3,2	4,1	4,5	4,6	5,5

Суръати рушди пояи асосӣ дар минтақаи ҳарорати ҳавояш ниҳоят баланди (зиёда аз 38-41°C) водии Вахш дар давраҳои барвақтии нашеству растанӣ, нисбат ба минтақаи дараҷаи термикаш мӯътадил (ноҳияи Мӯминобод) нисбатан баландтар буд. Дар баробари ин баландии ҳадди аксари пояи асосии растанӣ нашеству офтобпараст дар шароити водии Вахш то ба 1,8-2,0 м расидааст, яъне нисбат ба минтақаҳои шароити иқлимашон нисбатан мӯътадил то 6-9% камтар буд (ҷадвали 1).

Дар шароити водии Вахш суръати рушду нашеству растанӣ офтобпараст баланд буда, давраи пурра пухта расидани дон, пеш аз ҳама, дар навети «ВНИИМК-8883» сар шудааст. Давраи пухтарасии дони навети «Саратовӣ-85» ва навети «Дони донакалон» 4-5 рӯз дертар ба назар расид.

Аммо донҳои ин навъҳои омӯхташуда дар шароити водии Ҳисор, нисбат ба шароити водии Вахш, 3-4 рӯз дертар пухта расиданд. Дар шароити минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб давраи пухта расидани дони офтобпараст, нисбат ба навъи “Донии калондона” пештар ба амал омад, аммо дар навъи офтобпарастии сарравғани “ВНИИМК-8883” бошад, 5-6 рӯз дертар ба назар расид ва дар ин шароит навъи “Саратовӣ-85” ҳолати мобайниро ишғол намуд.

Мубодилаи оби растании навъҳои офтобпараст

Омӯзиши мубодилаи оби навъҳои мухталифи офтобпараст дар шароитҳои гуногуни парвариш барои ҳаматарафа омӯхтани равандҳои дар растанӣ гузаранда зарур мебошад, зеро мо бояд имконияти идора намудани раванди маҳсулнокии растаниро соҳиб бошем ва саҳми ҳар як омили экологиро дар ташаккулёбии ҳосили биологӣ ва хоҷагидорӣ растанӣ баҳогузори карда тавонем.

Ҷадвали 2. - Миқдори об дар таркиби барги навъҳои офтобпараст

Навъ	Давраи наъшунамо	Миқдори об, бо ҳисоби % -и маводи хушк			
		Умумӣ	озод	пайваст	таносуби обҳои пайваст/озод
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушкурӯт)					
«ВНИИМК-8883»	Шонабандӣ	77.1	33.0	44.1	1.34
	Гулкунӣ	76.2	32.0	43.2	1.35
«Саратовӣ-85»	Шонабандӣ	78.5	34.3	44.2	1.30
	Гулкунӣ	75.4	32.2	43.2	1.34
«Донии калондона»	Шонабандӣ	78.8	32.6	46.3	1.42
	Гулкунӣ	76.8	31.1	44.7	1.46
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)					
«ВНИИМК-8883»	Шонабандӣ	78.8	34.2	44.6	1.30
	Гулкунӣ	77.9	33.5	44.4	1.32
«Саратовӣ-85»	Шонабандӣ	79.8	35.2	44.6	1.27
	Гулкунӣ	77.5	32.4	45.1	1.39
«Донии калондона»	Шонабандӣ	79.6	33.5	46.1	1.28
	Гулкунӣ	76.4	31.8	44.6	1.40
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)					
«ВНИИМК-8883»	Шонабандӣ	79.2	34.1	44.1	1.29
	Гулкунӣ	78.0	33.2	44.8	1.35
«Саратовӣ-85»	Шонабандӣ	79.2	33.9	45.3	1.34
	Гулкунӣ	76.8	32.6	44.2	1.35
«Донии калондона»	Шонабандӣ	79.9	34.6	45.3	1.31
	Гулкунӣ	76.8	32.5	44.3	1.36

Дар баробари ин талаботи умумӣ ба об ва равандҳои истифодаи он аз шароити сабзиши растанӣ вобастагӣ дорад. Аммо маълумот оид ба речаи оби навъҳои офтобпараст дар шароити минтақаҳои гуногуни иқлимии Тоҷикистон қариб вучуд надорад.

Аз ин лиҳоз, мо хусусияти мубодилаи оби навъҳои офтобпарастро дар шароитҳои гуногуни агроиқлимии ҷануби Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор додем.

Миқдори об дар таркиби барги навъҳои гуногуни офтобпараст

Маълумотҳои ҷадвали 2 нишон медиҳанд, ки таносуби оби пайваст бо оби озоди навъҳои омӯхташуда дар минтақаҳои парвариши офтобпараст дар ҳудуди 1.30-1.46% қарор дорад.

Мушоҳида кардан мумкин аст, ки нисбат ба давраи шонабандӣ дар давраи гулкунӣ растани оғтобпараст таносуби номбаршуда хусусияти зиёдшавиро дорад (0.02-0.13%).

Қобилияти обнокии камтарини барг дар навъи “ВНИИМК-8883” – 76.2-79.2%, дар навъи “Саратовӣ-85” -75.4-79.2% ва дар навъи “Донии калондона” бошад – 76.8-79.8%-ро ташкил додааст.

Шиддатнокии оббухоркунӣ. Омӯзиши шиддатнокии оббухоркунии навъҳои оғтобпараст дар давраи нашъунамо дар шароити гуногуни иқлимӣ аз нуқтаи назари таъсири омилҳои экологӣ ба раванди табодули об ва муайян намудани самаранокии истифодабарии намай барои ҳосил намудани анбӯҳи органикӣ аҳамияти калон дорад.

Чи тавре ки аз маълумотҳои ҷадвали 3 аён аст, шиддатнокии оббухоркунии баргҳои навъҳои омӯхташудаи оғтобпараст ниҳоят баланд буд (аз 0.62 то 3.14 г/г вазни тар-соат). Чунин фарқияти калон аз рӯи хусусияти иқлимии минтақаи парвариш муайян карда мешавад. Дар шароити иқлими гарми водии Вахш дар ҳамаи давраҳои таҳқиқотӣ шиддатнокии оббухоркунӣ нисбатан баланд буд. Дар минтақаи нисбатан мӯътадил (ноҳияи Мӯъминобод) шиддатнокии оббухоркунии баргҳо то андозае паст буд ва ин пастравӣ, хусусан ҳангоми соатҳои нисфирӯзӣ ва баъди нисфирӯзӣ, ба назар мерасад. Шиддатнокии оббухоркунии баргҳо дар шароити водии Ҳисор, нисбат ба водии Вахш, ҳангоми субҳгоҳон дорои фарқияти ночиз буд, аммо баъди нисфирӯзӣ (соати 14) ин қимат дар шароити водии Ҳисор ва минтақаи кӯҳии Кӯлоб нисбатан паст рафтанд. Дар баробари ин шиддатнокии оббухоркунии навъҳои оғтобпараст дар ҳамаи минтақаҳои парвариш бо баъзе фарқиятҳои байни навъҳо ба назар мерасад. Навъи “ВНИИМК-8883” дар тамоми минтақаҳои парвариш дорои шиддатнокии баланди оббухоркунӣ буд, аммо навъи “Донии калондона”, баръакс шиддатнокии пастии оббухоркунӣ дошт. Навъи “Саратовӣ-85” ваъзи мобайниро ишғол намулдаст.

Ҷадвали 3.- Рафти рӯзонаи шиддатнокии оббухоркунии барги навъҳои оғтобпараст дар минтақаҳои гуногун дар давраи шонабандии растаниҳо (г/г вазни тар-соат)

Навъ	Вақти мушоҳидаҳо					
	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	Қимати миёнаи рӯзона
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушкурот)						
«ВНИИМК-8883»	0.86	2.92	3.12	3.10	2.82	2.56
«Саратовӣ-85»	0.78	2.81	2.71	2.63	2.38	2.26
«Донии калондона»	0.84	2.50	2.56	2.41	2.34	2.13
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибаии ИБФ ва ГР)						
«ВНИИМК-8883»	0.88	2.46	3.11	2.35	2.41	2.24
«Саратовӣ-85»	0.78	2.21	2.42	2.08	2.23	1.94
«Донии калондона»	0.76	2.16	2.40	1.92	2.22	1.89
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)						
«ВНИИМК-8883»	0.87	1.41	1.79	1.58	1.04	1.34
«Саратовӣ-85»	0.55	0.83	1.63	1.42	0.83	1.05
«Донии калондона»	0.60	1.15	1.45	1.23	0.85	1.06
M%=2,5; НСР ₀₅ (ФМН _{0.5})=0,06						

Танқисии ҳақиқии оби барг. Омӯзиши ҷараёни рӯзонаи танқисии ҳақиқии об дар барги офтобпараст дар давраи шонабандии растанӣ (ҷадвали 4) нишон дод, ки хусусиятҳои иқлимии минтақаи парвариш ба нишондиҳандаи мубодилаи об таъсири назаррас мерасонад. Дар шароити водии Вахш дараҷаи танқисии об дар ҳудуди 10-20%, водии Ҳисор - 9-19% ва дар ноҳияи Мӯъминобод 9-18%-ро ташкил намудааст.

Ҷадвали 4. - Ҷараёни рӯзонаи танқисии ҳақиқии оби барги навъҳои офтобпараст дар шароити гуногуни парвариш дар давраи шонабандии растаниҳо (бо ҳисоби %)

Навъ	Вақти мушоҳидаҳо			
	8 ⁰⁰	12 ⁰⁰	16 ⁰⁰	Қимати миёнаи рӯзона
Водии Вахш (ноҳияи А.Чомӣ қитъаи Мушқурут)				
«ВНИИМК-8883»	10.0	13.4	19.9	14.3
«Саратовӣ-85»	11.5	14.7	19.0	15.1
«Дони калондона»	12.0	16.5	20.6	16.4
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)				
«ВНИИМК-8883»	9.3	11.8	15.8	12.3
«Саратовӣ-85»	9.8	13.0	18.4	13.7
«Дони калондона»	10.5	14.7	19.5	14.9
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)				
«ВНИИМК-8883»	9.1	11.2	15.1	11.8
«Саратовӣ-85»	9.3	12.0	15.8	12.4
«Дони калондона»	10.2	13.2	17.7	13.7
M %=1.8; HCP05 = 0.34				

Дар баробари ин қайд намудан зарур аст, ки дар ҳар як минтақаи парвариш баъзе хусусиятҳои хоси растанӣ зоҳир шуд. Дар шароити водии Вахш танқисии аз ҳама бештари оби барг дар навъи “Дони калондона” (12.0-20.6%) ошкор карда шуд. Дар тамоми минтақаҳои иқлимии таҳқиқшуда қонуниятҳои умумӣ - дараҷаи пасти танқисии об ҳангоми субҳ (9.1-12.0%) ва дараҷаи баланди ҳадди аксари он (17.7-20.6%) баъди нисфирӯзӣ мушоҳида карда шуд. Аммо нисбат ба шароити иқлимии водӣҳои Вахш Ҳисор дар минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб дараҷаи танқисии оби барг нисбатан паст буд.

Қобилияти обнигоҳдорӣ баргҳо. «Қобилияти обнигоҳдорӣ баргҳо яке аз нишондиҳандаҳои муҳими тавсифкунандаи дараҷаи мутобиқшавии растанӣ ба стресси ҳароратӣ (гармӣ) ва обӣ (хушкӣ) ба шумор меравад. Дар баробари ин қобилияти обнигоҳдорӣ аз таносуби обҳои озоду пайвасти таркиби барг ва миқдори унсурҳои кимиёвии ситоплазма дар шираи ҳуҷайра вобастагӣ дорад» [8].

Қобилияти обнигоҳдорӣ барги навъҳои офтобпараст вобаста аз минтақаи иқлимӣ парвариш низ мухталиф буданд (ҷадвали 5). Суръати ҳарҷоти об дар воҳиди вақт дар навъҳои таҳқиқшудаи растаниҳои офтобпараст дар шароити водии Вахш, нисбат ба дигар

минтақаҳо, зиёдтар буда, 72-80%-ро ташкил намудааст. Ҳамаи ин фарқиятҳо тибқи минтақа асосан аз таъсири омилҳои экологӣ, яъне дар навбати аввал аз ҳарорат ва намнокии ҳаво ба амал меоянд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, фарқияти байни навъҳо дар тамоми минтақаҳои парвариш ночиз буда, дар ҳудуди 1.5-2.5%-ро ташкил менамояд.

Ҷадвали 5. - Ҷараёни рӯзонаи қобилияти обнигоҳдории барги навъҳои офтобпараст дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ дар давраи шонабандии растанӣ (бо ҳисоби %-и хароҷоти об дар муддати 1 соат)

Навъ	Вақти мушоҳида					Қимати миёнаи рӯзона
	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушқурӯт)						
«ВНИИМК-8883»	72.4	80.3	76.7	76.0	77.3	76.5
«Саратовӣ-85»	72.7	78.1	75.1	74.4	74.2	74.9
«Донии калондона»	72.1	78.5	79.1	75.5	74.6	76.0
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)						
«ВНИИМК-8883»	47.7	67.3	63.4	60.0	55.3	58.7
«Саратовӣ-85»	46.6	63.0	63.3	59.1	51.7	56.7
«Донии калондона»	48.5	64.8	65.9	60.3	54.9	58.9
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)						
«ВНИИМК-8883»	43.7	51.5	52.8	54.7	52.4	51.0
«Саратовӣ-85»	42.8	51.7	52.5	55.7	49.4	50.4
«Донии калондона»	46.4	52.6	54.5	54.6	50.9	51.8
M%=2,6; HCP ₀₅ =1,75						

Концентратсияи шираи ҳуҷайра ва фишори осмотикии он.

«Концентратсияи шираи ҳуҷайра ва фишори осмотикии он яке аз нишондиҳандаҳои тавсифкунандаи ҳолати мубодилаи оби барг ба шумор меравад ва қобилияти устуворнокии онҳо, на танҳо аз таъсири омилҳои дохилӣ, балки аз таъсири чунин омилҳои муҳит, ба монанди ҳарорат ва намнокии нисбии ҳаво ва реҷаи равшанӣ ва ғизогирии растанӣ алоқамандӣ дорад» [1].

Дар давраи шонабандии растанӣ концентратсияи шираи ҳуҷайраи (КШХ) барги навъҳои офтобпараст дар ҳудуди 10.2-11.2%, фишори осмотикӣ – 8.8-9.2 атмосфера қарор дошт, аммо дар давраи гулкунӣ бошад, аз 11.0-11.8% то ба 9.2-9.9 атмосфера расидааст (Ҷадвали 6).

Дар шароити водии Ҳисор ва минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб КШХ ва фишори осмотикӣ дар давраи шонабандии растанӣ, нисбат ба шароити водии Вахш, пасттар буд. Бинобар ин, мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар ҳамаи минтақаҳои парвариш ва давраҳои нашъунамои растанӣ КШХ ва фишори осмотикии навъи “ВНИИМК-8883” назар ба дигар навъҳои омӯхташуда баландтар буд.

Ҳамин тариқ, ҳангоми парвариши навъҳои офтобпараст дар минтақаҳои захираи ҳарорати самаранокиашон зиёд (водии Вахш), қимати шиддаткории оббухоркунии (ШО) барг, нисбат ба минтақаи шароити иқлимиаш нисбатан мӯътадил (ноҳияи Муминобод), баландтар буд. Зиёдшавии қимати ҳадди аксари ШО-и барг ва ҳудуди тағйирёбии суръати табодули об дар навъҳои равшандиҳандаи офтобпараст бо наздикшавӣ ба минтақаи захираи термикаш камтар аз қобилияти худтанзимкунии мубодилаи об дар растанӣ ва дараҷаи мутобиқшавии онҳо ба шароитҳои иқлимӣ шаҳодат медиҳад.

Ҷадвали 6. - Консентратсияи шираи ҳучайра (%) ва фишори осмотикии (атм) барги навъҳои офтобпараст дар шароити гуногуни парвариш

Навъ	Давраи шонабандӣ		Давраи гулкунӣ	
	фишори осмотикӣ, атм.	КШҲ, %	фишори осмотикӣ, атм.	КШҲ, %
Водии Вахш (ноҳияи А.Чомӣ қитъаи Мушқурӯт)				
«ВНИИМК-8883»	9,2	11,2	9,9	10,1
«Саратовӣ-85»	8,4	10,2	9,2	9,3
«Донии калондона»	8,6	10,5	9,4	9,5
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)				
«ВНИИМК-8883»	7,8	9,5	9,4	11,3
«Саратовӣ-85»	6,8	8,6	8,6	10,6
«Донии калондона»	7,5	9,1	8,8	8,5
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)				
«ВНИИМК-8883»	6,3	8,2	9,0	7,8
«Саратовӣ-85»	4,1	6,3	8,4	6,3
«Донии калондона»	4,8	6,8	8,6	6,7
НСР ₀₅ =	0,4	0,6	0,5	0,7
M%=1,6				

Дар мисоли навъҳои омӯхташудаи офтобпараст ҳулоса намудан мумкин аст, ки навъҳои дар минтақаҳои гуногун парваришёфта суръати баланди ҳароҷоти обро доштанд. Қимати нисбатан зиёдтари шиддатнокии оббухоркунии баргҳо ба соатҳои нисфирӯзӣ, яъне ба давраи таъсири бештари дараҷаи омилҳои иқлимӣ рост меояд. Ҳудуди зиёди тағйирёбии шиддатнокии оббухоркунӣ ва дигар нишондиҳандаҳои мубодилаи оби баргҳоро дар навъҳои гуногуни офтобпараст ҳамчун хусусияти хоси генотипикии растанӣ ва инчунин таъсири омилҳои иқлимӣ минтақаи парвариш фаҳмидан мумкин аст.

Фаъолияти фотосинтетикии киштзори навъҳои офтобпараст

Маълум аст, ки фаъолияти фотосинтетикии киштзори зироатҳои кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат динамикаи ҷамъшавии маводи тару хушк ва дар охир дараҷаи ҳосилро муайян менамояд. Унсурҳои асосии фаъолияти фотосинтетикӣ андозаи сатҳи ассимилятсиякунанда ва маҳсулнокии ҳолиси фотосинтез ба шумор мераванд. «Нишондиҳандаи муҳими масоҳати ассимилятсиякунандаи растанӣ масоҳати ҳадди аксар ва ҷамъулҷамъи (иқтидори фотосинтетикӣ) барги киштзор дар давоми нашъунамо ба ҳисоб меравад, ки андозаи онро, бо миқдори ҳосил ҳамбастагӣ дорад. Маҳсулнокии ҳолиси

фотосинтез дар бораи шиддатнокии ғуншавии маводи хушк дар воҳиди масоҳати барг маълумот медиҳад» [14, 10]. «Дар баробари ин фаъолияти фотосинтетикӣ вобаста аз шароитҳои иқлимию агротехникии парвариш, инчунин аз хусусиятҳои намуд ва навъи растанӣ тағйир меёбад» [21, 11].

Дар ҳар як минтақаи иқлимӣ шароити комплексии муҳити парвариш тақомул меёбад, ки он фаъолияти фотосинтетикии киштзорро муайян менамояд.

Масоҳати барг (МБ). Пас аз 50-55 рӯзи зоҳиршавии растаниҳои ҷавон, яъне дар давраи гулкунии навъҳои офтобпараст 71-81%-и МБ аз қимати пурраи ҳадди аксари он ташаккул меёбад (ҷадвали 7). Дар ин марҳила масоҳати ҳадди ақали масоҳати барг дар шароити иқлими гарм мушоҳида шудааст, аммо қимати ҳадди аксари он бошад, дар шароити минтақаи Мӯминобод, ки ҳарорати ҳавояш мӯътадил (30°C) буд, ба қайд гирифта шудааст.

Дар давраҳои минбаъдаи нашъунамо, вақте ки гулкунии сабадчаҳои офтобпараст пурра ба охир мерасанд, дар водихои Вахш ва Ҳисор суръати ташаккулёбии баргҳо суст шуданд, аммо дар шароити ноҳияи Мӯминобод бошад, баръакс, ин давра нисбатан ғафлтар гузаштааст.

Ҳангоми кишти офтобпараст дар мӯҳлатҳои барои ҳар як минтақа мӯътадил масоҳати зиёди барги растаниҳо ташаккул ёфта, онҳо нисбатан сермаҳсултар буданд. Дар шароити водии Вахш масоҳати барг дар рӯзҳои 30-юм 18-20 ҳаз. м²/га, дар водии Ҳисор – 16-17 ҳаз. м²/га, дар шароити минтақаи кӯҳии Кӯлоб – 12-14 ҳаз. м²/га-ро ташкил намудааст.

Шароитҳои гуногуни экологӣ, на танҳо ба рушди поя ва ташаккулёбии масоҳати барг, балки барои ҳосилкунӣ ва ғункунии анбӯхи биологӣ дар давоми давраи нашъунамо таъсир расонидааст.

Ҷадвали 7. - Ҷараёни ташаккулёбии масоҳати барги офтобпараст дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ (ҳаз. м²/га)

Навъ	Давраи нашъунамо, рӯзҳо							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушкурот)								
«ВНИИМК-8883»	4.7	8.5	18.3	36.4	38.8	41.0	45.4	39.2
«Саратовӣ-85»	4.9	8.6	18.8	38.0	40.0	44.1	48.6	43.6
«Донии калондона»	5.0	8.9	19.4	39.3	42.9	46.5	50.2	44.1
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)								
«ВНИИМК-8883»	3.4	5.8	15.6	32.0	39.5	43.4	50.6	41.5
«Саратовӣ-85»	3.9	6.2	15.4	33.5	42.7	49.0	54.5	45.7
«Донии калондона»	4.3	6.6	17.5	35.2	45.8	51.2	56.1	47.0
Минтақаи кӯхори Кӯлоб (ноҳияи Мӯминобод, қитъаи Навбахор)								
«ВНИИМК-8883»	2.9	5.1	12.3	30.2	40.6	45.7	52.6	48.0
«Саратовӣ-85»	3.3	5.4	13.5	32.2	44.8	50.8	57.8	52.3
«Донии калондона»	3.6	5.6	14.4	33.8	46.5	52.6	66.3	60.8
М%-3.2; НСР 0.05	0.2	0.6	1.5	2.4	1.8	2.6	2.2	1.9

Иқтидори фотосинтезикии киштзор. Маълумотҳои ҷадвали 8 нишон медиҳанд, ки ташаккулёбии иқтидори фотосинтезикии киштзор (ИФК) дар навъҳои омӯхташудаи офтобпараст дар минтақаҳои гуногуни парвариш яхела набуда, балки баъзе фарқиятҳои байни навъҳо ва тибқи минтақаи парвариш зоҳир шуданд. Дар марҳилаҳои ибтидоии рушд (растанҳои 10-20- рӯза) ин фарқият ночиз буданд. Бо мурури зиёдшавии масоҳати барг ИФК низ афзудааст. Дар шароити водии Вахш ИФК-и навъи “ВНИИМК-8883” дар давоми давраи нашъунамо нисбат ба навъҳои “Саратовӣ-85” ва “Донии калондона” камтар буд. Дар ин маврид қимати ҳадди аксари (1.81 млн.м²-рӯз) ИФК дар навъи “Саратовӣ-85” 80 рӯз пас аз баромадани майсаҳои навруста ошкор шуд.

ИФК-и навъҳои офтобпараст дар водии Ҳисор баъзе хусусиятҳои фарқкунанда доштанд. Дар офтобпарастии навъи “ВНИИМК-8883”, пас аз 50 рӯзи баромадани майсаҳо, ИФК нисбат ба шароити водии Вахш, баландтар буд. Дар баробари ин ИФК-и навъҳои “Саратовӣ-85” ва “Донии калондона” нисбат ба навъи ВНИИМК-8883, дар шароити водии Вахш, нисбатан паст буданд. Ба ин хотир фарқияти қимати ИФК-и навъҳои омӯхташудаи офтобпараст аз рӯзи 50-уми нашъунамо сар карда зиёд шуданд.

Дар шароити иқлимии нисбатан мӯътадили минтақаи кӯҳии Кӯлоб ИФК-и навъи “ВНИИМК-8883” дар тамоми давраи нашъунамо нисбат ба ИФК-и навъҳои дигари офтобпарастии дар шароити водии Ҳисор парваришшуда пасттар буданд. Бояд махсусан қайд намуд, ки ИФК-и офтобпарастии навъи “Донии калондона” дар давоми давраи нашъунамо, ҳам дар шароити иқлимии Мӯъминобод ва ҳам дар шароити водии Вахш ва Ҳисор, нисбат ба дигар навъҳо (“ВНИИМК-8883”, “Саратовӣ-85”) баландтар буданд.

Ҷадвали 8. - Иқтидори фотосинтезикии киштзори навъҳои офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлимӣ (млн.м²-рӯз)

Навъ	Давраи нашъунамо, рӯз							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушқурӯт)								
«ВНИИМК-8883»	0.32	0.48	0.50	0.76	0.87	1.05	1.29	1.38
«Саратовӣ-85»	0.36	0.50	0.71	0.88	1.38	1.49	1.56	1.74
«Донии калондона»	0.35	0.44	0.68	0.79	1.31	1.46	1.50	1.65
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)								
«ВНИИМК-8883»	0.34	0.50	0.61	0.74	1.25	1.32	1.46	1.62
«Саратовӣ-85»	0.35	0.53	0.65	0.78	1.22	1.39	1.58	1.66
«Донии калондона»	0.37	0.48	0.76	0.85	1.20	1.31	1.42	1.54
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)								
«ВНИИМК-8883»	0.30	0.46	0.54	0.70	1.38	1.47	1.54	1.56
«Саратовӣ-85»	0.34	0.51	0.63	0.75	1.24	1.42	1.61	1.68
«Донии калондона»	0.35	0.54	0.76	0.95	1.27	1.52	1.66	1.81
М%=2.5; НСР=0.5	0.03	0.04	0.07	0.05	0.12	0.13	0.12	0.14

Маҳсулнокии холиси фотосинтез. Маҳсулнокии холиси фотосинтези (МХФ) киштзори офтобпараст бо мурури гузаштани чараёнҳои рушду нумӯ мувофиқан бо зиёдшавии масоҳати барг (ҷадвали 9) меафзояд. Қимати ҳадди аксари МХФ дар рӯзи 60-70-уми баъд аз пайдо шудани майсаҳо ба назар расидааст. Дар тамоми минтақаҳои номбаршуда пастшавии МХФ дар рӯзи 80-уми пас аз пайдошави майсаҳо мушоҳида шудаанд. Дар водии Вахш қимати нисбатан зиёди МХФ дар навъи “ВНИИМК-8883” ошкор шудааст.

Дар шароити водии Ҳисор ҳавои намнок ба тағйирёбии динамикаи МХФ-и офтобпараст таъсири назаррас расонидааст. Дар давраи аввали нашеству МХФ-и навъҳои офтобпараст дар шароити водии Вахш ва Ҳисор қариб якхела буданд ва минбаъд бо зиёдшавии қимати ҳадди аксари он дар шароити водии Ҳисор дар давраи аввали гулкунӣ (дар рӯзи 70-уми баъди пайдошавии майса) ба назар мерасад.

Ҳангоми таъсири ҳарорати мӯътадил (минтақаҳои кӯҳсори Кӯлоб) дар динамикаи МХФ-и навъҳои офтобпараст, нисбат ба водии Вахш ва Ҳисор, баъзе фарқиятҳо мавҷуд буданд. Хусусан, МХФ-и паст дар 30 рӯзи баъди пайдошавии майсаҳо ошкор шуд. Қимати ҳадди аксари МХФ дар ин минтақа дертар (70-ум рӯз) ба назар расидааст. МХФ-и навъи “Донии калондона” нисбат ба дигар навъҳо дар фосилаи 40-80 рӯзи баъди пайдошавии майсаҳо баландтар буд. Дарачаи аз ҳама баланди МХФ дар ҳамин навъ дар шароити минтақаҳои кӯҳсори Кӯлоб муқаррар карда шудааст.

Ҷадвали 9.- Маҳсулнокии холиси фотосинтези навъҳои офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлимӣ (г/м²-шабонарӯз)

Давраи нашеству, рӯзҳо								
Навъ	10	20	30	40	50	60	70	80
Водии Вахш (ноҳияи А.Чомӣ қитъаи Мушкурот)								
«ВНИИМК-8883»	4.4	5.6	8.5	10.8	13.0	14.2	13.9	11.7
«Саратовӣ-85»	4.1	5.2	6.7	9.2	11.5	13.4	13.0	11.0
«Донии калондона»	4.0	4.9	6.5	8.7	11.1	12.8	12.1	10.3
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)								
«ВНИИМК-8883»	4.6	5.8	8.0	10.1	11.9	13.5	14.2	12.6
«Саратовӣ-85»	4.3	5.5	7.2	9.0	11.1	13.0	13.2	11.0
«Донии калондона»	4.2	5.2	6.8	8.4	10.6	12.2	12.5	11.5
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)								
«ВНИИМК-8883»	3.6	4.2	6.5	8.0	10.4	12.5	13.4	11.6
«Саратовӣ-85»	3.5	4.4	6.6	8.5	10.7	12.8	14.0	12.2
«Донии калондона»	3.6	4.3	6.7	8.9	11.2	13.8	14.5	13.6
M%=2.82; HCP ₀₅ =0.32	0.36	0.38	0.52	0.55	0.64	0.66	0.71	0.63

Зиёдшавии нишондиҳандаҳои унсурҳои фаъолияти фотосинтетикӣ киштзори навъҳои офтобпараст тибқи суръати нисбатан баланди рушд ва фаъолияти дарозмуддати барг, хусусан дар шароити иқлими мӯътадили минтақаи кӯҳии Кӯлоб, муайян гардид.

Маҳсулнокии биологӣ ва хоҷагидорӣ

Дар давраҳои аввали нашъунамо, ҳангоми хурд будани андозаи масоҳати сатҳи барг, ба фаъолияти баланди фотосинтетикӣ нигоҳ накарда, афзоиши шабонарӯзии маводи хушк нисбат ба воҳиди масоҳати барг нисбатан камтар буд. Бинобар ин, омили маҳдудкунандаи зиёдшавии маводи хушк дар давраҳои аввали нашъунамои растании офтобпараст ин андозаи на он қадар зиёди масоҳати барги киштзор ба шумор меравад.

Чадвали 10. - Ҳамбастагии байни масоҳати барг, биомассаи умумӣ ва ҳосили дон дар шароити гуногуни парвариши офтобпараст

Навъ	Масоҳати барг, м ² /га	Биомассаи умумӣ, т/га	Ҳосили дон, т/га	R, ҳамбастагии байни масоҳати барг+ҳосили дон
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушқурут)				
«ВНИИМК-8883»	40.8±2.4	18.5±0.7	2.66±0.21	0.67±0.11
«Саратовӣ-85»	42.7±2.5	19.8±0.6	2.95±0.35	0.74±0.12
«Донии калондона»	44.8±2.2	20.6±0.5	3.42±0.30	0.81±0.10
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)				
«ВНИИМК-8883»	46.2±2.3	19.8±0.6	2.81±0.25	0.84±0.15
«Саратовӣ-85»	50.0±3.1	22.3±0.4	3.22±0.31	0.69±0.12
«Донии калондона»	53.4±3.5	24.6±0.7	3.80±0.28	0.85±0.13
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мўъминобод, қитъаи Навбаҳор)				
«ВНИИМК-8883»	51.4±2.4	20.9±0.5	3.26±0.31	0.82±0.11
«Саратовӣ-85»	58.5±3.2	24.7±0.6	3.72±0.25	0.66±0.09
«Донии калондона»	65.5±4.3	26.8±0.5	3.84±0.34	0.71±0.12

Ҳангоми парвариши офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимӣ баъзе фарқиятҳо дар дигар нишондиҳандаҳои маҳсулноки (вазни умумии сабадча, миқдор ва вазни умумии як дони сабадча, вазни 1000 дон, фоизи донҳои нопура) мушоҳида мешавад. Бояд қайд намуд, ки байни нишондиҳандаи “масоҳати ҳадди аксари барг” ва “ҳосили дон” ҳамбастагии мусбӣи қатъатта ($R=\pm 0.88$) зоҳир карда шудааст (чадвали 10).

Бо зиёдшавии масоҳати барг (аз 40,8 то 65,5 ҳаз.м²/га) ҳосили дони навъҳои офтобпараст аз 2,66 то 3,84 т/га афзудааст.

Қимати ҳосили хоҷагидории офтобпараст аз андозаи сабадча ва ҳам аз миқдору вазни дон дар як сабадча вобастагӣ дорад. Вазни умумии дони сабадчаи навъҳои омӯхташудаи офтобпараст аз 87,0 г (дар навъи “Саратовӣ-85”) дар шароити водии Вахш то 113,6 г (дар навъи “Донии калондона”) дар шароити минтақаҳои кӯҳсори Кӯлоб тағйир ёфтааст.

«Натиҷаҳои бадастовардаи мо нишон медиҳад, ки ба андоза ва вазни сабадчаи офтобпараст на танҳо хусусиятҳои генетикии навъ, балки омилҳои экологӣ (ҳарорати ҳаво, дарозии рӯз, дараҷаи намнокӣ ва ғайраҳо) таъсир мерасонанд» [12]. «Дар баробари он аз рӯи андоза ва вазни сабадча суръати ҷоришавии ассимилятҳо ва қобилияти

ҷазбкунии худи узви ҳосилдеҳро (сабадча) муайян намудан мумкин аст, чуноне ки он дар навъҳои гуногуни пахта муқаррар карда шуда буданд» [10].

Ҷадвали 11. - Вазни сабадча ва дони офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлими Ҷануби Тоҷикистон

Навъ	Вазни сабадча бо дон, г	Вазни сабадча бедон, г	Вазни умумии дони як сабадча, г	Вазни донҳои пурраи як сабадча, г	Вазни 1000 дона, г
Водии Вахш (ноҳияи А.Чомӣ қитъаи Мушқурӯт)					
«ВНИИМК-8883»	150.2±4.1	43.2±3.1	106.6±4.3	89.8±3.0	77.5±3.2
«Саратовӣ-85»	135.5±3.4	48.6±2.0	87.0±3.5	65.7±3.6	95.6±3.5
«Донии калондона»	141.6±4.0	46.5±3.2	93.4±3.8	70.4±3.3	144.3±4.4
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБФ ва ГР)					
«ВНИИМК-8883»	140.3±3.1	45.1±2.4	95.2±4.3	73.5±3.8	74.4±3.3
«Саратовӣ-85»	145.3±4.0	38.6±2.0	106.7±4.1	86.9±4.5	90.2±4.1
«Донии калондона»	152.1±3.3	41.3±2.5	109.8±3.6	90.1±3.5	135.1±3.4
Минтақаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор)					
«ВНИИМК-8883»	137.1±5.8	49.2±2.4	89.4±3.1	67.3±4.3	71.4±2.2
«Саратовӣ-85»	149.5±6.2	41.5±2.2	105.5±2.0	89.5±3.2	86.3±3.8
«Донии калондона»	159.6±5.1	44.6±3.2	113.6±3.2	94.6±4.1	139.6±4.6

Аз рӯи дараҷаи маҳсулнокии хоҷагидорӣ офтобпараст, яъне ҳосили дони навъҳои таҳқиқшуда дар шароити якхела ва гуногуни экологӣ аз ҳамдигар фарқ мекунад. Дар водии Вахш ҳосили нисбатан зиёди дон дар навъи “ВНИИМК-8883”, аммо дар шароити водии Ҳисор ва минтақаи кӯҳсори Кӯлоб бо маҳсулнокии баланди донаш навъи “Донии калондона” (109.8 г/растанӣ ва 113.6 г/растанӣ) фарқ мекунад. Дар навъи “ВНИИМК-8883” маҳсулнокии дон дар ин минтақаҳои иқлимӣ нисбатан паст буд.

Аз рӯи вазни умумии сабадча фарқияти байни навъҳо вобаста аз минтақаи парвариш мушоҳида шуданд. Дар шароити водии Вахш вазни сабадчаи офтобпарастии навъи “ВНИИМК-8883” бо донҳояш нисбатан зиёд буд (150,2 г), аммо дар минтақаи ҳарорати миёнаи моҳонааш паст ва намнокии ҳавояш зиёд (водии Ҳисор ва ноҳияи Мӯъминобод) вазни сабадчаи офтобпараст то 137,1 г паст шудааст (ҷадвали 11).

Дар навъи “Саратовӣ-85” ва “Донии калондона”, баръакс, дар шароити водии Вахш вазни сабадча бо донаш нисбат ба дигар минтақаҳои парвариш камтар буд.

Аз рӯи вазни умумӣ ва вазни донҳои як сабадча низ чунин қонуният ба назар мерасад. Аммо аз рӯи вазни 1000 дони офтобпараст манзараи дигар мушоҳида мешавад, яъне аз

рӯйи ин нишондиҳанда навъи “ВНИИМК-8883” нисбат ба навъҳои “Саратовӣ-85” ва “Донии донакалон” дар тамоми минтақаҳои парвариш афзалият дорад.

Чадвали 12. - Маҳсулнокии дони навъҳои офтобпараст дар шароитҳои гуногуни иқлимии Ҷануби Тоҷикистон

Навъ	Қутри сабадча, см	Миқдори умумии дон дар як сабадча, дона	Миқдори донҳои пура (бо мағз), Дона	Миқдори донҳои пуч (бемағз), дона	Ҷои (%) донҳои пура
Водии Вахш (ноҳияи А.Ҷомӣ қитъаи Мушқурӯт)					
«ВНИИМК-8883»	15.8±1.15	1388±55	1192±71	225±34	83.8
«Саратовӣ-85»	15.0±0.75	1251±37	995±46	157±29	87.7
«Донии калондона»	15.1±0.66	1063±48	883±64	169±45	84.2
Водии Ҳисор (қитъаи илмӣ-таҷрибавии ИБҶ ва ГР)					
«ВНИИМК-8883»	14.2±0.58	1314±60	1105±42	186±33	85.4
«Саратовӣ-85»	14.1±0.42	1186±39	926±55	137±26	88.5
«Донии калондона»	14.5±0.34	823±64	814±31	131±29	84.1
Минтақаи кӯҳии Қулоб (ноҳияи Муминобод, қитъаи Навбаҳор)					
«ВНИИМК-8883»	13.1±0.80	1239±41	991±63	198±32	84.1
«Саратовӣ-85»	13.9±0.65	1104±26	886±77	118±39	89.4
«Донии калондона»	14.9±0.61	919±58	767±58	140±30	84.8


Аз рӯйи қутри сабадча байни навъҳо фарқият вучуд надорад, аммо дар навъи “ВНИИМК-8883” ғангоми таъсири ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ ва моҳонаи паст, қутри сабадча низ кам шудааст. Миқдори дони офтобпарастии навъи “ВНИИМК-8883” дар як сабадча зиёдтар буд, аммо ҷои донҳои пурра дар сабадчаи навъи “Саратовӣ-85” нисбат ба навъҳои “ВНИИМК-8883” ва “Донии калондона” нисбатан бисёр буданд (ҷадвали 12). Ҷи тавре ки аён аст, маҳсулнокии растанӣ хусусияти ҳоси навъӣ дошта, дар баробари ин ба нишондиҳандаҳои он омилҳои экологии минтақаи парвариш низ таъсири назаррас мерасонад.

Ҷамин тариқ, маълумотҳои бадастомада нишон доданд, ки ғангоми парвариши навъҳои равшандиҳандаи офтобпараст дар шароити табиӣ иқлимӣ гуногун аз рӯйи нишондиҳандаҳои маҳсулнокии биологӣ ва ҳоҷагӣ (қутр ва вазни умумии дони як сабадча, миқдор ва вазни умумии дони як сабадча, вазни 1000 дон, миқдори донҳои пуч ва ғайра) фарқияти муайян ба назар мерасад.


Равғаннокӣ ва таркиби кимиёвӣи дони офтобпараст

Муайян намудани равшаннокии дон нишон дод, ки дар тамоми минтақаҳои парвариш навъи “ВНИИМК-8883” нисбат ба дигар навъҳо бо равшаннокии баланд фарқ мекунад (расми 1,2,3). Равғаннокии дони офтобпарастии навъи “Саратовӣ-85” дар ҳудуди 46,2-47,1%, дар навъи “Донии калондона” 44,6-46,0%-ро ташкил додааст. Равғаннокии нисбатан баланди дон дар шароити водии Вахш (55,7%) дар навъи “ВНИИМК-8883” зоҳир қарда шуд. Равғаннокии нисбатан яхелаи дон дар навъи “Саратовӣ-85” ба назар мерасад, ки қариб дар ҳамаи минтақаҳои парвариш миқдори равшани дони он дар як сатҳ қарор дошт. Равғаннокии дони навъҳои омӯхташудаи


оғтобпараст дар шароити минтакаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод) нисбат ба дигар минтақаҳои парвариш пасттар буданд [18].



Расми 1. Таркиби кимиёвӣи дони навъҳои оғтобпараст дар шароити иқлими водии Вахш (ноҳияи А.Чомӣ, қитъаи Мушқурут) бо %.



Расми 2. Таркиби кимиёвӣи дони навъҳои оғтобпараст дар шароити иқлими водии Ҳисор (қитъаи илмӣю таҷрибавӣи ИБФ ва ГР) бо %.



Расми 3. Таркиби кимиёвӣи дони навъҳои оғтобпараст дар шароити иқлими минтакаи кӯҳсори Кӯлоб (ноҳияи Мӯъминобод, қитъаи Навбаҳор) бо %.

Таҳлили таркиби кимиёвии мағзи дони офтобпараст нишон дод, ки дар шароити водии Вахш дар навъи “ВНИИМК-8883” миқдори сафеда 15,1%, дар навъи “Саратовӣ-852 – 15,8%, аммо дар навъи “Донии донакалон” 16,8%-ро ташкил намудааст (расми 1,2,3.). Миқдори зиёди равшан дар навъи “ВНИИМК-8883” – 55,7% ва камтар дар навъи “Саратовӣ-85” – 49,7%, “Донии калондона” – 47,6% зоҳир карда шуд. Миқдори карбогидратҳои мағзи дони навъҳои омӯхташудаи офтобпараст дар ҳудуди 7,4-8,6 % қарор дошт. Дони офтобпараст, хусусан аз витамини В₁ (тиамин) бой аст. Миқдори он 0,64-0,68%-ро ташкил медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки бо мурури паст шудани ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои парвариш зиёдшавии миқдори сафеда мушоҳида мешавад. Дар водии Ҳисор ин нишондиҳанда ба 17,2-18,1%, дар минтақаи кӯҳсори Кӯлоб ба 19,4-20,7% баробар мебошад. Аз рӯи миқдори равшан ҳолати баръакс ошкор шудааст, яъне дар шароити водии Ҳисор равшаннокии дони офтобпараст дар ҳудуди 46,2-53,2% тағйир ёфтааст.

Дар шароити водии Ҳисор қараёни ночизи камшавии миқдори карбогидратҳо (0,4-0,6%) ва зиёдшавии миқдори витамини В₁ (0,07-0,11%) мушоҳида шудааст.

Дар минтақаҳои кӯҳии Кулоб миқдори сафеда нисбат ба водии Вахш (3,9-4,3%) ва Ҳисор (2,2-2,6%) то андозае зиёд шудааст. Миқдори равшан дар дони навъҳои «ВНИИМК-8883» дар шароити водии Ҳисор ва минтақаҳои кӯҳии Кулоб қариб дар як сатҳ мондааст, аммо дар навъҳои «Саратовӣ-85» ва «Донии калондона» нисбат ба водии Ҳисор қариб 2% кам шудаанд.

Дар баробари ин дар шароити минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб миқдори карбогидратҳо дар навъҳо нисбат ба водии Ҳисор кам (1,2-1,9%) шуда, миқдори витамини В₁ зиёд (0,04-0,13%) шудааст.

Дар охир ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки вобаста аз шароити иқлимӣ ва фарқиятҳои байни навъҳо таркиби кимиёвии дони офтобпараст то андозае тағйир ёфтааст.

Аз рӯи ҳисобкуниҳои биометри ва мушоҳидаҳо маълум шуд, ки шароити экологии парвариш ба равандҳои маҳсулнокии офтобпараст таъсири назаррас расонидааст. Баъзе фарқиятҳои байнинавӣ дар динамикаи ташаккулиҳои унсурҳои алоҳидаи маҳсулнокии зоҳир карда шуд.

Ҳамин тавр, таҳқиқотҳои гузаронидаи мо нишон дод, ки шароити иқлимии парвариш ба рушду нумӯш ва маҳсулнокии навъҳои омӯхташудаи офтобпараст таъсири назаррас мерасонад. Дар шароити водии Вахш, дар давраҳои аввали нашъунамо суръати ташаккулиҳои масоҳати барг ба қадри кофӣ баланд буда, дар як вақт дар охири давраи нашъунамо, инчунин камшавии масоҳати барг, аз сабаби хушк шудани баргҳои қабати поёнии растани, ба амал меояд. Дар минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб ташаккулиҳои масоҳати барг нисбат ба водии Вахш ва Ҳисор сусттар мегузарад, аммо аз рӯи қимати ҳадди аксари масоҳати барг ин минтақа бартарият дошт.

ХУЛОСАҶО

Натиҷаҳои асосии диссертатсия

1. Шароитҳои гуногуни иқлимӣ ба суръати рушду нумӯъ, динамикаи ташаккулёбии масоҳати барг ва маҳсулнокии навъҳои омӯхташудаи офтобпараст таъсири назаррас расонидааст. Суръати рушди пояи асосии навъҳои серравғани офтобпараст дар давраҳои аввали нашьунамо дар минтақаи ҳарорати ҳавояш аз мӯътадил баландтар (водии Вахш) нисбат ба минтақаҳои мӯътадил (ноҳияи Мӯъминобод) нисбатан баланд буд. Navъҳои омӯхташуда дар тамоми минтақаҳои экологӣ иқлимии парвариш дорои шиддатнокии зиёди ҳароҷоти об буданд. Ба минтақаи дорои захираҳои зиёди термикибуда (водии Вахш), қимати ҳадди аксари шиддатнокии оббухоркунӣ нисбат ба минтақаҳои мӯътадил (ноҳияи Муминобод) баландтар буд. Фосилаи тағйирёбии шиддатнокии оббухоркунӣ ва дигар нишондиҳандаҳои мубодилаи об дар навъҳои офтобпараст ҳамчун таъсири хусусиятҳои генотипикии растанӣ ва омилҳои иқлимии минтақаи нашьунаморо нишон медиҳад [1-2-М].

2. Маҳсулнокии ҳолиси фотосинтези киштзори навъҳои офтобпараст бо мурури рушду нумӯъ зиёд шуда, мутаносибан зиёдшавии масоҳати баргҳо низ ба назар мерасад. Қимати максималии МХФ дар 60-70 рӯзи баъди пайдошавии майсаҳо, дар рӯзи 80-ум бошад, пастшавии МХФ мушоҳида карда шуд. Дар водии Вахш қимати нисбатан зиёди МХФ дар наъви «ВНИИМК-8883», аммо қимати камтари он дар минтақаи кӯҳии Кӯлоб зоҳир карда шуд. Дар ташаккулёбии маҳсулнокии фотосинтетикӣ киштзори (МФК) навъҳои омӯхташудаи офтобпараст баъзе хусусиятҳои наъвӣ ва минтақавӣ дар шароити водии Вахш маълум карда шудааст. МФК-и наъви «ВНИИМК-8883» дар давоми давраи нашьунамо, нисбат ба навъҳои «Саратовӣ-85» ва «Донии калондона», камтар буданд. Қимати ҳадди аксари МФК-и наъви «Саратовӣ-85» дар рӯзи 80-уми баъди пайдошавии майсаҳо ташаккул ёфтааст. Дар минтақаи кӯҳии Кӯлоб МФК-и наъви «ВНИИМК-8883» нисбат ба водии Ҳисор камтар аст. МФК-и наъви «Донии донакалон» дар тамоми минтақаҳои парвариш нисбат ба дигар навъҳо ночиз буд [3-4-М].

3. Байни МХФ ва қимати ҳосили хоҷагидорӣ навъҳои офтобпараст ҳамбастагии мусбӣи зич зоҳир карда шуда. Фарқияти бузургии ҳосили навъҳо дар шароити гуногуни табиӣи иқлимӣ ба нишондиҳандаи ҷамъулҷамъи фаъолияти фотосинтетикӣ – иқтидори фотосинтетикӣ киштзор ва маҳсулнокии ҳолиси фотосинтез мӯайян гардид. Вазни сабадча бо донаш дар наъви «ВНИИМК-8883» дар шароити водии Ҳисор на он қадар зиёд буд (150,2 г), ҳангоми парвариш дар шароити минтақаи ҳарорати миёнаи моҳонааш паст ва намнокии зиёди ҳаво вазни 1000 дони он 137,1г-ро ташкил кардааст, аммо дар навъҳои «Саратовӣ-85» ва «Донии калондона» дар шароити водии Вахш вазни сабадча бо донаш нисбат ба дигар минтақаҳои парвариш камтар буданд [5-6-М].

4. Шароити иқлимии парвариш ба маҳсулнокии навъҳои офтобпараст таъсири назаррас расонидааст. Зоҳир карда шуд, ки дар давраҳои барвақтии нашьунамо, ҳангоми кам будани масоҳати барг, зиёдшавии шабонарӯзии маводи хушк нисбат ба воҳиди масоҳат кам буда, дар давраи аввали гулкунӣ ин нишондиҳанда баландтар шудааст [7-М].

5. Пурра пухта расидани донҳои сабадча дар шароити водии Вахш дар навъи «ВНИИМК-8883» аз ҳама пеш сар шудааст, аммо дар навъҳои «Саратовӣ-85 ва «Донию донакалон» бошад, 3-4 рӯз дертар фаро расидааст. Дар шароити водии Ҳисор давраи пурра пухта расидани дони навъҳои офтобпараст 2-3 рӯз дертар фаро расидааст. Дар шароити минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб пухта расидани донҳои сабадчаи офтобпараст дар навъи «Донию калондона» барвақттар сар мешавад, аммо дар навъи «ВНИИМК-8883» бошад, 4-5 рӯз дертар ба амал омадааст [8-М].

6. Равғаннокии нисбатан баланди дон дар шароити водии Вахш дар навъи «ВНИИМК-8883» - 55,7% зоҳир карда шуд. Равғаннокии дони навъҳои омӯхташудаи офтобпараст дар шароити минтақаҳои кӯҳии Кӯлоб, нисбат ба дигар минтақаҳои парвариш, камтар (44-52%) буда, миқдори сафед (19,4-20,7) ва тиамин (0,81-0,88) зиёдтар аст [9-М].

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо

1. Дар минтақаи захираи термикиаш зиёд ва намнокии нисбиаш нисбатан пастӣ иқлими ҷануби Тоҷикистон (водии Вахш) кишти навъҳои серравғани офтобпараст («ВНИИМК-8883», «Саратовӣ-85») ҳамчун зироати асосӣ (дар кишти баҳорӣ) тавсия карда мешавад. Ин барои ба даст овардани 2,5-3,0 т/га ҳосили дони офтобпараст мусоидат менамояд.

2. Дар минтақаҳои захираи термикиашон кам ва намнокии нисбии ҳаво нисбатан баланди ҷануби Тоҷикистон (ноҳияи Мӯминобод ва минтақаҳои ба он ҳамшафат), хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооператив ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ кишти навъҳои равшандиҳандаи офтобпараст («Донию калондона» ва ғайра) ҳамчун зироати асосӣ (дар кишти баҳорӣ) тавсия дода мешавад. Ин барои ба даст овардани 3,0-3,5 т/га ҳосили дон имконият медиҳад.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия

1. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Эргашев А., Иброҳимов К.А. Динамика площади листьев и высоты главного стебля подсолнечник в разных экологических условиях выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1, (29) 2008. – С.107-111.

[2-М]. Эргашев А., Иброҳимов К.А. Фотосинтетическая продуктивность посевов подсолнечника // Изд. АН РТ, отд. биол. и мед. Наук. 2008, №3 (164). – С.57-65.

[3-М]. Иброҳимов К.А. Биологическая продуктивность сортов подсолнечника в разных климатических зонах юга Таджикистана // Вестник педагогического университета (ТГПУ). 2012, №2 (45). – С.39-44.

[4-М]. Иброҳимов К.А., Эргашев А. Водобмен сортов подсолнечника в различных климатических зонах выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №6 (49) 2012. – С.293-297.

[5-М]. Иброҳимов К.А., Эргашев А. Влияние климатических условий на семенную продуктивность, масличность и химический состав семян подсолнечника // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №3 (52), 2013. – С.81-84.

[6-М]. Иброҳимов К.А., Эргашев А. Динамика роста, развития и продуктивности сортов подсолнечника в зависимости от

климатических особенностей зоны выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1 (Т), 2019. – С.160-166.

[7-М].Иброхимов К.А., Эргашев А. Биологическая продуктивность масличных сортов подсолнечника в разных климатических условиях Юга Таджикистана // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №2 (14), 2022. – С.192-197.

[8-М].Иброхимов К.А., Эргашев А. Динамика сабзиш ва табодули обии растани офтобпараст дар шароити гуногуни иқлимии ҷануби Тоҷикистон // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ, №2 (14), 2022. – С.217-222.

[9-М].Абдукаримзода Қ.А. Влияние климатических факторов на некоторые физиологические процессы сортов подсолнечника // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1 (25), 2025. – С.140-145.

II. Мақолаҳои муаллиф дар конференсия, маҷмаа ва нашрияҳои дигарӣ илмӣ:

[10-М].Эргашев А., Иброхимов К.А. Экологические условия и продуктивность масличных сортов подсолнечника (HELIANTUS ANNUUS. L) // Матер. Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» Минск, Беларусь, 28-30 ноября 2007. – С.222.

[11-М].Эргашев А., Иброхимов К.А. Влияние климатических условий на рост и развитие сортов подсолнечника. // Матер Респ. науч. конф. посвящ 120 - летию акад. Н.И. Вавилова Душанбе, 30 .10.2007. – С.81-83.

[12-М].Эргашев А., Иброхимов К.А. Параметры биологической продуктивности подсолнечника в различных климатических зонах выращивания // Маводҳои конф. илми-амалии ҷумҳуриявӣ «Вазъи кунунӣ, проблема, дурнамои ҳифз ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣи Тоҷикистон» бахшида ба муносибати 100-солагии ҳодими хизмат. илм, узви вобастаи АИ ҶТ, проф. Шукуров О.Ш. (26.04.2008). – С.120-122.

[13-М].Эргашев А., Иброхимов К.А. Фотосинтетическая продуктивность посевов масличных сортов подсолнечника в разных природно-климатических условиях юга Таджикистана // Матер. науч. конф., посвящ памяти акад. Ю.С. Насырова (Душанбе, 23.10.2008). – С.135-137.

[14-М].Иброхимов К.А., Эргашев А. Рост, развитие и продуктивность подсолнечника в разных климатических зонах юга Таджикистана // Охрана природы Республики Таджикистана, 2013. – С.20-21.

Номгӯи ихтисораҳо, аломатҳои шартӣ

ИИТУЗР-Институти илмию таҳқиқотии умумииттифоқии зироатҳои рағфандиханда

ИФК- Иқтидори фотосинтезикии киштзор

КШХ -концентратсияи шираи ҳуҷайра

МБ - Масоҳати барг

МХФ -Маҳсулнокии ҳолиси фотосинтез

НФФ-Нуриҳои ғайри фотосинтетикӣ

РПЛ-1-Дастгоҳ барои муайян намудани ғилзатнокии шираи ҳуҷайра

РФФ -Радиятсияи фотосинтетикӣ ғайри

ШО-шиддатнокии оббухоркунӣ

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
ИНСТИТУТ БОТАНИКИ ФИЗИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
РАСТЕНИЙ**

ВБК: 581.11+577.19582.739 (581)

На правах рукописи



**АБДУКАРИМЗОДА
КОБИЛДЖОН АБДУКАРИМ**

**ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
(*Heliantus annuus* L.)**

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание учёной степени кандидата
биологических наук по специальности
1.5.12. Физиология и биохимия растений

Душанбе – 2026

Работа выполнена в Институте ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Республики Таджикистан

**Научный
руководитель:**

Эргашев Абдулложон – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений Таджикского национального университета.

**Официальные
оппоненты:**

Мирзорахимзода Акобир Карим – доктор биологических наук, профессор вице-президент и председатель Отдела биологических наук Национальной академии наук Таджикистана.

Давлатбек Сухайло Худоевбек - кандидат биологических наук, доцент декан биологического факультета Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева.

Ведущее учреждение:

Государственное образовательное учреждение «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова».

Защита диссертации состоится «17» сентябрь 2026 г. в 13⁰⁰ на заседании диссертационного совета 6D.KOA-038 при Таджикском национальном университете. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Буни-Хисорак, студенческий городок, корпус №16, E-mail: tnu@mail.tj homidov-h@mail.ru

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Центральной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душабе, пр. Рудаки 17 и на официальном сайте ТНУ-www.tnu.tj

Автореферат разослан «____» _____ 2026г.

Учёный секретарь диссертационного совета
кандидат биологических наук, доцент

Хамидзода Х.Н.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Климатические условия регионов возделывания, а также сортовые различия подсолнечника существенно влияют на формирование и развитие этой культуры. В данном контексте одним из важнейших факторов, определяющих уровень продуктивности, является соотношение между элементами посевной площади и площадью листовой поверхности растений.

Радиационный режим южных районов Таджикистана имеет ряд специфических особенностей по сравнению с другими регионами страны. Здесь радиационный баланс всегда положителен и достигает своих максимальных значений. В среднем годовое количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, составляет 159 ккал/см² в Вахшской долине, 151 ккал/см² в Гиссарской долине и 155 ккал/см² в Кулябском регионе. Из этого общего объема на долю фотосинтетически активной радиации (ФАР) приходится соответственно 71,4, 72,5 и 75,4 ккал/см².

«Вопросы формирования надземной биомассы и площади ассимиляционной поверхности растений достаточно изучены для большинства сельскохозяйственных культур» [6,9]. «Однако физиологические механизмы, лежащие в основе биологической продуктивности подсолнечника в Таджикистане - в частности, высокоурожайных масличных сортов, - остаются недостаточно изученными. В пределах страны эта культура возделывается преимущественно в регионах с благоприятными тепловыми ресурсами в качестве последующей культуры для получения силоса. В результате получают урожайность зеленой массы до 200–300 ц/га и зерна - до 30 ц/га» [13].

Кроме того подсолнечник играет важную роль в Таджикистане как масличная культура, поскольку получаемое из него масло отличается высоким качеством.

Степень научной проработанности исследуемой проблемы.

Научные работы ученых Норова М., Тошова Н. и др. показывают, что в разных климатических зонах сорта подсолнечника дают разный урожай, а количество и качество масла в них варьируются. Внедрение в производство высокоурожайных и высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника является основой. При повышении общей биологической продуктивности и достаточно хорошего сбора семян подсолнечника у разных генотипов подсолнечника, может способствовать внедрению в производство высокоурожайных с высокой жирностью.

Актуальность представленной работы определяется тем, что именно она задаёт направление, цель и задачи проводимых исследований, которое ориентированно на выявление и всестороннее понимание механизмов физиологических и биохимических процессов, которые являются характерными для высокомасличных генотипов подсолнечника. В условиях Таджикистана до настоящего времени

подобные процессы остаются достаточно неизученными, особенно в их зависимости от экологических условий конкретных зон возделывания.

Необходимо отметить, что к настоящему времени при внедрении новых сортов в производственную практику не всегда принимаются во внимание влияние многочисленные факторы внешней среды, которые оказывают определяющее воздействие на развитие и продуктивности этого растения. В условиях республики к числу таких факторов относятся высоты местности, температурные режимы воздуха и почвы, уровень увлажнённости и другие агроэкологические условия, которые формируют специфику адаптационного потенциала подсолнечника и оказывают непосредственное влияние на эффективность его выращивания.

Генотипы подсолнечника, выращенные в достаточно умеренной экологической среде, выявили потенциальные возможности их продуктивности, так как в других эколого - климатических регионах они понижаются, и все экономические затраты полученном урожае не окупаются. Учитывая, достижения, имеющиеся в этой области, некоторые вопросы, такие как воздействие эколого - климатических факторов на физиологические и биохимические показатели продуктивности высоко - масличных сортов подсолнечника в Таджикистане, недостаточно изучены.

Поэтому, изучить влияние факторов окружающей среды (эколого - климатических зон) на физиолого - биохимические процессы и главное продуктивность масличных сортов подсолнечника.

Основная информационная и экспериментальная база.

Данное исследование напрямую связано с государственными и международными программами в области биологии и сохранения биоразнообразия. В частности, тема исследования соответствует национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая заключается в обеспечении продовольственной безопасности и доступа к продовольствию для населения. Кроме того, исследование проводилось в рамках тематического плана научных исследований Лаборатории биохимии фотосинтеза Института ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ проводилось в рамках научно-исследовательской наук. Исследование темы «Изучение С3-фотосинтетического метаболизма в различных экологических условиях» (номер государственного проекта (№ BD 000000868)) и направлено на изучение физиологических и биохимических характеристик и продуктивности видов подсолнечника.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования - изучение показателей продуктивности фотосинтеза, водного режима, динамики формирования общей биологической массы растения и урожайность высокомасличных сортов подсолнечника, процент масличности в разных эколого-климатических регионах Южного Таджикистана.

Задачи исследования:

1. Изучение процессов роста и развития масличных сортов подсолнечника;

2.Изучение процесса фотосинтетической деятельности растений подсолнечника (фотосинтетическая способность, чистая продуктивность фотосинтеза и площадь листьев);

3.Изучение комплекса физиологических характеристик водообмена растений, таких как содержание воды в листовых тканях, уровень транспирационной активности, способность листьев к удержанию воды, величина водного дефицита, а также показатели осмотического давления и концентрации клеточного сока, с учётом их изменения в суточной и сезонной динамике.

4. Изучение общей биологической продуктивности в процессе вегетации;

Объект исследования. Материалом для исследований послужили высокомасличные сорта подсолнечника, рекомендованные для условий Таджикистана и завезенные из Российской Федерации: «ВНИИМК-8883», «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный».

Тема исследования: охватило анализ влияния специфических климатических условий различных агроэкологических зон Таджикистана -Вахшской долины, Гиссарской области и Кулябского горного региона - на физиолого-биохимические характеристики и показатели продуктивности подсолнечника (*Helianthus annuus* L.).

Научная новизна исследований:

-Впервые изучены физиологические и биохимические характеристики масличных сортов подсолнечника в различных экологических зонах Центрального и Южного Таджикистана.

- В ходе исследования классифицировано и научно обосновано влияние климатических условий, особенно температуры и влажности, на процессы продуктивности и фотосинтетической активности растений в зависимости от специфических характеристик сортов подсолнечника.

- Доказана роль климатических факторов в формировании биологической и экономической продуктивности сортов масличного подсолнечника.

- Экспериментальные данные о влиянии климатических факторов на биологическую продуктивность и качество зерна научно доказывают целесообразность размещения сортов масличного подсолнечника в различных регионах с обильными запасами положительных температур и достаточной влажностью воздуха.

Теоретическая и научно-практическая ценность исследования. Данные, полученные при применении эффективных способов выращивания подсолнечника и процесса переработки их семян показали, что они могут быть применены в различных климатических условиях Южного Таджикистана.

Полученные результаты могут быть использованы для подготовки специфических рекомендаций по выращиванию сельскохозяйственных растений (подсолнечника) в различных климатических регионах.

Исследования выявили, что продуктивность изученных сортов растений подсолнечника имела широкий разброс в районах возделывания. В регионе в высоком температурном запасом и относительно низкой влажности климата исследуемого района

(Вахшская долина) рекомендуется выращивать высокопродуктивные высокожирные сорта подсолнечника («ВНИИМК-8883», «Саратовский-85»), как яровые – весенний посев, что позволяет получить 2,5-3,0 т/га семян подсолнечника.

В зонах с низким температурным запасом и умеренно высокой влажностью юга Таджикистана (Муинабадский район и близлежащие районы) фермерские хозяйства, кооперативы и акционерные общества позволяют выращивать масличные сорта подсолнечника («Донской крупноплодный» и другие), как яровую, главную культуру (рекомендуется весенняя посадка), и таким образом урожайность семян достигает 3,0-3,5 т/га.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изучение биологической и экономической продуктивности подсолнечника в зависимости от влияния климатических факторов зоны выращивания.

2. Определение продуктивности масличных сортов подсолнечника в зависимости от уровня морфофизиологических и биохимических показателей;

3. Изучение показателей фотосинтетической деятельности, водного режима листьев подсолнечника, с общей продуктивностью и урожайностью разных сортов подсолнечника. Определение продолжительности фаз процесса вегетации для увеличения урожая подсолнечника в зависимости от сортов, а главное выявление влияния эколого-климатических факторов для каждой зоны выращивания.

Достоверность диссертационных результатов. Достоверность и надежность каждого из полученных результатов были подтверждены обработкой большого объема экспериментального материала. Исследование проводилось в течение 3 лет в трех регионах Вахшской долины: район А. Джами – участок Мушкурот, долина Гиссар – экспериментальный участок Института ботаники, физиологии и генетики растений НИАТ, Кулябский горный район – район Муминобод – участок Навбахор.

Исследование проводилось на основе широкого методологического подхода, включающего как традиционные классические методы, так и современные методы научного анализа. Полученные в процессе научного исследования данные были комплексно обработаны на основе математических интерпретаций, что способствует обеспечению объективности и достоверности интерпретации результатов. Анализ выводов исследования проводился с учетом сравнительного анализа ранее собранных научных материалов, представленных в частной литературе по данной теме. Основные выводы и практическое значение полученных результатов были представлены в докладах на национальных и международных конференциях и семинарах, а также опубликованы в виде статей в рецензируемых научных журналах.

Достоверность полученных результатов получена на основе обработки большого количества экспериментов. Исследования были проведены в трёх регионах Вахшской долины: район А. Джами - Мушкуротский участок, Гиссарская долина - опытный участок Института ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ, горный

район Куляб- Муминабадский район - Навбахорский участок, в течение трёх лет.

Исследование проводилось с использованием классических и современных методов. Результаты исследования были проанализированы методами математической обработки.

Анализ результатов проведенного исследования проводилось с учетом имеющейся в научной литературе информации по проблеме исследования. Основные положения и практические результаты исследований обсуждались на конференциях, международных семинарах и публиковались в научных журналах.

Соответствие представленной диссертационной работы паспорту научной специальности. Диссертация соответствует пунктам 5, 9 и 11 паспорта специальности 1.5.12 «Физиология и биохимия растений»: проведенные исследования относятся к области биологических наук, а именно к физиологии и биохимии растений. Областью исследования являются физиология и биохимия растений.

Диссертация соответствует ряду положений паспорта специальности 1.5.12 «Физиология и биохимия растений».

Раздел 5. Фотосинтез. Свет как фактор, регулирующий рост и развитие растений. Пигменты, исследования их состава и функциональной роли. Физиолого-биохимические основы фотосинтеза.

- Чистая продуктивность фотосинтеза сортов подсолнечника в различных климатических условиях — подраздел 3.4; площадь листьев и фотосинтетический потенциал посевов подсолнечника в различных климатических условиях — подраздел 3.5; биологическая и хозяйственная продуктивность сортов подсолнечника в различных климатических условиях — подраздел 3.6.

Раздел 9. Физиология водного обмена и водного режима растений.

- подраздел 3.1. Изучен водный обмен у сортов подсолнечника.
- подраздел 3.2, показаны истинный дефицит воды и водоудерживающая способность листьев сортов подсолнечника в различных климатических условиях. - подраздел 3.2.2.

Раздел 11. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям внешней среды. Физиология и биохимия адаптации растений к неблагоприятным условиям. Реакции растений на ксенобиотики, наночастицы и радиационное воздействие.

-Концентрация клеточного сока и осмотическое давление в листьях подсолнечника в различных климатических условиях — подраздел 3.2.3.

Личный вклад соискателя ученой степени и исследования.

Исследование выполнено автором диссертации с личным участием на всех стадиях его реализации. Соискателем была проведена аналитическая работа по изучению и описанию современного состояния проблемы на основе научной литературы, организованы и

осуществлены экспериментальные исследования, выполнена обработка и обсуждение полученных результатов. Вклад автора выражен также в формулировке научных выводов и их критическом осмыслении, подготовке и структурировании исследовательских материалов, а также в оформлении текста диссертации в соответствии с установленными требованиями.

Научно-практические эксперименты по данной диссертации в полевых и лабораторных условиях проводились непосредственно автором под руководством научного руководителя. Вклад автора в проведение натурных экспериментов, апробацию, анализ и научное рецензирование результатов экспериментов составляет более 95 процентов.

Апробация диссертации, использование её результатов. Результаты исследований доложены: на международной конференции, посвящённой 120-летию академика Н.И. Вавилова 2007 г.), республиканская конференция, посвящённая 75-летию академика Ю.С. Насырова (Душанбе, 23 октября 2008 г.), республиканская конференция, посвящённая 100-летию профессора О. Шукурова (Душанбе, 26 апреля 2008 г.), ежегодные апрельские научные конференции Государственного педагогического университета Таджикистана имени С.Айни (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 годы) были представлены доклады.

Публикация результатов диссертации. Результаты, полученные в рамках проведённого диссертационного исследования, нашли отражение в ряде научных публикаций. В общей сложности автором подготовлено и опубликовано 14 научных статей, включая 9 публикаций в авторитетных журналах, включённых в официальный список ведущих научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертационные исследования изложены на 155 страницах компьютерного распечатка текста и структурировано в соответствии с академическими стандартами и стилистическими требованиями; работа состоит из четырех основных глав, включающих 21 подраздел, что обеспечивает логичное и последовательное изложение материала. Для разъяснения и обоснования полученных результатов автор использовал 24 таблицы и 11 дополнительных наглядных материалов (рисунков). Кроме того, текст диссертации содержит обсуждение и аргументацию, приложение и итоговые выводы. Список литературы включает 154 источников, 55 из которых - работы зарубежных исследователей, что свидетельствует о широте охвата материала и международном характере проведенного анализа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1 главе представлен краткий обзор научной литературы по теме диссертации. Проанализирована степень изученности данного вопроса в почвенно-климатических условиях стран СНГ и других иностранных государств. Особое внимание уделено влиянию

абиотических природных факторов - таких как температура воздуха, влажность и обеспеченность влагой -на биологическую и хозяйственную продуктивность сортов подсолнечника. В частности, был проведен всесторонний анализ влияния климатических факторов в регионах возделывания подсолнечника на количественные и качественные характеристики его сортов. Также представлены сведения о выращивании сортов подсолнечника - ценной культуры, используемой как для производства масла (пищевое назначение), так и на корм скоту, - в системах основного, повторного и смешанного посева.

«Некоторые сведения были собраны о происхождении, распространении растительных ресурсах, а также некоторых физиологических и биохимических характеристиках подсолнечника» [3, 10, 16, 19,].

Полевые опыты проводились в трех климатических зонах Южного Таджикистана: Вахшской долине (район им. А. Джами, участок «Мушкурут», 350 м над уровнем моря), Гиссарской долине (опытный участок Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, 834 м над уровнем моря) и горном районе Куляба (Муминабадский район, участок «Навбахор», 1680 м над уровнем моря).

В качестве объектов исследования использовались импортированные из Российской Федерации высокомасличные сорта подсолнечника, рекомендованные для условий Таджикистана, - в частности, «ВНИИМК-8883», «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный».

Общее содержание воды в листьях измеряли гравиметрическим методом, как высушиванием в термостате, интенсивность транспирации определяли по методу, предложенному Л.А. Ивановым и др. (1950); водоудерживающую способность листьев оценивали по методу А.А. Ничипоровича (1961), а фактический дефицит воды измеряли по методу Я. Чатского и Б. Славика (1960) в модификации Т.К. Горышиной и А.Ш. Самсоновой (1966). Концентрацию клеточного сока и его осмотическое давление определяли с помощью рефрактометра РПЛ-1 (Гусев, 1981); показатели фотосинтетической продуктивности оценивали по методу А.А. Ничипоровича и др. (1961); масличность зерна измеряли согласно рекомендациям Б.П. Плешкова (1985), а химический состав компонентов ядра подсолнечника анализировали методом Морда (1984). Математическую обработку полученных данных проводили по методу Б.А. Доспехова (1985).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Процессы роста и развития относятся к числу факторов, определяющих уровень продуктивности растений.

Известно, что основным фактором, регулирующим процессы роста и развития растений, в частности, подсолнечника, является

обеспеченность посевов теплом и влагой. Это объясняется тем, что у подсолнечника интенсивный рост стебля и увеличение площади ассимиляционной поверхности происходят преимущественно в период формирования репродуктивных органов (соцветий). Недостаток тепла и влаги в этот период отрицательно сказывается на скорости роста главного стебля и развитии листовой поверхности, что отражается на продуктивности растения. Изучение взаимосвязи между потребностями подсолнечника и такими ключевыми факторами, как тепло и влага, позволяет прогнозировать рост и развитие растения и управлять ими в конкретных почвенно-климатических условиях.

Известно, что среди основных ключевых факторов, определяющих процессы жизнедеятельности подсолнечника, решающая роль принадлежит почвенно-климатическим условиям, которые должны быть предсказанны и использованны. Среди основных факторов, определяющих процессы жизнедеятельности растений, решающая роль принадлежит световому и водному режимам окружающей среды.

Согласно метеорологическим данным, к числу климатических факторов, влияющих на рост возделываемых растений в Таджикистане, относятся тепловой и водный режимы в период вегетации. Период активного роста большинства сельскохозяйственных культур, включая подсолнечник, приходится на время, когда среднесуточные температуры превышают 11°C (эффективная температура); в южной части Таджикистана этот период начинается в марте. Число дней с температурой выше 10°C в южной части республики составляет от 105 до 115. Сумма эффективных температур за период активного роста растений (апрель-май) на юге достигает 1550°C. В отдельные годы этот показатель может несколько варьировать [1].

В целом результаты исследований показали, что климатические условия зоны возделывания оказывают существенное влияние на рост, развитие и продуктивность изучаемых сортов подсолнечника.

Таблица 1 -Динамика линейного роста главного стебля подсолнечника в зависимости от агроклиматических условий различных зон юга Таджикистана (см)

Сорт	Вегетация, дни							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурут)								
ВНИИМК-8883	9,7	18,6	39,4	88,7	136,2	158,8	185,4	186,5
Саратовский-85	10,4	20,5	42,3	92,3	141,5	167,2	191,9	192,4
Донской крупноплодный	11,5	22,8	45,2	98,5	147,3	179,1	215,0	213,1
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФил Р)								
ВНИИМК-8883	8,8	15,2	33,6	79,5	230,0	177,4	198,6	201,7
Саратовский-85	9,1	17,3	35,5	82,7	132,8	180,9	206,8	209,6
Донской крупноплодный	9,4	18,7	39,4	88,8	138,0	185,6	236,8	239,8
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)								
ВНИИМК-8883	8,3	14,0	30,5	72,7	122,5	181,2	200,5	206,6
Саратовский-85	8,9	15,2	31,4	78,1	125,8	186,5	220,1	222,3
Донской крупноплодный	9,2	16,6	34,6	84,0	129,9	190,3	249,2	255,6
M%=2,8; HCP=0,05	0,4	0,8	1,4	3,2	4,1	4,5	4,6	5,5

Скорость роста главного стебля на ранних этапах развития растений была относительно выше в Вахшской долине - регионе,

характеризующемся экстремально высокими температурами воздуха (превышающими 38-41°C), - по сравнению с регионом с умеренным температурным режимом (Муминабадский район). При этом максимальная высота главного стебля подсолнечника в Вахшской долине достигала 1,8-2,0 м - то есть была на 6-9% меньше, чем в регионах с относительно умеренными климатическими условиями (таблица 1).

В условиях Вахшской долины подсолнечник отличается высокими темпами роста и развития; наступление периода полного созревания семян - особенно у сорта «ВНИИМК-8883». Было отмечено, что период созревания сортов «Саратовская-85» и «Донской крупноплодный» наступал на 4-5 дней позже. При этом в условиях Гиссарской долины зерно этих сортов созревало на 3-4 дня позже, чем в Вахшской долине. В горных условиях Куляба период созревания семян наступил раньше, чем у сорта «Донской крупноплодный»; однако у высокомасличного сорта «ВНИИМК-8883» он оказался на 5-6 дней более поздним, в то время как сорт «Саратовский-85» занял промежуточное положение.

Водный обмен у растений сортов подсолнечника

Изучение водного обмена разных сортов подсолнечника в различных условиях выращивания необходимо для комплексного изучения процессов, происходящих в растении, поскольку мы должны иметь возможность управлять процессом продуктивности растений и уметь оценивать вклад каждого из них. Экологический фактор в формировании биологического урожая и уходе за растениями.

При этом суммарная потребность растений в воде, а также характер её использования в физиологических процессах напрямую определяются спецификой условий выращивания. Следует отметить, что сведения о водном режиме сортов подсолнечника, возделываемых в районах Таджикистана с различными климатическими характеристиками, до настоящего времени практически отсутствуют.

Исходя из этого, в рамках проведённых исследований нами была поставлена задача комплексного анализа особенностей водообмена у подсолнечника в контрастных агроклиматических условиях южных регионов республики. Такой подход позволил оценить специфику функционирования водного режима культуры, выявить закономерности его изменения и определить зависимость основных физиологических показателей от уровня тепло- и влагообеспеченности.

Содержание воды в листьях сортов подсолнечника

Данные таблицы 2 показывают, что соотношение связанной воды к свободной у изученных сортов на разных участках выращивания подсолнечника находится в пределах 1.29-1.44%. Следует отметить, что по сравнению с периодом прочесывания в период цветения растения подсолнечника указанная доля имеет характер увеличения (0,01-0,12%).

Таблица 2. - Содержание воды в листьях сортов подсолнечника

Сорт	Фаза вегетации	Содержание воды, % от сырой массы			
		Общей	свободной	связанной	Соотноше ние связ ./своб.
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурут)					
ВНИИМК-8883	Бутонизация	77,1	33,0	44,1	1,34
	Цветения	75,2	32,0	43,2	1,35
Саратовский-85	Бутонизация	78,5	34,3	44,2	1,29
	Цветения	75,4	32,2	43,2	1,34
Донской крупноплодный	Бутонизация	78,9	32,6	46,3	1,42
	Цветения	75,8	31,1	44,7	1,44
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)					
ВНИИМК-8883	Бутонизация	78,8	34,2	44,6	1,30
	Цветения	77,9	33,5	44,4	1,32
Саратовский-85	Бутонизация	79,8	35,2	44,6	1,27
	Цветения	77,5	32,4	45,1	1,39
Донской крупноплодный	Бутонизация	79,6	33,5	46,1	1,28
	Цветения	76,4	31,8	44,6	1,40
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)					
ВНИИМК-8883	Бутонизация	78,2	34,1	44,1	1,29
	Цветения	78,0	33,2	44,8	1,35
Саратовский-85	Бутонизация	79,2	33,9	45,3	1,34
	Цветения	76,8	32,6	44,2	1,35
Донской крупноплодный	Бутонизация	79,9	34,6	45,3	1,31
	Цветения	76,8	32,5	44,3	1,36

Интенсивность транспирации. Большое значение имеет изучение интенсивности транспирации сортов подсолнечника в процессе вегетации в различных климатических условиях с точки зрения влияния факторов внешней среды на процесс водного обмена и определения эффективности использования влаги для производства органического вещества.

Как следует из представленных в таблице 3 данных, у изучаемых сортов подсолнечника интенсивность транспирации отличалась крайне высокими значениями, варьируя в пределах от 0,60 до 3,12 г на грамм сырой массы листа в час. Насколько широкий диапазон колебаний данного показателя напрямую обусловлен различиями агроклиматических условий зон выращивания.

В условиях Вахшской долины, где отмечается более тёплый и засушливый климат, транспирационная активность растений у всех исследованных сортов характеризовалась повышенными значениями на протяжении всего светового дня. Напротив, в районах с относительно умеренным температурным режимом, в частности на опытном участке Навбахор Муминабадского района, интенсивность транспирации была заметно ниже. Особенно чётко данная особенность проявлялась в полуденные и послеполуденные часы, когда показатели испарения влаги из листовой поверхности оставались в пределах минимальных значений по сравнению с жаркими долинными условиями.

При исследовании транспирации у растений подсолнечника в долине Гиссара по сравнению с растениями в Вахшской долине имели незначительные отличия утром и после полудня (14ч.)

Вместе с тем интенсивность транспирации сортов подсолнечника наблюдалась во всех регионах выращивания с некоторыми различиями между сортами. Сорт «ВНИИМК-8883» имел высокую интенсивность транспирации воды во всех зонах

выращивания, а сорт «Донский крупноплодный», напротив, имел низкую интенсивность транспирации воды. Сорт «Саратовский-85» занимает промежуточное положение.

Таблица 3. - Дневной ход интенсивности транспирации листьев сортов подсолнечника в различных климатических зонах в фазе бутонизации (г/г. сыр. массы·ч.)

массы 4,7

Сорт	Время определения					Среднедневная
	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	
Вахшская долина р-н А. Джоми, уч. Мушкурт)						
ВНИИМК-8883	0,86	2,92	3,12	3,10	2,82	2,56
Саратовский-85	0,78	2,81	2,71	2,63	2,38	2,26
Донской крупноплодный	0,84	2,50	2,56	2,41	2,34	2,13
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)						
ВНИИМК-8883	0,88	2,46	3,11	2,35	2,41	2,24
Саратовский-85	0,78	2,21	2,42	2,08	2,23	1,94
Донской крупноплодный	0,76	2,16	2,40	1,92	2,22	1,89
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)						
ВНИИМК-8883	0,87	1,41	1,79	1,58	1,04	1,34
Саратовский-85	0,55	0,83	1,63	1,42	0,83	1,05
Донской крупноплодный	0,60	1,15	1,45	1,23	0,85	1,06
M%=2,5; HCP ₀₅ =0,06						

Реальный водный дефицит листьев. Пониженный уровень водного дефицита в листьях, выявлен при изучении фактического суточного расхода воды в листе подсолнечника в период прочесывания растения (таблица 4) под влиянием климатических особенностей региона выращивания и оказывают существенное влияние на показатель водообмена. В условиях Гиссарской долины уровень дефицита воды был - 9-19%, в Вахшской долине - в пределах 10-20%, а в Муминабадском районе - 9-18%.

При этом необходимо отметить, что в каждом регионе выращивания проявлялись некоторые особенности водного дефицита растения. В условиях Вахшской долины наибольший дефицит воды листьев выявлен у сорта «Донской крупноплодный» (12,0-20,6%). Во всех исследованных климатических зонах наблюдалось общее правило - пониженный уровень водного дефицита утром (9,1-12,0%) и максимально высокий уровень был (17,7-20,6%) во второй половине дня. Однако, по сравнению с климатическими условиями Вахшской и Гиссарской долин, в горных районах Куляба степень дефицита воды листьев была относительно невысокой.

Таблица 4. - Дневная динамика реального водного дефицита листьев у сортов подсолнечника в различных условиях выращивания в фазе бутонизации (%)

Сорт	Время определения				Среднедневной дефицит
	8 ⁰⁰	12 ⁰⁰	16 ⁰⁰		
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурт)					
ВНИИМК-8883	10,0	13,4	19,9	14,3	
Саратовский-85	11,5	14,7	19,0	15,1	
Донской крупноплодный	12,0	16,5	20,6	16,4	
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)					
ВНИИМК-8883	9,3	11,8	15,8	12,3	
Саратовский-85	9,8	13,0	18,4	13,7	
Донской крупноплодный	10,5	14,7	19,5	14,9	
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)					
ВНИИМК-8883	9,1	11,2	15,1	11,8	
Саратовский-85	9,3	12,0	15,8	12,4	
Донской крупноплодный	10,2	13,2	17,7	13,7	
M %=1.8; HCP05 = 0.34					

«Водоудерживающая способность листьев. Одним из ключевых физиолого-биохимических показателей, определяющих уровень адаптивности растений к экстремальным факторам внешней среды - температурному перегреву и водному дефициту, - является их способность удерживать влагу в тканях. Данный параметр тесно связан с соотношением свободной и связанной воды в структуре листа, а также с содержанием осмотически активных веществ и концентрацией цитоплазматических элементов в клеточном соке» [8].

Анализ экспериментальных данных показал, что в зависимости от агроклиматической зоны возделывания (таблица 5) водоудерживающая способность листьев сортов подсолнечника существенно различалась. В условиях Вахшской долины, характеризующейся повышенными температурами и недостаточной влажностью воздуха, интенсивность расхода влаги на единицу времени у исследованных сортов оказалась значительно выше по сравнению с другими регионами и варьировала в пределах 72–80 %. Все выявленные генотипические различия в способности растений к водоудержанию в разных климатических условиях в первую очередь обусловлены влиянием факторов окружающей среды, среди которых ведущая роль принадлежит температурному режиму и уровню атмосферной влажности. Это подтверждает, что адаптационный потенциал подсолнечника в значительной мере определяется степенью его физиологической устойчивости к комплексу климатических стрессов. Несмотря на всё это, разница между сортами во всех регионах выращивания незначительна и находилась в пределах 1.5-2.5%.

Таблица 5. - Дневная динамика водоудерживающей способности листьев сортов подсолнечника в различных агроклиматических зонах Таджикистана в фазе бутонизации (выраженная в процентах потери воды за 1 час)

Сорт	Время наблюдения					Среднедневная
	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч. Мушкурт)						
ВНИИМК-8883	72,4	80,3	76,7	76,0	77,3	76,5
Саратовский-85	72,7	78,1	75,1	74,4	74,2	74,9
Донской крупноплодный	72,1	78,5	79,1	75,5	74,6	76,0
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФИ Р)						
ВНИИМК-8883	47,7	67,3	63,4	60,0	55,3	58,7
Саратовский-85	46,6	63,0	63,3	59,1	51,7	56,7
Донской крупноплодный	48,5	64,8	65,9	60,3	54,9	58,9
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)						
ВНИИМК-8883	43,7	51,5	52,8	54,7	52,4	51,0
Саратовский-85	42,8	51,7	52,5	55,7	49,4	50,4
Донской крупноплодный	46,4	52,6	54,5	54,6	50,9	51,8
M ₀ =2,6; НСР ₀₅ =1,75						

Концентрация клеточного сока и осмотическое давление. «Одним из наиболее информативных физиолого-биохимических параметров, позволяющих судить о характере водообмена в листьях и общей устойчивости растений к действию абиотических стрессоров, является величина концентрации клеточного сока (ККС) и осмотического давления. Эти показатели отражают способность тканей поддерживать водный баланс и сохранять функциональную активность не только за счёт внутренних регуляторных механизмов, но и в условиях воздействия внешних факторов- температурного режима, относительной влажности воздуха, а также интенсивности освещённости и обеспеченности растений элементами питания» [1].

Проведённые наблюдения показали, что в фазе бутонизации концентрация клеточного сока листьев подсолнечника варьировала в

пределах 10,2–11,2 %, при этом осмотическое давление находилось на уровне 8,8–9,2 атм. В дальнейшем, в период цветения, данные показатели возрастали: ККС достигала 11,0–11,8 %, а осмотическое давление увеличивалось до 9,2–9,9 атм. (таблица 6).

Сравнительный анализ региональных различий выявил, что в условиях Гиссарской долины и горных районов Кулябской зоны значения осмотического давления на ранних стадиях вегетации были ниже по сравнению с аналогичными показателями, полученными в более тёплых условиях Вахшской долины. При этом по всем зонам выращивания сохранялась устойчивая закономерность: сорт подсолнечника ВНИИМК-8883 характеризовался более высокими значениями ККС и осмотического давления, чем остальные исследованные сорта, что указывает на его большую физиологическую устойчивость.

Кроме того, в регионах с высоким тепловым потенциалом (Вахшская долина) интенсивность транспирации листьев (ИТ) у всех сортов была выше, чем в районах с относительно умеренным климатом (например, Муминабадский район). Этот факт подтверждает тесную взаимосвязь между температурным фактором, интенсивностью транспирации и показателями осмотического давления, определяющими устойчивость подсолнечника к жаро- и засухоустойчивым условиям.

Увеличение максимального значения оводненности листа и диапазона изменения скорости водообмена у масличных сортов подсолнечника при приближении к зоне его терпературного резерва свидетельствует о способности саморегуляции водообмена у растений и степень их адаптации к климатическим условиям.

На примере изучаемых сортов подсолнечника можно сделать вывод, что сорта, выращенные в разных регионах, имели высокий показатель водопотребления. Относительно более высокое значение интенсивности транспирации листьев соответствует послепопуденным часам, т. е. периоду максимального влияния климатических факторов. Большой размах изменчивости интенсивности транспирации и других показателей водного режима листьев у разных сортов подсолнечника можно понимать как специфическую генотипическую особенность растения, а также влияние климатических факторов региона выращивания.

Таблица 6. - Концентрация клеточного сока и осмотическое давление листьев сортов подсолнечника в различных условиях выращивания

Сорт	Фаза бутонизация		Фаза цветения	
	осмотическое давление, атм.	ККС, %	осмотическое давление, атм.	ККС, %
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурут)				
ВНИИМК-8883	9,2	11,2	9,9	10,1
Саратовский-85	8,4	10,2	9,2	9,3
Донской крупноплодный	8,6	10,5	9,4	9,5
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФигР)				
ВНИИМК-8883	7,8	9,5	9,4	11,3
Саратовский-85	6,8	8,6	8,6	10,6
Донской крупноплодный	7,5	9,1	8,8	8,5
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)				
ВНИИМК-8883	6,3	8,2	9,0	7,8
Саратовский-85	4,1	6,3	8,4	6,3
Донской крупноплодный	4,8	6,8	8,6	6,7
НСР ₀₅ =	0,4	0,6	0,5	0,7
M% = 1,6				

Фотосинтетическая деятельность сортов подсолнечника.

Известно, что фотосинтетическая деятельность сельскохозяйственных культур во многом определяет динамику накопления сухой и сухой биомассы и, наконец, уровень урожайности. Основными элементами фотосинтетической деятельности являются - размер ассимилирующей поверхности и чистая продуктивность фотосинтеза. Важным показателем ассимилирующей площади растения является максимальная и общая площадь (фотосинтетическая способность) полевого листа в период роста, размер которой коррелирует с урожайностью.

«Чистая продуктивность фотосинтеза даёт информацию об интенсивности накопления сухой биомассы на единицу площади листа» [15, 10]. «При этом фотосинтетическая активность меняется в зависимости от климатических и агротехнических условий выращивания, а главное от генотипических особенностей сортов растений подсолнечника» [21, 11].

В каждой климатической зоне складываются специфические условия среды выращивания, определяющие фотосинтетическую деятельность растений подсолнечника.

Площадь листа (ПЛ). В период от появления всходов до начала цветения, который у подсолнечника длится примерно 50–55 суток, происходит наиболее активное формирование ассимиляционного аппарата. В этот промежуток времени площадь листьев (ПЛ) достигает наибольших значений — в пределах 71–81 % от максимума (табл. 7). При этом минимальные показатели площади листовой поверхности фиксировались в условиях жаркого и засушливого климата Вахшской долины, тогда как наиболее развитая листовая поверхность формировалась в Кулябской зоне (Муминабадский район), где температурный фон оставался более умеренным и не превышал в среднем 30 °С.

На последующих этапах вегетации, после завершения фазы цветения корзинок, в долинах Вахша и Гиссара темпы образования новых листьев заметно снижались. В противоположность этому, в условиях Муминабадского района продолжалось активное наращивание листовой массы, что объясняется более благоприятными гидротермическими условиями региона.

Важно подчеркнуть, что при посеве подсолнечника в оптимальные сроки, характерные для каждого агроклиматического района, формировалась максимальная площадь листовой поверхности, что напрямую коррелировало с более высоким уровнем продуктивности генотипов. В количественном выражении листовая поверхность на 30-е сутки после посева составляла в Вахшской долине 18–20 тыс. м²/га, в Гиссарской долине — 16–17 тыс. м²/га, а в условиях Кулябского горного района — 12–14 тыс. м²/га.

Таким образом, разнообразие эколого-климатических условий южных регионов Таджикистана оказывало значительное влияние не только на рост и развитие главного стебля и формирование ассимиляционного аппарата, но и на общую динамику накопления надземной биомассы в процессе онтогенеза растений.

Таблица 7. – Динамика формирования листовой поверхности подсолнечника в различных агроклиматических зонах юга Таджикистана (тыс. м²/га)

Сорт	Вегетация, дни							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Вахшская долина (р-н А. Джамии, уч.Мушкурут)								
ВНИИМК-8883	4,7	8,5	18,3	36,4	38,8	41,0	45,4	39,2
Саратовский-85	4,9	8,6	18,8	38,0	40,0	44,1	48,6	43,6
Донской крупноплодный	5,0	8,9	19,4	39,3	42,9	46,5	50,2	44,1
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)								
ВНИИМК-8883	3,4	5,8	15,6	32,0	39,5	43,4	50,6	41,5
Саратовский-85	3,9	6,2	15,4	33,5	42,7	49,0	54,5	45,7
Донской крупноплодный	4,3	6,6	17,5	35,2	45,8	51,2	56,1	47,0
Кулябская горная зона (Муминабалский район, уч. Навбахор)								
ВНИИМК-8883	2,9	5,1	12,3	30,2	40,6	45,7	52,6	48,0
Саратовский-85	3,3	5,4	13,5	32,2	44,8	50,8	57,8	52,3
Донской крупноплодный	3,6	5,6	14,4	33,8	46,5	52,6	66,3	60,8
M%-3,2; НСР 0,05	0,2	0,6	1,5	2,4	1,8	2,6	2,2	1,9

Фотосинтетический потенциал посевов. Как видно из данных таблицы 8, динамика формирования фотосинтетического потенциала (ФПП) листьев у исследуемых сортов подсолнечника в различных агроклиматических условиях юга Таджикистана имела определённые различия. Характер изменений был обусловлен как сортовыми особенностями, так и влиянием внешней среды. На ранних этапах онтогенеза (10–20-дневные растения) различия между сортами были несущественными, что объясняется ещё недостаточно сформированной листовой поверхностью. Однако по мере увеличения площади листьев происходил пропорциональный рост ФПП.

В условиях Вахшской долины величина ФПП у сорта *ВНИИМК-8883* на протяжении всего периода вегетации была ниже по сравнению с сортами *Саратовский-85* и *Донской крупноплодный*. Максимальные показатели (1,81 млн. м²×дней) были зафиксированы у сорта *Саратовский-85* на 80-е сутки после появления первых листьев, что свидетельствует о его высокой ассимиляционной способности в условиях региона.

Для Гиссарской долины были характерны иные закономерности: здесь у сорта *ВНИИМК-8883* через 50 дней после появления листьев ФПП оказалось выше, чем в Вахшской долине, что указывает на лучшую адаптацию данного генотипа к умеренному температурному режиму и несколько более высокой влажности воздуха. В то же время у сортов *Саратовский-85* и *Донской крупноплодный* фотосинтетический потенциал в этих условиях был относительно ниже по сравнению с их показателями в Вахшской долине.

Таким образом, различия в величинах ФПП между исследуемыми сортами становились наиболее выраженными после 50-го дня вегетации, что позволяет говорить о сортоспецифических особенностях ассимиляционного аппарата и его реакций на комплекс климатических факторов конкретных регионов.

В условиях относительно умеренного климата горного района Куляба фотосинтетический потенциал (ФПП) сорта *ВНИИМК-8883* оставался на более низком уровне по сравнению с аналогичными показателями других сортов подсолнечника, возделываемых в

Гиссарской долине, на протяжении всего периода вегетации. При этом особо следует подчеркнуть, что у сорта *Донской крупноплодный* значения ФПП в течение вегетации стабильно превышали показатели других исследуемых генотипов (*ВНИИМК-8883*, *Саратовский-85*) как в условиях Муинабадского района, так и в климатических условиях Вахшской и Гиссарской долин. Это указывает на более высокую ассимиляционную активность и адаптивный потенциал данного сорта.

Таблица 8. - Фотосинтетический потенциал посевов подсолнечника (млн. м²х дней)

Сорт	Вегетация, дни							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурут)								
ВНИИМК-8883	0,32	0,48	0,50	0,76	0,87	1,05	1,29	1,38
Саратовский-85	0,36	0,50	0,71	0,88	1,38	1,49	1,56	1,74
Донской крупноплодный	0,35	0,44	0,68	0,79	1,31	1,46	1,50	1,65
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)								
ВНИИМК-8883	0,34	0,50	0,61	0,74	1,25	1,32	1,46	1,62
Саратовский-85	0,35	0,53	0,65	0,78	1,22	1,39	1,58	1,66
Донской крупноплодный	0,37	0,48	0,76	0,85	1,20	1,31	1,42	1,54
Кулябская горная зона (Муинабадский район, уч. Навбахор)								
ВНИИМК-8883	0,30	0,46	0,54	0,70	1,38	1,47	1,54	1,56
Саратовский-85	0,34	0,51	0,63	0,75	1,24	1,42	1,61	1,68
Донской крупноплодный	0,35	0,54	0,76	0,95	1,27	1,52	1,66	1,81
M%=2,5; HCP=0,04								

Чистая продуктивность фотосинтеза. Чистая фотосинтетическая продуктивность (ЧПФ) исследованных сортов подсолнечника изменялась в процессе онтогенеза пропорционально увеличению листовой поверхности (таблица 9). Наиболее высокие значения ЧПФ регистрировались на 60-70-е сутки после появления всходов, что совпадало с фазой максимального развития ассимиляционного аппарата. В дальнейшем, начиная с 80-го дня после появления листьев, во всех исследуемых агроклиматических зонах отмечалось снижение ЧПФ, связанное с возрастными изменениями тканей и уменьшением фотосинтетической активности. При этом в условиях Вахшской долины сорт *ВНИИМК-8883* характеризовался сравнительно более высокими значениями ЧПФ, что подтверждает его способность эффективно использовать фотосинтетические ресурсы в условиях повышенного теплового фона.

В условиях Гиссарской долины повышенная влажность воздуха оказала заметное воздействие на характер динамики чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) подсолнечника. На ранних этапах роста различий между сортами, возделываемыми в Вахшской и Гиссарской долинах, практически не наблюдалось: значения ЧПФ оставались примерно на одном уровне. Однако в дальнейшем, по мере приближения к фазе цветения, в Гиссарской долине фиксировался более выраженный подъём данного показателя, и его максимальное значение было отмечено на 70-е сутки после появления первых листьев.

В районах Кулябских гор, где температурный режим отличался относительной умеренностью, динамика ЧПФ сортов подсолнечника имела свои особенности по сравнению с долинными регионами. Так, через 30 дней после появления листьев уровень ЧПФ оставался низким, а пик показателей сдвигался на более поздний срок -около 70-х суток вегетации. В то же время сорт Донской крупноплодный продемонстрировал устойчиво более высокие значения ЧПФ по сравнению с другими изученными генотипами в период с 40-го по 80-й день развития. Наиболее высокие показатели ЧПФ у данного сорта были зафиксированы именно в условиях Кулябского горного района, что свидетельствует о его высокой адаптивной способности к данным агроклиматическим условиям.

Таблица 9.-Динамика чистой продуктивности фотосинтеза подсолнечника (г/м² х сутки)

Сорт	Вегетация, дни							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч.Мушкурут)								
ВНИИМК-8883	4,4	5,6	8,5	10,8	13,0	14,2	13,9	11,7
Саратовский-85	4,1	5,2	6,7	9,2	11,5	13,4	13,0	11,0
Донской крупноплодный	4,0	4,9	6,5	8,7	11,1	12,8	12,1	10,3
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)								
ВНИИМК-8883	4,6	5,8	8,0	10,1	11,9	13,5	14,2	12,6
Саратовский-85	4,3	5,5	7,2	9,0	11,1	13,0	13,2	11,0
Донской крупноплодный	4,2	5,2	6,8	8,4	10,6	12,2	12,5	11,5
Кулябский горный регион (Муминабадский район, уч. Навбахор)								
ВНИИМК-8883	3,6	4,2	6,5	8,0	10,4	12,5	13,4	11,6
Саратовский-85	3,5	4,4	6,6	8,5	10,7	12,8	14,0	12,2
Донской крупноплодный	3,6	4,3	6,7	8,9	11,2	13,8	14,5	13,6
M%=2,82; HCP=0,32								

Увеличение показателей элементов фотосинтетической активности полевых сортов подсолнечника определялось по относительно высокой скорости развития и длительной активности листьев, особенно в зоне специфического климата горного района Куляба.

Биологическая и хозяйственная продуктивность

В начале вегетации, когда листовая поверхность была небольшой, несмотря на относительно высокую фотосинтетическую активность, прирост биомассы за сутки на единицу площади листа был сравнительно маленьким. Вследствии чего, фактором лимитирующим увеличение сухой биомассы в начальных фазах вегетации растений подсолнечника – это минимальная площадь листьев.

При выращивании подсолнечника в разных климатических условиях некоторые различия наблюдаются и по другим показателям продуктивности (общая масса корзинки, количество и масса одной семечки корзинки, масса 1000 семян, процент неполноценных семечек). Следует отметить, что существует положительная корреляционная

связь ($R=\pm 0,88$) между показателем «максимальная площадь листьев» и «урожаем семян» (таблица 10).

Таблица 10. - Корреляционная связь между площадью листьев, общей биомассой и урожаем семян в различных условиях выращивания подсолнечника

Сорт	Площадь листьев м ² /га	Общая биомасса т/га	Урожай семян т/га	R-корреляция (площадь листьев+урожай семян)
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч. Мушкурут)				
ВНИИМК-8883	40,8±2,4	18,5±0,7	2,66±0,21	0,67±0,11
Саратовский-85	42,7±2,5	19,8±0,6	2,95±0,35	0,74±0,12
Донской крупноплодный	44,8±2,2	20,6±0,5	3,42±0,30	0,81±0,10
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФиГР)				
ВНИИМК-8883	46,2±2,3	19,8±0,6	2,81±0,25	0,84±0,15
Саратовский-85	50,0±3,1	22,3±0,4	3,22±0,31	0,69±0,12
Донской крупноплодный	53,4±3,5	24,6±0,7	3,80±0,28	0,85±0,13
Кулябский горный регион (Муминабадский район, уч. Навбахор)				
ВНИИМК-8883	51,4±2,4	20,9±0,5	3,26±0,31	0,82±0,11
Саратовский-85	58,5±3,2	24,7±0,6	3,72±0,25	0,66±0,09
Донской крупноплодный	65,5±4,3	26,8±0,5	3,84±0,34	0,71±0,12

С увеличением листовой поверхности (с 40,8 до 65,5 га. м²/га) урожайность разных сортов подсолнечника увеличилась с 2,66 до 3,84 т/га.

Хозяйственный урожай подсолнечника зависит от размера корзины, а также количества и веса семечек в одной корзине. Общая масса корзинки изучаемых сортов подсолнечника изменялась от 87,0 г (у сорта «Саратовский-85») в условиях Вахшской долины до 113,6 г (у сорта «Донской крупноплодный») в горных условиях Куляба.

«Наши результаты показывают, что на массу и размеры корзинки подсолнечника влияют генотипическое разнообразие и эколого – климатические условия внешней среды (перепад температуры воздуха, продолжительность светового дня, величина влажности и др.)» [12]. «Поэтому по массе и размеру корзины можно определить скорость поступления ассимилятов и поглотительную способность продуцирующего органа (корзины), как это было установлено на сортах хлопчатника» [10].

По уровню продуктивности земледелия подсолнечника, т. е. урожайности зерна, исследуемые сорта отличаются друг от друга в одинаковых и разных экологических условиях. В Вахшской долине сорт «ВНИИМК-8883» имеет относительно высокую урожайность семечек, но в условиях Гиссарской долины и Кулябского горного района сорт «Крупнозернистый» (109,8 г/растение и 113,6 г/растение) отличается. Урожайность семян «ВНИИМК-8883» была относительно невысокой в этих климатических зонах.

По общей массе корзины наблюдались различия между сортами в зависимости от региона выращивания. В условиях Вахшской долины масса корзинки подсолнечника типа «ВНИИМК-8883» с её семенами была сравнительно высокой (150,2 г), но в районе с низкой среднемесячной температурой и высокой влажностью воздуха (Гиссарская долина и Муминабадский район), масса корзинки подсолнечника снизилась до 137,1 г (таблица 11).

Напротив, у сортов «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный» в условиях Вахшской долины масса корзинки с семенами была ниже, чем в других регионах выращивания.

Таблица 11.- Масса корзинки и семян сортов подсолнечника в разных климатических условиях Южного Таджикистана

Сорт	Масса корзинки с семенами, г	Масса корзинки без семян, г	Общая масса семян одной корзинки, г	Масса полноценных семян одной корзинки, г	Масса 1000 семян, г
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч. Мушкурт)					
ВНИИМК-8883	150,2±4,1	43,2±3,1	106,6±4,3	89,8±3,0	77,5±3,2
Саратовский-85	135,5±3,4	48,6±2,0	87,0±3,5	65,7±3,6	95,6±3,5
Донской крупноплодный	141,6±4,0	46,5±3,2	93,4±3,8	70,4±3,3	144,3±4,4
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФил Р)					
ВНИИМК-8883	140,3±3,1	45,1±2,4	95,2±4,3	73,5±3,8	74,4±3,3
Саратовский-85	145,3±4,0	38,6±2,0	106,7±4,1	86,9±4,5	90,2±4,1
Донской крупноплодный	152,1±3,3	41,3±2,5	109,8±3,6	90,1±3,5	135,1±3,4
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)					
ВНИИМК-8883	137,1±5,8	49,2±2,4	89,4±3,1	67,3±4,3	71,4±2,2
Саратовский-85	149,5±6,2	41,5±2,2	105,5±2,0	89,5±3,2	86,3±3,8
Донской крупноплодный	159,6±5,1	44,6±3,2	113,6±3,2	94,6±4,1	139,6±4,6

Анализ морфометрических показателей репродуктивных органов подсолнечника выявил определённые закономерности. По общей массе одной корзинки и массе семян в ней существенных различий между сортами не наблюдалось. Однако при оценке показателя массы 1000 семян выявлено, что сорт ВНИИМК-8883 стабильно превосходил сорта Саратовский-85 и Донской крупноплодный во всех зонах возделывания, что свидетельствует о его потенциально более высоком генетическом ресурсе продуктивности.

Что касается фитопатологических характеристик, то существенных различий между сортами по проявлению заболеваний корзинки установлено не было. В то же время у сорта ВНИИМК-8883 под влиянием более низких среднесуточных и месячных температур отмечалось снижение поражённости корзинчатой гнилью, что может свидетельствовать о его относительной устойчивости к данному заболеванию в условиях умеренного климата.

При этом по количеству семян в одной корзинке сорт ВНИИМК-8883 превосходил остальные исследуемые генотипы. Однако по доле полноценных, выполненных семян в структуре корзинки более высокие показатели были зафиксированы у сорта Саратовский-85, который в этом отношении превзошёл как ВНИИМК-8883, так и Донской крупноплодный (табл. 12).

Выявлено, что продуктивность растения имеет характерную для сорта особенности, а экологические факторы оказывают существенное влияние в зависимости от региона выращивания.

Таблица 12. - Семенная продуктивность сортов подсолнечника в разных климатических условиях Южного Таджикистана

Сорт	Диаметр корзинки см	Общее количество семян одной корзинкишт	Количество семян с ядром, шт	Количество о семян без ядра, шт	% полноценных семян
Вахшская долина (р-н А. Джоми, уч. Мушкурт)					
ВНИИМК-8883	15,8±1,15	1388±55	1192±71	225±34	83,8
Саратовский-85	15,0±0,75	1251±37	995±46	157±29	87,7
Донской крупноплодный	15,1±0,66	1063±48	883±64	169±45	84,2
Гиссарская долина (экспериментальный участок ИБФил Р)					
ВНИИМК-8883	14,2±0,58	1314±60	1105±42	186±33	85,4
Саратовский-85	14,1±0,42	1186±39	926±55	137±26	88,5
Донской крупноплодный	14,5±0,34	823±64	814±31	131±29	84,1
Кулябская горная зона (Муминабадский район, уч. Навбахор)					
ВНИИМК-8883	13,1±0,80	1239±41	991±63	198±32	84,1
Саратовский-85	13,9±0,65	1104±26	886±77	118±39	89,4
Донской крупноплодный	14,9±0,61	919±58	767±58	140±30	84,8

Таким образом, полученные данные показали, что при выращивании масличных сортов подсолнечника в различных природно-климатических условиях по показателям биологической и хозяйственной продуктивности (размеру и общей массе семечек в одной корзине, количеству и массе одного семени в одной корзине, вес 1000 семян, количество семян и т. д.) есть определенная разница.

Масличность и химический состав семян сортов подсолнечника

Определение жирности зерна показало, что во всех регионах выращивания сорт ВНИИМК-8883 отличается от других сортов повышенной жирностью (рис. 1). Жирность семян подсолнечника сорта «Саратовский-85» находилась в пределах 46,2-47,1%, сорта «Донской крупноплодный» - 44,6-46,0%. Сравнительно высокая жирность зерна в условиях Вахшской долины (55,7%) наблюдалась у сорта «ВНИИМК-8883».

Видна относительно однородная маслянистость семени у сорта Саратовский-85, количество масла в его семени находилось на одинаковом уровне практически во всех регионах выращивания. Жирность семян изучаемых сортов подсолнечника в условиях Кулябского горного района (Муминабадский район) была ниже, чем в других регионах возделывания [18].

Анализ химического состава семян подсолнечника показал, что в условиях Вахшской долины количество белка у сорта «ВНИИМК-8883» составляет 15,1%, у сорта «Саратовский-852» - 15,8%, а у сорта «Саратовский-852» - 15,8%. «Донии донакалон» составляет 16,8 % (рис. 1). Наибольшее количество масла обнаружено у сорта «ВНИИМК-8883» — 55,7%, меньшее - у сорта «Саратовский-85» — 49,7%, «Доний калондона» — 47,6%. Количество углеводов в ядрах семян изучаемых сортов подсолнечника находилось в пределах 7,4-8,6%. Семена подсолнечника особенно богаты витамином В1 (тиамином). Его размер составляет 0,64-0,68%.

Следует отметить, что по мере снижения температуры воздуха в зонах выращивания количество белка увеличивается. В долине Гиссара этот показатель равен 17,2-18,1%, в районе Кулябских гор он равен 19,4-20,7%. По количеству масла выявлена обратная ситуация, то есть в условиях Гиссарской долины маслянистость семян подсолнечника изменялась в пределах 46,2-53,2%.




Рисунок 1. –Химический состав семян сортов подсолнечника в Вахшской долине (р-н А. Джони, уч.Мушкурт), %




Рисунок 2. –Химический состав семян сортов подсолнечника в Гиссарской долине (экспериментальный участок ИБФиГР). %




Рисунок 3. – Кулябский горный регион (Муминабадский район, уч.Навбахор)

В условиях Гиссарской долины наблюдалось незначительное снижение количества углеводов (0.4-0.6%) и увеличение количества витамина В1 (0.07-0.11%).

В горных районах Куляба количество белка несколько увеличилось по сравнению с долинами Вахша (3.9-4.3%) и Гиссара (2.2-2.6%). Количество масла в семенях сорта «ВНИИМК-8883» в условиях Гиссарской долины и Кулябского горного района осталось практически на том же уровне, а у сортов «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный» оно снизилось, почти на 2% по сравнению с Гиссарской долиной.

В то же время в условиях горных районов Куляба количество углеводов в сортах снизилось (1.2-1.9%), а количество витамина В1 увеличилось на 0.04-0.13%.

В конечном итоге можно заключить, что по химическому составу семена подсолнечника в некоторой степени меняются в зависимости от генотипического разнообразия и климатических условий выращивания.

На основе биометрических расчетов и наблюдений было выявлено, что экологические условия выращивания оказывают существенное влияние на процессы продуктивности подсолнечника. Выявлены некоторые межсортовые различия, которым характерны специфические механизмы обмена веществ в период формирования и создания отдельных элементов продуктивности.

Таким образом, результаты проведенных исследований убедительно подтверждают, что агроклиматические условия зон возделывания оказывают определяющее влияние на характер онтогенеза, биологические особенности и уровень продуктивности изученных сортов подсолнечника. Разнообразие температурных и гидротермических режимов в различных регионах юга Таджикистана обуславливает значительные различия в темпах роста, формировании ассимиляционного аппарата, динамике водообмена и фотосинтетической активности растений. Установленные закономерности позволяют сделать вывод о тесной взаимосвязи между экологическими факторами среды, сортовыми особенностями и конечной урожайностью культуры.

В условиях Вахшской долины в первые периоды роста скорость формирования листовой площади достаточно высока, и в то же время, в конце периода роста, наблюдается и уменьшение листовой площади, происходит из-за усыхания листьев нижнего яруса растения. В горных районах Куляба формирование листовой площади идет медленнее, чем в Вахшской и Гиссарской долинах, но этот регион имел преимущество по максимальной величине листовой площади.

Заключение

Основные результаты диссертации

1. Различные климатические условия оказали существенное влияние на скорость роста и развития, динамику формирования листовой площади и продуктивность изучаемых сортов подсолнечника. Скорость развития главного стебля масличных сортов подсолнечника в первые периоды роста в регионе с температурой воздуха выше средней (Вахшская долина) была относительно высокой по сравнению с регионами с умеренным климатом (Муминабадский район). Изученные сорта во всех эколого-климатических зонах выращивания имели высокую интенсивность водопотребления. В регионе с большим количеством тепловых ресурсов (Вахшская долина) значение максимальной интенсивности транспирации воды было больше, чем в регионах с относительно умеренным климатом (Муминабадский район). Частота изменения интенсивности испарения и других показателей водного обмена у изученных сортов подсолнечника свидетельствует о влиянии генотипических особенностей растения и климатических факторов региона выращивания [1-2-А].

2. Чистая продуктивность фотосинтеза растений сортов подсолнечника увеличивается в онтогенезе, соответственно увеличивается и площадь листьев. Максимальное значение ЧПФ наблюдалось через 60-70 дней после появления листьев, а на 80-й день наблюдалось снижение ЧПФ. В Вахшской долине сравнительно высокое значение ЧПФ обнаружено у сорта «ВНИИМК-8883», однако более низкое его значение обнаружено в горном районе Куляба. В формировании фотосинтетической продуктивности поля (ФПФ) изучаемых сортов подсолнечника выявлены некоторые региональные и особенности в условиях Вахшской долины. В период роста ФПП

сорта «ВНИИМК-8883» была ниже, чем у сортов «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный». Максимальное значение ФПП «Саратовский-85» сформировалось на 80-й день после появления листьев. В горном районе Куляба ФПП сорта «ВНИИМК-8883» меньше, чем в Гиссарской долине. ФПП сорта «Донской крупноплодный» во всех регионах выращивания был незначительным по сравнению с другими сортами (3-4-А).

3. В ходе исследований была установлена чёткая и статистически значимая положительная корреляционная зависимость между показателями чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) и уровнем сельскохозяйственной урожайности различных сортов подсолнечника. Различия в величине урожайности, наблюдаемые в разных природно-климатических зонах, в значительной мере определялись интегральными характеристиками фотосинтетической деятельности растений. Наиболее важными среди них выступали фотосинтетический потенциал посевов, отражающий суммарную ассимиляционную способность листового аппарата, и чистая продуктивность фотосинтеза, непосредственно характеризующая эффективность использования солнечной энергии в процессах биосинтеза органического вещества. Масса корзины с семечками у сорта «ВНИИМК-8883» в условиях Гиссарской долины была не такой высокой (150,2 г), при выращивании в регионе с низкой среднемесячной температурой и высокой влажностью воздуха, масса 1000 семечек составила 137,1 г, но у сортов «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный» в условиях Вахшской долины масса корзины с семечками была ниже, чем в других регионах выращивания [5-6-А].

4. Климатические условия выращивания оказывают существенное влияние на продуктивность сортов подсолнечника. Показано, что в ранние периоды онтогенеза, когда площадь листьев мала, суточный прирост сухой биомассы на единицу площади невысокий, а в первый период цветения этот показатель выше [7-А].

5. В условиях Вахшской долины полное созревание семечек корзинки у сорта «ВНИИМК-8883» началось раньше, а у сортов «Саратовский-85» и «Донской крупноплодный» наступило позже на 3-4 дня. В условиях Гиссарской долины период полного созревания семян подсолнечника наступил на 2-3 дня позже. В условиях горных районов Куляба у сорта «Донской крупноплодный» созревание семян подсолнечника начинается раньше, а у сорта «ВНИИМК-8883» оно наступает на 4-5 дней позже [8-А].

6. Сравнительный анализ показал, что наибольшая масличность семян подсолнечника была отмечена в условиях Вахшской долины у сорта *ВНИИМК-8883*, где данный показатель достигал 55,7 %. В то же время в условиях горных районов Кулябской зоны содержание масла в семенах исследованных сортов оказалось ниже (44–52 %), однако именно здесь фиксировались более высокие показатели по содержанию белка (19,4–20,7 %) и тиамина (0,81–0,88 мг%), что отражает специфическую реакцию растений на местные эколого-климатические факторы [9-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов

1. В южных районах Таджикистана, отличающихся высоким тепловым потенциалом и сравнительно низкой влажностью воздуха (например, Вахшская долина), в качестве основной возделываемой культуры рекомендуется использовать высокомасличные сорта подсолнечника - *ВНИИМК-8883*, *Саратовский-85* и *Донской*

крупноплодный. Их выращивание обеспечивает получение урожайности на уровне 2,5-3,0 т/га семян, что позволяет не только повысить продуктивность посевов, но и удовлетворить потребности масложировой промышленности в сырье высокого качества.

2. В регионах с низким температурным запасом и относительно высокой влажностью юга Таджикистана (Муминабадский район и прилегающие районы) в хозяйствах, кооперативах и акционерных обществах осуществляется посев масличных сортов подсолнечника («Донской крупноплодный» и другие) в качестве основной культуры (при весенней посадке). Это позволяет получить урожай зерна 3.0-3.5 т/га.

Список использованных литературов

1. Alexandrov, V., Koteva, V. Attack on sunflower by charcoal rot (*Sclerotium bataticola* T.) under the influence of climate and mineral fertilization. [Text] // *Bulgarian Journal of Agricultural Science* 2001, 7(3), p. 271-274.

2. Cechin I., Rossi S.C. Oliveira V.C., Fumis T.F. Photosynthetic responses and proline content of mature and young leaves of sunflower plant under water deficit. [Text] // *Phofosynthetica* 2006, 44(1), p. 143-146.

3. Вавилов П.П. Растениеводство. [Текст] М.: Колос, 1986.-344 с.

4. Горышина Т.К., Самсонова А. И. Водный дефицит в листьях травянистых дубравных растений разных сезонных групп. [Текст] / Т.К.Горышина, А.И.Самсонова // Ботан. ж., 1966, т. 51, №5, С. 670-677.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. [Текст] М.: Агропромиздат, 1985. -351с.

6. Дьяков А.Б.//Биология, селекция и возделывание подсолнечника. [Текст] М.: Агропромиздат, 1991. - 281 с.

7. Жолкевич В.Н., Гусев Н.А., Капля А.В. Водный обмен растений. [Текст] М.: Наука, 1989. 256 с.

8. Жолкевич В.Н., Гусев Н.А., Капля А.В. Водный обмен растений. [Текст] М.: Наука, 1989. 256 с.

9. Иванов Л.А., Силина А.А., Цельникер Ю.Л. О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях [Текст] // Ботан. ж., 1950, т.35, №2, С. 585-590.

10. Кабанов П.Г. Погода и поле. [Текст] Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1975. - 239 с.

11. Каримов Х.Х. Физиология и биохимия зимневегетирующих кормовых культур. [Текст] Душанбе: Дониш, 2003, -196 с.

12. Каюмов М.К. Программирование урожаяев. [Текст] – М.: Московский рабочий., 1986. – 182 с.

13. Мельник Ю.С. Климат и произрастания подсолнечника. [Текст] Л.: Гидрометиздат, 1972.- 143с.

14. Никитин С.А. Подсолнечник. [Текст] М.: Сельхозгиз, 1957. - 201 с.

15. Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений и пути повышения ее продуктивности [Текст] // Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. – М.: Наука, 1972. – С.511-527.

16. Ничипорович А.А., Строганова Л.Е., Чмора С.Н и др. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. [Текст] – М.: Изд-во АН СССР, 1961. -133 с.

17. Норов М.С., Нарзуллаев Т.С., Бобоев А. Подсолнечник – ценная масличная и кормовая культура. [Текст] Материалы Межд. научно-прак. конф. Душанбе, 2012. – С.373-378.

18. Норов М.С., Шарипов А.Р., Бобоев А.А. Андархур А.А. Некоторые особенности агротехники масличного подсолнечника в условиях богары Таджикистана. [Текст] Душанбе, 2012, С. 188-193.

19. Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений. [Текст] М.: Колос, 1985, 255 с.

20. Пустовойт В.С. Избранные труды. [Текст] М.: Агропромиздат, 1990. -376 с.

21. Чатский И.С. Метод определения водного дефицита листа [Текст] /И.С. Чатский, Н.И. Славик. //Ботан. Журнал, 1960.-с.45-47.

22. Шатилов И.С. Всесторонний учет условий формирования урожая [Текст] //Вестник с.-х. науки, 1980. №1 С. 103 - 108.

Публикации по теме диссертации

1. Публикации автора в рецензируемых научных журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Динамика площади листьев и высоты главного стебля подсолнечник в разных экологических условиях выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1, (29) 2008 с.107-111.

[2-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Фотосинтетическая продуктивность посевов подсолнечника // Изд. АН РТ, отд. биол. и мед. наук, №3 (164), 2008 с.57-65.

[3-А]. Иброхимов К.А. Биологическая продуктивность сортов подсолнечника в разных климатических зонах юга Таджикистана // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №2 (45) 2012 с. 39-44.

[4-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Водобмен сортов подсолнечника в различных климатических зонах выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №6 (49) 2012 с. 293-297.

[5-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Влияние климатических условий на семенную продуктивность, масличность и химический состав семян подсолнечника // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №3 (52), 2013, с. 81-84.

[6-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Динамика роста, развития и продуктивности сортов подсолнечника в зависимости от климатических особенностей зоны выращивания // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1 (1), 2019, с. 160-166.

[7-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Биологическая продуктивность масличных сортов подсолнечника в разных климатических условиях Юга Таджикистана // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №2 (14), 2022, с. 192-197.

[8-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Динамика сабиш ва табодули обии растани оғтобпараст дар шароити гуногуни иқлимии ҷануби Тоҷикистон // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ (ДДОТ), №2 (14), 2022, с. 217-222.

[9-А]. Абдукаримзода Қ.А. Влияние климатических факторов на некоторые физиологические процессы сортов подсолнечника // Вестник педагогического университета (ТГПУ), №1 (25), 2025, с. 140-145.

2. Статьи автора на конференциях, в сборниках и других научных изданиях:

[10-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Экологические условия и продуктивность масличных сортов подсолнечника (HELIANTUS ANNUUS. L) // Матер. Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» Минск, Беларусь, 28-30 ноября 2007 с. 222.

[11-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Влияние климатических условий на рост и развитие сортов подсолнечника. // Матер Респ. науч. конф. посвящ 120 - летию акад. Н.И. Вавилова Душанбе, 30 .10.2007, с.81-83.

[12-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Параметры биологической продуктивности подсолнечника в различных климатических зонах выращивания // Маводҳои конф. илми-амалии ҷумҳуриявӣ «Вазъи кунунӣ, проблема, дурнамои хифз ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣи Тоҷикистон» бахшида ба муносибати 100-солагии ходими хизмат. илм, узви вобастаи АИ ҶТ, проф. Шукуров О.Ш. (26.04.2008) с120-122.

[13-А]. Эргашев А., Иброхимов К.А. Фотосинтетическая продуктивность посевов масличных сортов подсолнечника в разных природно-климатических условиях юга Таджикистана // Матер.науч. конф., посвящ памяти акад. Ю.С. Насырова (Душанбе, 23.10.2008) с.135-137.

[14-А]. Иброхимов К.А., Эргашев А. Рост, развитие и продуктивность подсолнечника в разных климатических зонах юга Таджикистана // Охрана природы Республики Таджикистана, 2013, с.20-21.

Перечень сокращений, условных обозначений

ВНИИМК- Всесоюзный научно-исследовательский институт масличных и эфирных масличных культур

ККС - Концентрация клеточного сока

ПЛ - Площадь листа

ПКС - Плотность клеточного сока

ФПП-Фотосинтетический потенциал посевов

ФАУ- Фотосинтетически активные удобрения

РПЛ-1 - Прибор для определения плотности клеточного сока

ЧФП - Чистая фотосинтетическая продуктивность

ИТ-Интенсивность транспирация

АННОТАТСИЯИ
АБДУКАРИМЗОДА ҚОБИЛЧОН АБДУКАРИМ
ДАР МАВЗЌИ: «ТАЪСИРИ ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ИҚЛИМӢ БА
НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОКИМИЁВӢ ВА
МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОҒТОБПАРАСТ (*Heliantus annuus* L.)»

Калимаҳои калидӣ: оғтобпараст, сабзиш, оббухоркунӣ, танқисии об, шароитҳои экологию-иқлимӣ, консентратсияи шираи ҳуҷайра, фишори осмотикӣ, иқтидори фотосинтезикии киштзор, маҳсулнокии ҳолиси фотосинтез, маҳсулнокии биологӣ.

Мақсади таҳқиқот- Мақсади таҳқиқот омӯзиши чараҳои мубодилаи об, маҳсулнокии фотосинтетикӣ ва ташаккулёбии массаи биологии умумии растанӣ ва ҳосили хоҷагии навъҳои равшандиҳандаи зироати оғтобпараст дар минтақаҳои гуногуни экологии Ҷануби Тоҷикистон ба шумор меравад.

Методҳои таҳқиқот ва таҷҳизотҳои истифодагардида.

Миқдори умумии обро дар барг аз рӯи усули вазнии дар термостат хушк намудан, шиддатнокии оббухоркунӣ, қобилияти обнигоҳдории баргҳо, танқисии ҳақиқии обро чен намудем. Консентратсияи шираи ҳуҷайра ва фишори осмотикии барг бо истифодаи рефрактометр РПЛ-1, нишондиҳандаҳои маҳсулнокии фотосинтез аз рӯи усули А.А. Ничипорович ва дигарон, равшаннокии дон аз рӯи тавсифи Б.П. Плешков, таркиби химиявии унсурҳои мағзи дони оғтобпараст мувофиқи методи овардашуда муайян карда шуд. Коркарди математикии маълумотҳои тадқиқот аз рӯи усули Б.А. Доспехов гузаронида шуд.

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ навъҳои барои шароити Тоҷикистон тавсияшудаи оғтобпарастии равшаннокнашон баланди аз Федератсияи Россия овардашуда ВНИИМК-8883, Саратови-85, Дониш калондона истифода шудаанд.

Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои онҳо. Дар шароити минтақаҳои гуногуни экологии Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ бори нахуст хусусиятҳои физиологӣ биохимиявии навъҳои равшандиҳандаи оғтобпараст омӯхта шудааст. Дар таҳқиқот таъсири шароити минтақаҳои иқлимӣ, хусусан речаи ҳарорат ва намнокии ҳаво ба гузариши раванди маҳсулнокии ва ғайрияти фотосинтезикии растанӣ вобаста аз хусусиятҳои хоси навъҳои оғтобпараст тасниф ва илман асоснок карда шудаанд. Нақши омилҳои иқлимӣ дар ташаккулёбии ҳосилнокии биологӣ ва хоҷагии навъҳои равшандиҳандаи оғтобпараст ошкор карда шудааст.

Тавсияҳо оид ба истифода. Маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба таъсири омилҳои иқлимӣ ба маҳсулнокии биологӣ ва сифати дон ҷойгиркунии мақсадноки навъҳои равшандиҳандаи оғтобпарастро дар минтақаҳои гуногуни дорои захираҳои зиёди ҳарорати мусбӣ ва намнокии кофӣ ҳаво илман асоснок мебошад.

Соҳаи таътиб: физиология ва биохимияи растанӣ.

АННОТАЦИЯ
АБДУКАРИМДЗАДА КОБИЛДЖОН АБДУКАРИМ
НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА (*Heliantus*
***annuus* L.)»**

Ключевые слова: подсолнечник, рост, развитие, водный обмен, природно-климатические условия, фотосинтетическая деятельность, чистая продуктивность фотосинтеза, биологическая продуктивность.

Цель исследования – Целью исследований является изучение процессов водообмена, продуктивности фотосинтеза, формирования общей биологической массы и урожая масличных сортов подсолнечника в различных экологических зонах юга Таджикистана.

Методы исследования и оборудование использованному.

Общее содержание воды в листьях измеряли гравиметрическим методом сушки в термостате, интенсивность испарения воды, влагоудерживающую способность листьев и истинный дефицит воды. Концентрацию клеточного сока и осмотическое давление листьев определяли с помощью рефрактометра РПЛ-1, показатели фотосинтетической продуктивности определяли по методу А.А. Ничипоровича и др., содержание масла в зерне определяли по описанию Б.П. Плешкова, химический состав элементов подсолнечного ядра определяли по указанной методике. Математическая обработка данных исследования проводилась по методу Б.А. Доспехова.

В качестве исследовательских материалов использовались масличные сорта подсолнечника, рекомендованные для таджикских условий, импортированные из Российской Федерации: ВНИИМК-8883, Саратов-85 и Донской крупноплодный.

Полученные результаты и их новизна. Впервые изучены физиологические и биохимические характеристики сортов масличного подсолнечника в различных экологических зонах Центрального и Южного Таджикистана. В ходе исследования классифицировано и научно обосновано влияние климатических условий, особенно температурно-влажностного режима, на переход продуктивного процесса и фотосинтетическую активность растений в зависимости от специфических характеристик сортов подсолнечника. Выявлена роль климатических факторов в формировании биологической и экономической продуктивности сортов масличного подсолнечника.

Рекомендации по использованию. Экспериментальные данные о влиянии климатических факторов на биологическую продуктивность и качество зерна научно обосновывают целесообразность целенаправленного размещения сортов масличного подсолнечника в различных регионах с обильными запасами положительных температур и достаточной влажностью воздуха.

Область применения: физиология и биохимия растений.

ANNOTATION
ABDUKARIMDZADA KOBILJON ABDUKARIM
ON THE TOPIC: "THE INFLUENCE OF VARIOUS CLIMATIC
CONDITIONS ON THE PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
INDICATORS AND PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER (*Helianthus*
annuus L.) VARIETIES"

Keywords: sunflower, sprouting, desalination, lack of water, climatic conditions, concentration of cell sap, osmotic pressure, photosynthetic ability of a plant, net photosynthesis productivity, biological productivity.

Objective of the study. The aim of the study is to study the processes of water allocation, the productivity of photosynthesis, the formation of a common biological mass and the yield of sunflower in various ecological regions of southern Tajikistan.

Materials and research methods. Total water content in leaves was measured gravimetrically by drying in a thermostat, along with the rate of water evaporation, leaf water-holding capacity, and true water deficit. Cell sap concentration and leaf osmotic pressure were determined using an RPL-1 refractometer. Photosynthetic productivity was determined using the method of A.A. Nichiporovich et al., kernel oil content was determined as described by B.P. Pleshkov, and the chemical composition of sunflower kernel elements was determined using the aforementioned method. Mathematical processing of the study data was performed using the method of B.A. Dospekhov.

For research in Tajikistan, high-oil sunflower seeds from the Russian Federation were used: VNIMK-8883, Saratov-85, Donskoy large-fruited.

The results obtained and their novelty. For the first time, the physiological and biochemical characteristics of oilseed sunflower varieties in different ecological zones of Central and Southern Tajikistan were studied. The study classified and scientifically substantiated the influence of climatic conditions, particularly temperature and humidity, on the transition to the productive process and photosynthetic activity of plants, depending on the specific characteristics of sunflower varieties. The role of climatic factors in shaping the biological and economic productivity of oilseed sunflower varieties was revealed.

Recommendations for application Experimental data on the impact of climatic factors on biological productivity and grain quality scientifically substantiate the feasibility of targeted placement of oilseed sunflower varieties in various regions with abundant positive temperatures and sufficient air humidity.

Field of application: plant physiology and biochemistry.