

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ОМУЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ
САДРИДДИН АЙНӢ**

Бо ҳуқуқи дастнавис



ТДУ-517.2 (575.3)

ТКБ-22.1 (2 тоҷик)

3 91

ЗУЛФОНОВ ШАҲРИЁР МУЛОЗУЛФОНОВИЧ

**ТАТБИҚИ ҲИСОБИ ОПЕРАТСИОНӢ ДАР ҲАЛЛИ БАЪЗЕ
СИНФҲОИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ ВА ИНТЕГРО-
ДИФФЕРЕНСИАЛӢ БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСӢ**

ДИССЕРТАТСИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор
аз рӯи ихтисоси 6D060100 – Математика (6D060102 -
Муодилаҳои дифференциалӣ, системаҳои динамикӣ ва
идоракунии оптималӣ)

**Рохбари илмӣ:
академики АМИ Тоҷикистон,
доктори илмҳои физикаю математика,
профессор Илолов М. И.**

ДУШАНБЕ-2025

МУНДАРИҶА

Муқаддима.....	4
Боби 1. ҲИСОБИ ОПЕРАТСИОНӢ.....	11
1.1. Табдилоти Лаплас.....	11
1.2 Табдилоти Лаплас-Карсон.....	13
1.2.1 Тасвири баъзе функсияҳо.....	15
1.2.2 Тасвири баъзе интегралҳо.....	24
Боби 2: МУОДИЛАҶОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИ БО ҲОСИЛАҶОИ ХУСУСӢ.....	44
2.1 Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусӣ.....	44
2.1.1 Мафҳуми асосӣ.....	44
2.1.2 Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби як.....	45
2.1.3 Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби ду.....	46
2.2. Татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ.....	47
2.2.1 Муодилаи транспорт бо манбаи ҳатӣ.....	48
2.2.2 Муодилаи дифференсиалии ҳатӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби ду.....	49
2.3. Муодилаи телеграф.....	68
Боби 3: МУОДИЛАҶОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛӢ.....	80
3.1. Муодилаҳои интегро-дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусӣ.....	80
3.2. Муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф.....	82
3.2.1 Мафҳуми асосӣ.....	82
3.2.2 Ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядроии функсияи ҳатӣ.....	84

3.2.3 Ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядрои $a(t) = (1 - bt)e^{-bt}$	101
3.3. Татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон дар ҳалли муодилаҳои интегро-дифференсиалии ба муодилаи мавҷ овардашаванда.....	114
Хулоса.....	127
Адабиёт.....	128

Муқаддима

Мубрамияти мавзуй таҳқиқот. Дар даҳсолаҳои охир назария ва амалияи муодилаҳои дифференсиалӣ ва интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ, ки шарҳи риёзии масъалаҳои мураккаб ва ҳеле муҳими рӯйдодҳои физика, химия, биология ва технологияи муосир мебошанд, рушду пешрафти назаррас дорад. Тарзҳои ҳеле мухталифи ҳалли масъалаҳои ибтидоӣ ва ибтидоӣ-канорӣ барои ин муодилаҳо коркард шудаанд. Дар байни онҳо методи табдилоти интегралӣ мақоми алоҳида дорад. Дар навбати худ муҳимтарини ин методҳо методи табдилоти интегралӣ Лаплас-Карсон барои муодилаҳои хаттӣ аз n – тағирёбанда мебошад, ки солҳои охир дар таваҷҷуҳ ва диққати риёзидонҳо, физикҳо ва дигар тадқиқотчиён қарор дорад. Мақолаҳо ва монографияҳои илмӣ Ю. А. Бричков ва А. П. Прудников [5, 6], Р. С. Даҳия [109], А. Бабаханӣ [106], Р. С. Даҳия ва Ҷ. С. Дебнат [115] ва инчунин В. А. Диткин ва А. П. Прудников [20, 21, 108] ба усулҳои нави ҳисоб-кунии табдилоти роста ва баръакси Лаплас-Карсон барои функсияҳои дутағирёбанда ва бисёртағирёбанда бахшида шудаанд.

Рисолаи диссертатсионӣ ба татбиқи як қатор синфҳои муодилаҳо (муодилаи дифференсиалии телеграф, муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф, муодилаҳо бо ҳосилаҳои хусусии тартиби гуногун ва масъалаҳои ибтидоӣ-канорӣ барои онҳо) тавассути табдилоти Лаплас-Карсон бахшида шудааст. Барои пайдо кардани намуди ошқори ҳалли муодилаҳои номбурда зарурияти ҳисоббарории табдилоти роста ва баръакси интегралӣ аз функсияҳои бисёртағирёбанда ба миён меояд. Дар диссертатсия ҳисобкуниҳои оператсионӣ барои чунин функсияҳо пешниҳод шудаанд.

Дарачаи коркарди илмӣ мавзуй таҳқиқот. Барои классҳои на он қадар васеи муодилаҳои дифференсиалӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо истифода аз ҳисобкуниҳои оператсионӣ дар қорҳои илмӣ Й. Фучита [117, 118], М. Ф. Абдулқаримов [2], В. А. Илин [34, 35, 36], Е. А.

Козлова [119], А. А. Дубков [23], С. С. Орлов [61], Э. И. Семенов ва А. А. Косов [79] мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Масъалаҳои ибтидоӣ ва ибтидоӣ-канорӣ барои муодилаҳои дифференсиалӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалии телеграф ва инчунин, барои муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби ду дар мақолаҳои илмӣ М. И. Илолов, Ш. М. Зулфонов [32, 33, 37, 38], Ш. М. Зулфонов [2 – М, 5 – М] таҳқиқ карда шудаанд. Барои чунин масъалаҳо тавассути табдилоти интегралӣ Лаплас-Карсон тасвири ҳалли ошкор пешниҳод карда шудааст.

Алоқаи кори таҳқиқотӣ бо барномаҳо, лоиҳаҳо ва мавзуҳои илмӣ.

Кори диссертатсионӣ дар доираи баамалбарории нақшаи перспективии корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи таҳлили математикии факултети математикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни барои солҳои 2021-2025 аз рӯи мавзӯи “Таҳқиқот оид ба назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ ва татбиқи он ” иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии рисолаи диссертатсионӣ муайянкунии тасвири баъзе функцияҳо ва тасвири баъзе интегралҳо мебошад, ки барои ёфтани ҳалли ошкори баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда истифодашаванда буда, инчунин барои ёфтани ҳалли ошкори муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда ва муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда мавриди васеи истифода қарор мегиранд. Тасвири функцияҳо ва интегралҳо, ки дар рисолаи диссертатсионӣ нишон додем на фақат барои ҳалли муодилаи дифференсиалии телеграф, муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф ва муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду истифода карда мешаванд, балки барои ёфтани ҳалли муодилаи интегро-дифференсиалии ба муодилаи гармигузаронӣ ва мавҷ овардашаванда ва ғайра низ истифодашавандаанд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Мувофиқи мақсади гузошташудаи таҳқиқот, масъалаҳои зерин мушаххас карда шудаанд:

1. Тасвири интегралҳои намуди

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-as} f(x-s, t-s) g(s) ds;$$
$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s; \tau) e^{-a_1 s} ds d\tau;$$

муайян карда шавад;

2. Ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии телеграф, муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф ва муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду муайян карда шавад;
3. Муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядрои функцияи хаттӣ (графикаш хати рост) ва функцияи ғайрихаттӣ (графикаш хати қавъ) бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда ҳал карда шавад;

4. Усули ҳисоби оператсионӣ дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ ва интегро-дифференсиалӣ татбиқ карда шавад.

Объекти таҳқиқот. Муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда ва муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядроӣ функсияи хаттӣ (графикаш хати рост) ва функсияи ғайрихаттӣ (графикаш хати қав) бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда мебошад.

Предмети таҳқиқот. Предмети таҳқиқот муайянкунии тасвири функсияҳо, интегралҳо ва ёфтани ҳалли ошқори . муодилаи дифференсиалии телеграф, муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф ва муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду мебошад.

Навгони илмӣ таҳқиқот. Дар рисолаи диссертатсионӣ натиҷаҳои асосии зерин ба даст оварда шудаанд:

- ба воситаи табдилоти Лаплас-Карсон тасвири функсияҳо ва интегралҳо, ки татбиқи васеи амалӣ доранд муайян карда шудаанд;
- ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда муайян карда шудааст;
- ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядроӣ функсияи хаттӣ (графикаш хати рост) ва функсияи ғайрихаттӣ (графикаш хати қав) бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда муайян карда шудааст;
- ҳалли умумии муодилаҳои дифференсиалии хаттӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда ва ҳалли муодилаи интегро-дифференсиалии ба муодилаи мавҷ овардашаванда муайян карда шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ амалии таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дошта, натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ ва методҳои исботи онҳоро дар ҳолати ҷустуҷӯ намудани ҳалли масъалаҳои ибтидоӣ-канорӣ барои муодилаҳои дифференсиалӣ бо

ҳосилаҳои хусусӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ татбиқи худро ёфтаанд.

Нуктаҳои ба ҷимоя пешниҳодшаванда:

- теорема дар бораи муайянкунии тасвири баъзе функцияҳо ба воситаи табдилоти Лаплас-Карсон;
- теорема дар бораи муайянкунии тасвири баъзе интегралҳо ба воситаи табдилоти Лаплас-Карсон;
- ҳалли ошкори муодилаҳои дифференсиалии хаттии тартиби як ва ду бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда;
- ҳалли ошкори муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда;
- ҳалли ошкори муодилаҳои интегро-дифференсиалии телеграф барои ядроҳои гуногун бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда;
- ҳалли ошкори муодилаҳои интегро-дифференсиалии ба муодилаи мавҷ овардашаванда бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда.

Дарачаи эътиборнокии натиҷаҳо. Эътиборнокии натиҷаҳои илмӣ рисолаи диссертатсионӣ тавассути исботҳои математикии дақиқи ҳамаи тасдиқоти дар диссертатсия овардашуда таъмин гардида, бо тадқиқоти дигар муаллифон тасдиқ карда мешавад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ Кори диссертатсионӣ аз рӯйи ихтисоси 6D060102 – Муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ, идоракунии оптималӣ иҷро карда шуда, фасли муодилаҳои дифференсиалӣ дар банди III – и параграфи 3-и шиносномаи ихтисоси илмӣ маҳсуб мегардад.

Саҳми шахсии докталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Масъалаи таҳқиқот ва интихоби методи исботҳо аз ҷониби роҳбари илмӣ пешниҳод карда шудааст ва ба ғайр аз ин роҳбари илмӣ ба муаллифи рисола кӯмаки консултатсионӣ расонидааст. Натиҷаҳои

асосии кори диссертатсионӣ, ки дар банди «Навоварии илмӣ» оварда шудаанд, шахсан аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар семинарҳо ва конференсияҳои зерин муҳокима гардидаанд:

- I. Семинари Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ “Таҳлили касрӣ ва татбиқи он” таҳти роҳбарии академики АМИТ, доктори илмҳои физикаю математика, профессор М. И. Илолов (Душанбе, солҳои 2020-2024);
- II. Семинари кафедраи анализи математикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни таҳти роҳбарии профессор Пиров Р. Н.;
- III. Конференсияи илмии байналмиллалӣ доир ба масъалаи “Комплексный анализ и его приложения”, бахшида ба бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва 75 солагии доктори илмҳои физикаю математика, профессор Қурбонов И. К. ва 70 солагии доктори илмҳои физикаю математика, профессор Чумъабой Сафаров, (г.Бохтар, 19 ноябри 2022 г.), 63-65 с.;
- IV. Конференсияи илмии байналмиллалӣ бахшида ба 70 солагии академик АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои физикаю математика, профессор Шабозов М. Ш., (Таджикистан. Душанбе, 24-25 июня 2022 г.), 234-237 с.;
- V. Конференсияи илмии байналмиллалӣ бахшида ба 70 солагии академик АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои физика-математика, профессор Бойматов К. Ҳ., (Таджикистан. Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.);
- VI. Конференсияи илмии байналмиллалӣ бахшида ба 80 солагии доктори илмҳои физика-математика, профессор Темур Собиров, (Таджикистан. Душанбе, 25-26 июня 2021 г.) ;
- VII. Конференсияи илмии байналмиллалӣ бахшида ба 70 солагии доктори илмҳои физика-математика, профессор Г.Чангибеков, (Таджикистан. Душанбе, 30-31 января 2020 г.);

VIII. Конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2020-2040”, Душанбе-2020;

IX. Конференсияи илмӣ байналмилалӣ бахшида ба 70 солагии доктори илмҳои физика-математика, профессор Қ. Тухлиев, (Таджикистан. Худжанд, 21-22 июня 2024 г.) 49-51 с.;

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Натиҷаҳои кор аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар 10 кори илмӣ, аз он ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризшаванда, ки дар рӯйхати амалкунандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, 6 мақола дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аз 120 номгӯй, ҳамагӣ 139 саҳифаи компютерио дарбар гирифта, дар барномаи Microsoft Word ҳуруфчинӣ шудааст. Барои осонии кор дар диссертатсия рақамгузориҳои секаратаи теоремаҳо, леммаҳо, натиҷаҳо ва формулаҳо қабул карда шудааст, рақами якум бо рақами боб, рақами дуюм бо рақами параграф ва рақами сеюм бо рақами тартибии теоремаҳо, леммаҳо, натиҷаҳо ва формулаҳои ҳамин параграф мутобиқат мекунанд.

БОБИ 1. ҲИСОБИ ОПЕРАТСИОНӢ

1.1. Табдилоти Лаплас

Барои ҳал намудани ҳар гуна масъалаҳои дар соҳаи техника, табиатшиносӣ, физика, химия, биофизика, математика ва ғайра мавҷудбуда вобастагии байни якчанд тағирёбандаҳоро барассӣ намудан лозим аст ([25]).

Ҳангоми омӯзиши ҳодисаҳои механикӣ, ҳодисаҳои электрикӣ, ҳодисаҳои ҳароратӣ, ҳодисаҳои рушноӣ ва ғайраҳо масъалаҳои гуногунро мушоҳида намудан мумкин аст ба монанди паҳншавии гармӣ, суръати ҳаракати ҷисм, паҳншавии лаппиш ва ғайра ([11]). Барои ҳалли масъалаҳои мазкур мафҳуми муодилаҳои дифференциалӣ, муодилаҳои интегралӣ, муодилаҳои интегро-дифференциалӣ ва ҳисоби оператсионӣ васеъ истифода бурда мешаванд ([23]).

Ҳангоми татбиқи ҳисоби оператсионӣ мо табдилотҳои интегралӣ гуногунро истифода мебарем, ки аз байни онҳо табдилоти интегралӣ Лаплас ва табдилоти интегралӣ Лаплас-Карсон мақоми алоҳида доранд. Формулаи умумии табдилоти интегралӣ Лаплас намуди зеринро дорад:

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt \quad (1.1.1)$$

дар ин ҷо $F(p)$ — функсияи тасвир (изображения) ва $f(t)$ — функсияи оригинал мебошад ([4, 106, 88, 113]). Функсияи $F(p)$ функсияи тағирбандааш комплексӣ буда, функсияи $f(t)$ функсияи тағирёбандааш ҳақиқӣ мебошад ([4, 8]). Зикр кардан бо маврид аст, ки функсияи тасвир проексияи графики функсияи дар фазои вақт мавҷудбударо дар фазои зудӣ нишон медиҳад. Бояд гуфт, ки дар баробарии (1.1.1) функсияи $f(t)$ яктағирёбанда аст ([89, 91, 30]).

Таърифи 1: *Функсияи тағирёбандааш ҳақиқии $f(t)$ функсияи оригинал номида мешавад, агар шартҳои зеринро қаноат кунад:*

1. Барои ҳар гуна $t < 0$ функсияи $f(t) = 0$ шавад.
2. Функсияи $f(t)$ дар интервали охириноки $[0, B]$ ($B > 0$) интегронидашаванда аст.
3. Функсияи $f(t)$ ҳангоми $t \rightarrow \infty$ мнҳдуд мебошад

$$|f(t)| \leq Me^{st}$$

дар ин ҷо $M > 0$, $s > 0$ ва $t \geq 0$ мебошад.

Шартҳои дар таърифи мазкур овардашударо шартҳои табдилоти Лаплас меноманд ([57, 63]).

Ҳангоми истифода намудани табдилоти Лаплас дар ҳалли ҳар гуна масъалаҳо зарурияти муайянкунии тасвири функсияи додашудаи $f(t)$ ба миён меояд ([63]).

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ, муодилаҳои интегралӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ на фақат тасвири функсия, балки тасвири ҳосилаи функсия ва тасвири интеграл низ лозим аст ([63], [3 – М]).

Қоида: Агар $f(t) \rightarrow F(p)$ бошад ва инчунин функсияҳои $f'(t), f''(t), f'''(t) \dots, f^{(n)}(t)$ низ функсияҳои ҳақиқӣ (функсияи оригинал) бошанд, он гоҳ барои дилҳо $k = 1, 2, 3, \dots, n$

$$f^{(n)}(t) \rightarrow p^n F(p) - \sum_{k=0}^{n-1} p^{n-k-1} f^{(k)}(0) \quad (1.1.2)$$

ҷой дорад, ки дар ин ҷо

$$f^{(k)}(0) = \lim_{t \rightarrow +0} f^{(k)}(t) \quad (1.1.3)$$

аст.

Баробарии (1.1.2) тасвири ҳосилаи тартиби n -уми функсияи тағирёбандааш ҳақиқии $f(t)$ мебошад ([63, 41]).

Таърифи 2: Интегралӣ намуди

$$\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$$

-ро печидан ду функсияи оригинали $f_1(t), f_2(t)$ меноманд ва чунин ишора мекунам:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau. \quad (1.1.4)$$

Тасвири интеграл (1.1.4) чунин намуд дорад ([41]):

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau \rightarrow F_1(p)F_2(p) \quad (1.1.5)$$

Ҳангоми маълум будани функсияи тасвир яъне $F(p)$ мо метавонем ба воситаи табдилоти баръаки Лаплас функсияи оригинал яъне $f(t)$ –ро муайян кунем, ки формулаи умумии табдилоти баръакси Лаплас чунин аст:

$$f(t) = L^{-1}\{F(p)\} = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\beta \rightarrow \infty} \int_{\alpha_1 - i\beta}^{\alpha_1 + i\beta} e^{pt} F(p) dp \quad (1.1.6)$$

дар ин ҷо α_1 – адади ҳақиқӣ буда, интеграл додашуда интеграл контурӣ ба шумор меравад, ки онро интеграл Бромвич-Вагнер меноманд ([1], [50]).

1.2. Табдилоти Лаплас-Карсон

Доир ба мафҳуми ҳисоби оператсионӣ олимони зиёд таҳқиқотҳои илми кардаанд. Аз ҷумла Б.Ж.Фуре, П.С.Лаплас, О.Хевисайд, Я.Меллин, Ч. Карсон ва ғайраҳо мебошанд ([20, 24, 63, 101]). Ҳангоми татбиқ намудани ҳисоби оператсионӣ дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ табдилоти Лаплас барои функсияҳои бисёртағирёбанда истифода бурда мешавад ([20, 24, 108, 113, 119]).

Формулаи умумии табдилоти Лаплас барои функсияҳои биёртағирёбанда намуди зеринро дорад:

$$F(p_1, p_2, \dots, p_n) = \int_0^\infty \int_0^\infty \dots \int_0^\infty e^{-\sum_{k=1}^n p_k x_k} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n; \quad (1.2.1)$$

дар ин ҷо $F(p_1, p_2, \dots, p_n)$ – функцияи тасвир (изображения) ва $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – функцияи оригинал мебошад ([106, 108, 113]). Бори нахуст олими Амрико Љон Карсон табдилоти Лаплас-ро таҳқиқ намуда табдилотеро барои ёфтани тасвири функцияҳои яктағирбанда ва дутағирёбанда кашф намуд, ки ин табдилот ҳоло бо номи табдилоти Лаплас-Карсон машҳур аст ([20], [21], [63]). Формулаи умумии табдилоти Лаплас-Карсон чунин мебошад:

$$F(p) = p \int_0^\infty e^{-px} f(x) dx \quad (1.2.2)$$

$$F(p, q) = pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px - qy} f(x, y) dx dy \quad (1.2.3)$$

дар ин ҷо $f(x), f(x, y)$ – функцияи оригинал (функцияи тағирбандааш ҳақиқӣ) буда, $F(p), F(p, q)$ – функцияи тасвир (изображения) мебошанд. Функцияи $F(p, q)$ – тасвири функцияи тағирёбандааш ҳақиқии $f(x, y)$ дар фазои зудӣ мебошад, ки дар ин фазо функцияи тағирёбандааш комплексӣ амал мекунад ([39, 46, 52, 85]). Ҳамаи хосиятҳои функцияи ҳақиқӣ ва функцияи тасвир, ки дар табдилоти Лаплас ба мо маълум аст ([20], [71], [90], [91], [108]) барои табдилоти Лаплас-Карсон низ ҷой доранд. Баъзеи хосиятҳоро меорем:

1. Қоидаи монандӣ: Агар $f(x, y) \Rightarrow F(p, q)$ бошад он гоҳ

$$f(ax, by) \Rightarrow F\left(\frac{p}{a}, \frac{q}{b}\right) \text{ мешавад. } (a > 0, b > 0)$$

2. Қоидаи дифференсиронӣ: Агар $f(x, y) \Rightarrow F(p, q)$ бошад он гоҳ

$$(f(x, y))'_x \Rightarrow p[F(p, q) - F_1(q)] \text{ ва } (f(x, y))'_y \Rightarrow q[F(p, q) - F_2(p)]$$

мешавад. Дар ин ҷо $F_1(q) \leftarrow f_1(y) = f(0, y)$ ва $F_2(p) \leftarrow f_2(x) = f(x, 0)$ мебошад ([4], [20], [26]).

Инчунин барои функсияи дутағирёбанда низ теорема оид ба печида чой дорад, ки онро баён хоҳем кард ([3], [20], [42], [78], [108]).

Теорема: *Тасвири печида гуфта ҳосили зарби тасвири ду функсияи ҳақиқии $f_1(x, y)$, $f_2(x, y)$ -ро меноманд, ки намуди он чунин аст:*

$$\begin{aligned} f_1(x, y) * f_2(x, y) &= \int_0^x \int_0^y f_1(\xi, \eta) f_2(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \\ &\Rightarrow \frac{1}{pq} F_1(p, q) F_2(p, q) \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

Метавонем ҳар яке аз ин тағйирёбандаҳоро дар алоҳиддаги низ ифода кунем:

$$f_1(x, y) * f_2(x, y) = \int_0^x f_1(\xi, y) f_2(x - \xi, y) d\xi$$

$$f_1(x, y) * f_2(x, y) = \int_0^y f_1(x, \eta) f_2(x, y - \eta) d\eta$$

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки исботи теоремаи мазкур барои мо маълум аст ([20], [71]).

1.2.1. Тасвири баъзе функсияҳо

Бо истифода аз табдилоти Лаплас-Карсон тасвири баъзе функсияҳоро меёбем, ки ҳар яке аз ин функсияҳо дар ҳалли муодилаҳои гуногун ба монанди муодилаи транспорт бо манбаи хаттӣ, муодилаи телеграф, муодилаи гармигузаронӣ ва ғайраҳо татбиқи васеи амали доранд ([1 – M], [2 – M]).

Тасвири функсияи $e^{-cx} \varphi'_t(t - x) + \varphi(0)e^{-cx} \delta(t - x)$ –ро дида мебароем.

Сараввал бояд қайд намуд, ки c – адади ҳақиқии ихтиёри мебошад. Барои ёфтани тасвири функсияи мазкур формулаи (1.2.3) –ро истифода мебарем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px - qt} (e^{-cx} \varphi'_t(t - x) + \varphi(0)e^{-cx} \delta(t - x)) dx dt$$

гузориши $t - x = z$; $t = z + x$; $dt = dz$ -ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qz-qx-cx} [\varphi_z'(z) + \varphi(0)\delta(z)] dx dz =$$

баробарино табдил медиҳем

$$\begin{aligned} & \left(q \int_0^{\infty} e^{-qz} [\varphi_z'(z) + \varphi(0)\delta(z)] dz \right) \left(p \int_0^{\infty} e^{-px-qx-cx} dx \right) = \\ & \left(q \int_0^{\infty} e^{-qz} \varphi_z'(z) dz + \varphi(0)q \int_0^{\infty} e^{-qz} \delta(z) dz \right) \left(p \int_0^{\infty} e^{-(p+q+c)x} dx \right) = \end{aligned}$$

барои идомаи ҳал тасвири функсияи Дирак ([20]) ва тасвири ҳосилаи функсияи яктағирёбандаро ([21, 113]) дар қавси якум гузошта ва интеграл

ғайрихосӣ дар қавси дуюм мавҷудбударо ҳисоб мекунем

$$\begin{aligned} & (q\Phi(q) - q\varphi(0) + q\varphi(0)) \left(p \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-(p+q+c)x} dx \right) = \\ & q\Phi(q) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{pe^{-(p+q+c)x}}{p+q+c} \right) \Big|_0^R = \\ & q\Phi(q) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{pe^{-(p+q+c)R}}{p+q+c} - \left(-\frac{pe^{-(p+q+c) \cdot 0}}{p+q+c} \right) \right) = \end{aligned}$$

акнун ҳудуди дар баробари мавҷудбударо ҳисоб менамоем

$$\begin{aligned} & q\Phi(q) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{p}{p+q+c} \cdot e^{-(p+q+c)R} + \frac{pe^0}{p+q+c} \right) = \\ & q\Phi(q) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{p}{p+q+c} \cdot \frac{1}{e^{(p+q+c)R}} + \frac{p}{p+q+c} \right) = \\ & \frac{p}{p+q+c} \cdot q\Phi(q) \cdot \left(-\frac{1}{e^{(p+q+c) \cdot \infty}} + 1 \right) = \end{aligned}$$

$$\frac{p}{p+q+c} \cdot q\Phi(q) \cdot \left(-\frac{1}{\infty} + 1\right) = \frac{pq\Phi(q)}{p+q+c} \cdot (0+1) = \frac{pq\Phi(q)}{p+q+c}$$

Яъне

$$e^{-cx}\varphi'_t(t-x) + \varphi(0)e^{-cx}\delta(t-x) \Rightarrow \frac{pq\Phi(q)}{p+q+c} \quad (1.2.5)$$

Зикр кардан бо маврид аст, ки исботи формулаи мазкур дар ҳолати $c = 0$ ва $\varphi(0) = 0$ будан аз тарафи олимони рус низ муайян карда шудааст ([20, 66, 71, 75, 108]). Баробарии (1.2.5) барои ихтиёри адади c ва қимати ихтиёрии $\varphi(0)$ ҷой дорад.

Тасвири функцияи $e^{-mt}u_{0x}'(x-t) + u_0(0)e^{-mt}\delta(x-t)$ –ро дида мебароем.

Дар ибтидо ҳаминро қайд менамоем, ки m –адади ҳақиқии ихтиёри мебошад. Барои ёфтани тасвири функцияи додашуда формулаи (1.2.3) –ро истифода мебарем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qt} (e^{-mt}u_{0x}'(x-t) + u_0(0)e^{-mt}\delta(x-t)) dx dt$$

гузориши $x - t = z$; $x = z + t$; $dx = dz$ –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-p(z+t)-qt-mt} (u_0'(z) + u_0(0)\delta(z)) dz dt =$$

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-pz-pt-qt-mt} (u_0'(z) + u_0(0)\delta(z)) dt dz =$$

$$\left(p \int_0^{\infty} e^{-pz} (u_0'(z) + u_0(0)\delta(z)) dz \right) \left(q \int_0^{\infty} e^{-pt-qt-mt} dt \right) =$$

$$\left(p \int_0^\infty e^{-pz} u_0'(z) dz + u_0(0) p \int_0^\infty e^{-pz} \delta(z) dz\right) \left(q \int_0^\infty e^{-pt-qt-mt} dt\right) =$$

$$(pU_0(p) - pu_0(0) + pu_0(0)) \left(q \int_0^\infty e^{-(p+q+m)t} dt\right) =$$

акнун интеграли ғайрихоси дар кавси дуюм мавҷудбударо ҳисоб намуда, сипас ҳосили зарби кавсҳоро муайян мекунем

$$pqU_0(p) \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_0^R e^{-(p+q+m)t} dx \right) =$$

бо истифода аз татбиқи формулаи Нютон-Лейбнитс ҳосил мекунем

$$pqU_0(p) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+m)t}}{p+q+m} \right) \Big|_0^R =$$

$$pqU_0(p) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+m) \cdot R}}{p+q+m} - \left(-\frac{e^{-(p+q+m) \cdot 0}}{p+q+m} \right) \right) =$$

$$pqU_0(p) \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{p+q+m} \cdot e^{-(p+q+m) \cdot R} + \frac{e^0}{p+q+m} \right) =$$

$$pqU_0(p) \cdot \left(-\frac{1}{p+q+m} \cdot e^{-(p+q+m) \cdot \infty} + \frac{1}{p+q+m} \right) =$$

$$\frac{1}{p+q+m} \cdot pqU_0(p) \cdot \left(-\frac{1}{e^{(p+q+m) \cdot \infty}} + 1 \right) = \frac{pqU_0(p)}{p+q+m} \cdot (0+1) = \frac{pqU_0(p)}{p+q+m}$$

Яъне

$$e^{-mt} u_{0x}'(x-t) + u_0(0) e^{-mt} \delta(x-t) \Rightarrow \frac{pqU_0(p)}{p+q+m} \quad (1.2.6)$$

Бояд ёдовар шуд, ки исботи формулаи мазкур дар ҳолати $m=0$, $u_0(0)=0$ будан аз тарафи олимон муайян карда шудааст ([20, 71, 75, 108, 43]). Ва

инчунин ҳангоми яктағирёбанда будан низ тасвири функция аз тарафи олимон барассй гардидааст ([63], [67], [37]).

Тасвири функцияи $e^{-bt-cx}f(t-x)$ –ро дида мебароем

Формулаи (1.2.3)-ро истифода намуда тасвири функцияро меёбем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qt} \cdot e^{-bt-cx} f(t-x) dx dt =$$

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(p+c)x-(q+b)t} f(t-x) dx dt$$

гузориши $t-x=z$; $dt=dz$ –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} e^{-(p+c)x-(q+b)(z+x)} f(z) dz =$$

$$pq \int_0^{\infty} e^{-(q+b)z} f(z) dz \int_0^{\infty} e^{-(p+c)x-(q+b)x} dx =$$

баробарии мазкурро табдил дода ҳосил мекунем

$$= \frac{pq}{q+b} \left((q+b) \int_0^{\infty} e^{-(q+b)z} f(z) dz \right) \left(\int_0^{\infty} e^{-(p+q+b+c)x} dx \right) =$$

бо ёрии формулаи (1.2.2) ҳосил мекунем

$$\frac{pq}{q+b} \cdot F(q+b) \cdot \left(\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-(p+q+b+c)x} dx \right) =$$

$$\frac{pqF(q+b)}{q+b} \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+b+c)x}}{p+q+b+c} \right) \Big|_0^R =$$

$$\frac{pqF(q+b)}{q+b} \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+b+c)R}}{p+q+b+c} + \frac{e^{-(p+q+b+c) \cdot 0}}{p+q+b+c} \right) = \frac{pqF(q+b)}{(q+b)(p+q+b+c)}$$

Яъне

$$e^{-bt-cx} f(t-x) \Rightarrow \frac{pqF(q+b)}{(q+b)(p+q+b+c)} \quad (1.2.7)$$

Тасвири функцияи $e^{-bt-cx} f(x-t)$ –ро дида мебароем

Формулаи (1.2.3)-ро истифода намуда тасвири функцияи мазкурро меёбем

$$\begin{aligned} pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \cdot e^{-bt-cx} f(x-t) dx dt = \\ pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(p+c)x-(q+b)t} f(x-t) dx dt = \end{aligned}$$

гузориши $x-t=z$; $dx=dz$ –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} pq \int_0^\infty dt \int_0^\infty e^{-(p+c)(z+t)-(q+b)t} f(z) dz = \\ pq \int_0^\infty e^{-(p+c)z} f(z) dz \int_0^\infty e^{-(p+c)t-(q+b)t} dt = \\ = \frac{pq}{p+c} \left((p+c) \int_0^\infty e^{-(p+c)z} f(z) dz \right) \int_0^\infty e^{-(p+q+b+c)t} dt \\ = \frac{pqF(p+c)}{(p+c)(p+q+b+c)} \end{aligned}$$

Яъне

$$e^{-bt-cx} f(x-t) \Rightarrow \frac{pqF(p+c)}{(p+c)(p+q+b+c)} \quad (1.2.8)$$

Тасвири функсияи $e^{-bt-cx}f(|x-t|)$ –ро дида мебароем

Чи тавре мо медонем ([71])

$$e^{-bt-cx}f(|x-t|) = e^{-bt-cx}(f(x-t) + f(t-x))$$

мебошад. Бинобар ин формулаҳои (1.2.7), (1.2.8) –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$e^{-bt-cx}f(|x-t|) \Rightarrow \frac{pqF(q+b)}{(q+b)(p+q+b+c)} + \frac{pqF(p+c)}{(p+c)(p+q+b+c)}$$

Яъне

$$e^{-bt-cx}f(|x-t|) = \frac{pq}{p+q+b+c} \left(\frac{F(q+b)}{q+b} + \frac{F(p+c)}{p+c} \right) \quad (1.2.9)$$

Ҳангоми $c = 0$ будан баробарии (1.2.9) чунин намуд мегирад:

$$\begin{aligned} e^{-bt}f(|x-t|) &\Rightarrow \frac{pqF(q+b)}{(q+b)(p+q+b)} + \frac{pqF(p)}{p(p+q+b)} \\ &= \frac{q}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) + (q+b)F(p)}{p+q+b} \end{aligned}$$

Яъне

$$e^{-bt}f(|x-t|) \Rightarrow \frac{q}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) + (q+b)F(p)}{p+q+b} \quad (1.2.10)$$

Тасвири функсияи $e^{-bt-cx}f(x+t)$ –ро дида мебароем

Формулаи (1.2.3)-ро истифода намуда тасвири функсияи мазкурро меёбем

$$\begin{aligned} pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \cdot e^{-bt-cx} f(t+x) dx dt &= \\ pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(p+c)x-(q+b)t} f(t+x) dx dt &= \end{aligned}$$

гузориши $t + x = z$; $dx = dz$ —ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
 & pq \int_0^{\infty} \int_0^z e^{-(p+c)(z-t)-(q+b)t} f(z) dz dt = \\
 & pq \int_0^{\infty} e^{-(p+c)z} f(z) dz \int_0^z e^{(p-q-b+c)t} dt = \\
 & = \frac{pq}{p+c} \left((p+c) \int_0^{\infty} e^{-(p+c)z} f(z) dz \right) \left(\frac{e^{(p-q-b+c)t}}{p-q-b+c} \Big|_0^z \right) =
 \end{aligned}$$

бо истифода аз формулаи (1.2.2) ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
 & \frac{pq}{p-q-b+c} \left(\int_0^{\infty} e^{-(p+c)z} (e^{(p-q-b+c)z} - 1) f(z) dz \right) = \\
 & \frac{pq}{p-q-b+c} \left(\int_0^{\infty} (e^{-(q+b)z} - e^{-(p+c)z}) f(z) dz \right) = \\
 & = \frac{pq}{p-q-b+c} \cdot \frac{1}{q+b} \left((q+b) \int_0^{\infty} e^{-(q+b)z} f(z) dz \right) - \\
 & - \frac{pq}{p-q-b+c} \cdot \frac{1}{p+c} \left((p+c) \int_0^{\infty} e^{-(p+c)z} f(z) dz \right) = \\
 & \frac{pq}{p-q-b+c} \cdot \frac{F(q+b)}{q+b} - \frac{pq}{p-q-b+c} \cdot \frac{F(p+c)}{p+c} = \\
 & \frac{pq}{p-q-b+c} \left(\frac{F(q+b)}{q+b} - \frac{F(p+c)}{p+c} \right)
 \end{aligned}$$

Яъне

$$e^{-bt-cx}f(t+x) \Rightarrow \frac{pq}{p-q-b+c} \left(\frac{F(q+b)}{q+b} - \frac{F(p+c)}{p+c} \right) \quad (1.2.11)$$

Ҳангоми $c = 0$ –будан баробарии (1.2.11) намуди зеринро мегирад

$$e^{-bt}f(t+x) \Rightarrow \frac{q}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)} \quad (1.2.12)$$

Ҳаминро қайд менамоем, ки баробариҳои (1.2.7), (1.2.8), (1.2.9), (1.2.10), (1.2.11) ва (1.2.12) дар роҳнамоҳои ҳисоби оператсионӣ дар шаклҳои гуногун бе исбот оварда шудааст ва дар рисолаи мазкур исботи ҳар яке аз ин формулаҳоро дар намуди умумӣ дар пурраги нишон додем ([21, 37, 38]).

Ҷадвали 1.2.1. Тасвири баъзе функсияҳо

№	$f(x, t) \quad (x > 0; t > 0)$	$F(p, q)$
1	$e^{-lt}u_1(x-t)$	$\frac{qU_1(p)}{p+q+l}$
2	$e^{-mt}u_{0x}'(x-t) + u_0(0)e^{-mt}\delta(x-t)$	$\frac{pqU_0(p)}{p+q+m}$
3	$e^{-bx}\varphi_2(t-x)$	$\frac{p\Phi_2(q)}{p+q+b}$
4	$e^{-cx}\varphi_t'(t-x) + \varphi(0)e^{-cx}\delta(t-x)$	$\frac{pq\Phi(q)}{p+q+c}$
5	$e^{-bt-cx}f(t+x)$	$\frac{pq}{p-q-b+c} \left(\frac{F(q+b)}{q+b} - \frac{F(p+c)}{p+c} \right)$
6	$e^{-bt}f(x-t)$	$\frac{q}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) + (q+b)F(p)}{p+q+b}$
7	$e^{-bt-cx}f(x-t)$	$\frac{pq}{p+q+b+c} \left(\frac{F(q+b)}{q+b} + \frac{F(p+c)}{(p+c)} \right)$
8	$e^{-bt-cx}f(x-t)$	$\frac{pqF(p+c)}{(p+c)(p+q+b+c)}$
9	$e^{-bt-cx}f(t-x)$	$\frac{pqF(q+b)}{(q+b)(p+q+b+c)}$

1.2.2. Тасвири баъзе интегралҳо

Бо истифода аз табдилоти Лаплас-Карсон на фақат тасвири функцияҳо балки тасвири интегралҳоро низ ёфтан мумкин аст ([32, 108, 102, 17, 34, 69]). Олимони шуравӣ В. А. Диткин ва дигарон барои муайянкунии тасвири баъзе функцияҳо ва интегралҳо таҳқиқотҳои илми кардаанд ([20]). Номбурдаҳо дар сарсухани китобашон бо унвони «Ҳисоби оператсионӣ барои функцияҳои дутағйирёбанда» қайд мекунанд: “Дар ин китоб ҳисоби оператсионии функцияҳои дутағйирёбанда ба воситаи табдилоти Лаплас оварда шудааст. Тавре маълум аст, ҳисоби оператсионӣ дар соҳаҳои гуногуни таҳқиқоти илмӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ шумораи зиёди корҳо ба табъ расидааст, ки ба назария ва амалияи ҳисоби оператсионии функцияҳои яктағйирёбанда бахшида шудаанд. Нисбат ба ҳисоби оператсионии дутағйирёбанда бошад шумораи хеле ночизи мақолаҳо чоп шуда, адабиёти монографӣ комилан нокифоя мебошад. Чунин ҳолати кор муаллифони водор мекунад, ки натиҷаҳои асосии ҳисоби оператсионии дутағйирёбандаро дар намуди китоби алоҳида пешниҳод намоянд” ([20], сах.5).

Тасвири баъзе интегралҳоеро дида мебароем, ки то ҳол аз тарафи олимони муайян карда нашудааст.

Тасвири интегралҳои намуди $\int_0^t a(t-\tau) u(x,\tau) d\tau$ -ро дида мебароем.

Зикр кардан бо маврид аст, ки тасвири интегралҳои мазкур ҳангоми $u(x,\tau)$ - функцияи яктағйирёбанда будан аз тарафи олимони тавассути табдилоти Лаплас муайян карда шудааст ([63], [71], [49]) ва ҳоло мо тасвири интегралҳои мазкурро тавассути табдилоти Лаплас-Карсон муайян хоҳем кард.

Теорема 1.2.1: Бигзор функцияҳои $a(t), u(x,t)$ шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноаткунанда бошанд, он гоҳ ҳангоми $x > 0, t > 0$ будан тасвири интегралҳои мазкур чунин мешавад:

$$\int_0^t a(t-\tau) u(x, \tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) U(p, q)$$

Исбот: Барои исботи теоремаи мазкур тасвири интегралӣ додашударо бо воситаи табдилоти Лаплас –Карсон муайян мекунем

$$\begin{aligned} & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^t a(t-\tau) u(x, \tau) d\tau \right) dx dt = \\ & = pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px} u(x, \tau) \left(\int_\tau^\infty a(t-\tau) e^{-qt} dt \right) dx d\tau = \end{aligned}$$

гузориши $t - \tau = z$; $t = z + \tau$; $dt = dz$ –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & = pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-q\tau} u(x, \tau) \left(\int_0^\infty a(z) e^{-qz} dz \right) dx d\tau = \\ & \left(pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-q\tau} u(x, \tau) dx d\tau \right) \cdot \left(\frac{1}{q} \left(q \int_0^\infty a(z) e^{-qz} dz \right) \right) = \end{aligned}$$

тасвири функцияҳои дар ҳар ду қавс мавҷудбуда барои мо аз баробариҳои (1.2.3), (1.2.2) маълум аст ([20], [108]) онҳоро ба баробари гузошта ҳосил мекунем

$$\left(pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-q\tau} u(x, \tau) dx d\tau \right) \cdot \left(\frac{1}{q} \left(q \int_0^\infty a(z) e^{-qz} dz \right) \right) = \frac{1}{q} A(q) U(p, q)$$

Яъне

$$\int_0^t a(t-\tau) u(x, \tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) U(p, q) \quad (1.2.13)$$

мебошад.

Ҳамин тавр теорема исбот шуд.

Чи тавре мо медонем ([21])

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \Rightarrow p[U(p, q) - \Phi(q)]$$

мебошад. Бинобар ин ҳангоми $u(x, t) = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$ будан баробарии (1.2.13)

намуди зеринро мегирад:

$$\int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial u(x, \tau)}{\partial x} d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} \cdot A(q) \cdot p[U(p, q) - \Phi(q)] \quad (1.2.14)$$

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар ҳолати $u(x, t) = u_1(x)u_2(t)$ будан баробарии (1.2.13) чунин мешавад:

$$\int_0^t a(t - \tau) u_1(x)u_2(t) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} \cdot A(q) \cdot U_1(p) \cdot U_2(q) \quad (1.2.15)$$

ва инчунин ҳангоми $u(x, t) = u_3(t)$ будан ҳосил мекунем

$$\int_0^t a(t - \tau) u_3(\tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) U_3(q) \quad (1.2.16)$$

Тасвири интегралӣ намуди

$$\int_0^{\min(x, t)} f_1(s) f_2(x - s, t - s) ds$$

-ро дида мебароем

Сараввал ҳаминро қайд бояд кард, ки тасвири интегралӣ мазкур тавассути табдилоти Лаплас дутағирёбанда аз тарафи олимон муайян карда шудааст ([20]) ва ҳоло мо тавассути табдилоти Лаплас-Карсон муайян хоҳем кард.

Теорема 1.2.2: Бигзор функцияҳои $f_1(x), f_1(t), f_2(x, t)$ шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноаткунанда бошанд, он гоҳ ҳангоми $x > 0, t > 0$ будан тасвири интегралӣ мазкур чунин мешавад:

$$\int_0^{\min(x,t)} f_1(s)f_2(x-s, t-s)\partial s \Rightarrow \frac{F_1(p+q)F_2(p,q)}{p+q}$$

Исбот: Барои исботи теоремаи мазкур тасвири интегралӣ додашударо бо воситаи табдилоти Лаплас –Карсон муайян мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} f_1(s)f_2(x-s, t-s)\partial s \right) dxdt =$$

барои идома ёфтани амалиёт гузориши $t-s=v$; $x-s=u$ -ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty f_1(s) f_2(u; v) ds \right) dudv = \\ & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} f_2(u; v) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} f_1(s) ds = \\ & \left(pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} f_2(u; v) dudv \right) \cdot \frac{1}{p+q} \left((p+q) \int_0^\infty e^{-(p+q)s} f_1(s) ds \right) = \end{aligned}$$

формулаҳои (1.2.2) ва (1.2.3) –ро истифода намуда ҳосил менамоем

$$F_2(p,q) \cdot \frac{1}{p+q} \cdot F_1(p+q) = \frac{F_1(p+q)F_2(p,q)}{p+q}$$

Ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} f_1(s)f_2(x-s, t-s)\partial s \Rightarrow \frac{F_1(p+q)F_2(p,q)}{p+q} \quad (1.2.17)$$

Баробарии (1.2.17)-ро дар шакли муфасссал чунин менависанд:

$$\int_0^{\min(x,t)} f_1(s)f_2(x-s,t-s)\partial s = \begin{cases} \int_0^t f_1(s)f_2(x-s,t-s)\partial s & \text{ҳангоми } x > t \\ \int_0^x f_1(s)f_2(x-s,t-s)\partial s & \text{ҳангоми } x < t \end{cases}$$

Чи тавре мо медонем ([21], [75], [72])

$$e^{-bt} \rightarrow \frac{p}{p+b}$$

мебошад. Бинобар ин ҳангоми $f_1(s) = e^{-bs}$ будан баробарии (1.2.17) намуди зеринро мегирад:

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} f(x-s,t-s)\partial s \Rightarrow \frac{\frac{p+q}{p+q+b} F(p,q)}{p+q} = \frac{(p+q)F(p,q)}{(p+q)(p+q+b)} = \frac{F(p,q)}{p+q+b}$$

Яъне

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} f(x-s,t-s)\partial s \Rightarrow \frac{F(p,q)}{p+q+b} \quad (1.2.18)$$

Баробарии (1.2.18) дар ҳолати $b = 0$ будан аз тарафи олимон бо дигар тарзу усул муайян карда шудааст ([20]). Мо метавонем бо истифода аз тадбиқи теоремаи зарб (умножения) ва теоремаи кучиш (сдвига) баробарии (1.2.18)-ро аз баръакс дида бароем ва ҳоло мо барои ихтиёри адади ҳақиқии b функсияи ҳақиқии f ҳоҳем кард. Барои ёфтани функсияи ҳақиқии f ба тасвири

функсияи $\frac{F(p,q)}{p+q+b}$ мувофиқбуда яке аз тағирёбандаҳоро доими шуморида бо истифода аз теоремаи зарб (умножения) ҳосил мекунем ([108]):

$$\begin{aligned}\frac{F(p,q)}{p+q+b} &= \frac{p}{p+q+b} \overset{x}{\underset{*}{\frown}} \frac{F(p,q)}{p} = e^{-(q+b)x} \overset{x}{\underset{*}{\frown}} F(x,q) = \\ &= \int_0^x e^{-(q+b)s} F(x-s,q) ds\end{aligned}$$

акнун теоремаи кучиш (сдвига)-ро истифода намуда хуллосаи зерин мебарорем ([20], [26]).

$$\begin{aligned}e^{-(q+b)s} F(x-s,q) &= \\ &= e^{-bs} e^{-qs} F(x-s,q) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{барои } t < s \\ e^{-bs} f(x-s, t-s) & \text{барои } t > s \end{cases}\end{aligned}$$

аз руи ин хуллосаҳо формулаи умумиро ҳосил мекунем

$$\frac{F(p,q)}{p+q+b} \Leftarrow \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} f(x-s, t-s) ds$$

Ҳамин тавр тавассути ду тарз низ якхел натиҷа ба даст овардем.

Тасвири интегралҳои зеринро меёбем, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau$$

Сараввал таъкид менамоям, ки тасвири интегралҳои мазкур то ҳол аз тарафи ягон олим муайян карда нашудааст.

Теорема 1.2.3: Бигзор функсияҳои $a(t), f(x,t)$ шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноаткунанда бошанд, он гоҳ ҳангоми $x > 0, t > 0$ будан тасвири интегралҳои мазкур чунин мешавад:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \Rightarrow \frac{A(q)F(p;q)}{q(p+q+a_1)}$$

Исбот: Бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интеграл мазкурро меёбем, ки то ҳол аз тарафи олимон муайян карда нашудааст

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) dx dt =$$

гузориши $x-s=u$; $t-s=v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) du dv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \right) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

чи тавре аз баробарии (1.2.17) мебинем

$$\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q)F(p,q)$$

мебошад, бинобар ин бо истифода аз баробарии зерин ҳосил мекунем

$$\frac{1}{q} A(q)F(p,q) \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+a_1)s}}{p+q+a_1} \Big|_0^R \right) = \frac{1}{q} A(q)F(p,q) \cdot \frac{1}{p+q+a_1}$$

Ҳамин тавр тасвири интеграл мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \Rightarrow \frac{A(q)F(p;q)}{q(p+q+a_1)} \quad (1.2.19)$$

Зикр кардан бо маврид аст, ки баробарии (1.2.19) дар ҳолати хусусӣ намуди зеринро мегирад:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s) g(\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \Rightarrow \frac{F(p)G(q)A(q)}{q(p+q+a_1)} \quad (1.2.20)$$

Тасвири интегралӣ намуди

$$\int_0^t e^{-(b_0 t + a_0 s)} u_0(x-s) ds$$

-ро дида мебароем

Формулаи умумии табдилоти Лаплас-Карсон барои функсияи дута-ғирёбандаро истифода намуда тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$\begin{aligned} & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^t e^{-(b_0 t + a_0 s)} u_0(x-s) ds \right) dx dt = \\ & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^t e^{-b_0(t-s)-b_0 s - a_0 s} u_0(x-s) ds \right) dx dt = \\ & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^t e^{-b_0(t-s)} \cdot e^{-b_0 s - a_0 s} u_0(x-s) ds \right) dx dt = \\ & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-b_0 s - a_0 s} u_0(x-s) \left(\int_s^\infty e^{-b_0(t-s)} \cdot e^{-qt} dt \right) dx ds = \end{aligned}$$

гузориши $t-s=z$, $dt=dz$ —ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qs} \cdot e^{-b_0s-a_0s} u_0(x-s) \left(\int_0^{\infty} e^{-b_0z} \cdot e^{-qz} dz \right) dx ds =$$

$$\left(pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qs} \cdot e^{-(a_0+b_0)s} u_0(x-s) dx ds \right) \cdot \left(\frac{1}{q} \left(q \int_0^{\infty} e^{-qz} \cdot e^{-b_0z} dz \right) \right)$$

тасвири функцияи дар ҳар ду қавс мавҷудбуда алакай барои мо маълум мебошад ([32], [63], [38]) ва онҳоро дар ҷойҳояшон гузошта ҳосил мекунем

$$= \left(\frac{q}{p+q+a_0+b_0} U_0(p) \right) \cdot \left(\frac{1}{q} \cdot \frac{q}{q+b_0} \right) = \frac{q U_0(p)}{(q+b_0)(p+q+a_0+b_0)}$$

ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум карда шуд, ки он чунин аст:

$$\int_0^t e^{-(b_0t+a_0s)} u_0(x-s) ds \Rightarrow \frac{q U_0(p)}{(q+b_0)(p+q+a_0+b_0)} \quad (1.2.21)$$

Тасвири интегралӣ намуди

$$r_1(x, t) = \frac{1}{c} \int_0^t (e^{-ls} - e^{-ct+(c-l)s}) u_0(x-s) ds; c \neq 0$$

-ро дида мебароем

Формулаи умумии табдилотро оварда тасвири интегралӣ додашударо меёбем ва чи гунае, ки аён аст интегралӣ мазкур аз параметр вобаста мебошад ([16]).

$$R_1(p, q) = pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qt} r_1(x, t) dx dt =$$

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qt} \left(\frac{1}{c} \int_0^t (e^{-ls} - e^{-ct+(c-l)s}) u_0(x-s) ds \right) dx dt =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\frac{1}{c} \int_0^t e^{-ls} (1 - e^{-c(t-s)}) u_0(x-s) ds \right) dx dt =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-ls} u_0(x-s) \left(\int_s^\infty \frac{1 - e^{-c(t-s)}}{c} \cdot e^{-qt} dt \right) dx ds =$$

хамин тавр интегралӣ ғайрихосро пайдо намудем ([8], [11]) ва барои ҳисоб намудани он гузориши $t - s = z$, $dt = dz$ –ро истифода мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qs} \cdot e^{-ls} u_0(x-s) \left(\int_0^\infty \left(\frac{1 - e^{-cz}}{c} \right) \cdot e^{-qz} dz \right) dx ds =$$

$$\left[pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qs} \cdot e^{-ls} u_0(x-s) dx ds \right] \cdot \left[\frac{1}{q} \left(q \int_0^\infty e^{-qz} \cdot \left(\frac{1 - e^{-cz}}{c} \right) dz \right) \right] =$$

тасвири функсияи дар ҳар ду қавси мавҷудбуда алақай бар мо маълум аст ([71], [21]) ва онҳоро дар ҷойҳояшон гузошта ҳосил мекунем

$$\left[\frac{qU_0(p)}{p+q+l} \right] \cdot \left[\frac{1}{q} \cdot \frac{1}{q+c} \right] = \frac{1}{q(q+c)} \cdot \frac{qU_0(p)}{p+q+l} = \frac{U_0(p)}{(q+c)(p+q+l)}$$

хамин тавр тасвири интеграл маълум карда шуд, ки он чунин аст:

$$\frac{1}{c} \int_0^t (e^{-ls} - e^{-ct+(c-l)s}) u_0(x-s) ds \Rightarrow \frac{1}{(q+c)(p+q+l)} U_0(p) \quad (1.2.22)$$

дар ин ҷо c , l - ададҳои ҳақиқии ихтиёри буда, инчунин $c \neq 0$ аст.

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем

$$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s)) e^{-bs} f(x+s) ds$$

дар ин чо $\delta(t), h(t)$ - функсияи умумикардасуда мебошанд ([54], [56]).

Теорема 1.2.4: Бигзор функсияҳои $f(x)$ шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноаткунанда бошанд, он гоҳ ҳангоми $x > 0, t > 0$ будан тасвири интегралӣ мазкур чунин мешавад:

$$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x+s)ds \Rightarrow \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)}$$

Исбот: Формулаи умумии табдилоти Лаплас-Карсон барои функсияи дутағирёбандаро истифода намуда тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x+s)ds \right) dx dt$$

гузориши $t-s=z$; $dt=dz$ –ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\left(pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qs} \cdot e^{-bs} f(x+s) dx ds \right) \cdot \left(\frac{1}{q} \left(q \int_0^\infty (\delta(z) + bh(z)) e^{-qz} dz \right) \right)$$

Ҳамин тавр интегралҳои ғайрихосро пайдо кардем ([27], [28]). Чи тавре мо медонем тасвири функсияи қавси дуюм барои мо маълум мебошад ([38], [24], [108]) ва тасвири функсияи қавси якум аз формулаи (1.2.12) бар маълум аст. (ба қадвали 1.2.1. ва 1.2.2. нигаред) Ҳамин тавр тасвирҳоро гузошта ҳосил мекунем

$$\left(\frac{q}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)} \right) \cdot \left(\frac{q+b}{q} \right) = \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)}$$

Яъне

$$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x+s)ds \Rightarrow \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)} \quad (1.2.23)$$

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем

$$\int_0^{\min(x,t)} (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x-s)ds$$

Чи тавре аз баробарии (1.2.17) мо мебинем

$$\int_0^{\min(x,t)} f_1(s)f_2(x-s)f_3(t-s)ds \Rightarrow \frac{F_1(p+q)F_2(p)F_3(q)}{p+q} \quad (1.2.24)$$

мебошад. Дар интеграле, ки мо тасвирашро ҷустуҷӯ карда истодаем

$$f_1(t) = e^{-bt} \rightarrow \frac{q}{q+b}$$

$$f_2(x) = f(x) \rightarrow F(p)$$

$$f_3(t) = (\delta(t) + bh(t)) \rightarrow q+b$$

мебошад ([20], [75], [5]). Тасвирхоро ба баробарии (1.2.24) гузошта ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \int_0^{\min(x,t)} (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x-s)ds &\Rightarrow (q+b) \cdot \frac{p+q}{p+q+b} \cdot \frac{F(p)}{p+q} \\ &= \frac{(q+b)F(p)}{p+q+b} \end{aligned}$$

Яъне

$$\int_0^{\min(x,t)} (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(x-s)ds \Rightarrow \frac{(q+b)F(p)}{p+q+b} \quad (1.2.25)$$

Оё тасвири интегралӣ мазкур дуруст навишта шудааст?

$$\int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s)ds - \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s)ds \Rightarrow \frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)}$$

Барои ҷавоб гуфтан ба ин савол масъаларо аз баръакс таҳлил мекунем ва ҳамин тавр ифодаро содда намуда ҳосил мекунем

$$\frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} = \frac{\Phi_2(q)}{q+b} - \frac{\Phi_2(q)}{p+q+b} = \frac{\Phi_2(q)}{q+b} - \frac{H(p)\Phi_2(q)}{p+q+b}$$

Чи тавре аз баробарии (1.2.24) мо мебинем тасвири интегралӣ намуди

$$\int_0^{\min(x;t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds$$

чунин аст:

$$\int_0^{\min(x;t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds \Rightarrow \frac{H(p)\Phi_2(q)}{p+q+b}$$

дар ин ҷо $h(x)$ – функсияи Хевисайд буда ([56]), тасвири он тавассути табдилоти Лаплас-Карсон чунин мебошад:

$$h(x) \rightarrow 1 = H(p)$$

ва инчунин чи гунае, ки аз баробарии (1.2.24) мо мебинем

$$\int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds \Rightarrow \frac{\Phi_2(q)}{q+b}$$

мебошад ([31], [32]).

Яъне

$$\int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds - \int_0^{\min(x;t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds \Rightarrow \frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} \quad (1.2.26)$$

мешавад. Ҳамин тавр маълум шуд, ки тасвири интегралӣ мазкур дуруст навишта шудааст.

Тасвири интегралеро меёбем, ки ядрояш суммаи функцияҳои умумикардашуда мебошанд

$$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(s) ds$$

Формулаи табдилоти Лаплас-Карсон барои функцияҳои яктағирбандаро истифода намуда ([20], [21], [71]) тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$q \int_0^{\infty} e^{-qt} \left(\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(s) ds \right) dt =$$

гузориши $t - s = z$; $dt = dz$ —ро истифода намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} q \int_0^{\infty} e^{-q(z+s)} \int_s^t (\delta(z) + bh(z))e^{-bs} f(s) ds dz = \\ \left[q \int_0^{\infty} e^{-qz} (\delta(z) + bh(z)) dz \right] \cdot \left[\int_0^{\infty} e^{-(q+b)s} f(s) ds \right] = \\ (q+b) \int_0^{\infty} e^{-(q+b)s} f(s) ds = F(q+b) \end{aligned}$$

Яъне

$$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(s) ds \rightarrow F(q+b) \quad (1.2.27)$$

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем

$$\int_0^t a(t-\tau) e^{-b\tau} u_1(x+\tau) d\tau$$

Бо истифода аз татбиқи баробарии (1.2.13) тасвири интегралӣ додашударо муайян мекунем. Интеграле, ки мо тасвирашро ҷустуҷӯ карда истодаем ҳолати хусусӣ барои интегралӣ (1.2.13) буда, дар ин ҷо

$$u(x, \tau) = e^{-b\tau} u_1(x + \tau)$$

мебошад, ки тасвири он чунин аст ($[2 - M]$, $[21]$, $[75]$):

$$e^{-b\tau} u_1(x + \tau) \Rightarrow \frac{pq}{p - (q + b)} \cdot \frac{pF(q + b) - (q + b)F(p)}{p(q + b)}$$

Тасвири ядро $a(t)$ ва функсияи $u(x, \tau)$ -ро ба баробарии (1.2.13) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} \int_0^t a(t - \tau) u(x, \tau) d\tau &= \int_0^t a(t - \tau) e^{-b\tau} u_1(x + \tau) d\tau \Rightarrow \\ &\left(\frac{pq}{p - (q + b)} \cdot \frac{pF(q + b) - (q + b)F(p)}{p(q + b)} \right) \cdot \frac{A(q)}{q} = \\ &\frac{A(q)}{q + b} \cdot \frac{pF(q + b) - (q + b)F(p)}{p - (q + b)} \end{aligned}$$

Яъне

$$\int_0^t a(t - \tau) e^{-b\tau} u_1(x + \tau) d\tau \Rightarrow \frac{A(q)}{q + b} \cdot \frac{pF(q + b) - (q + b)F(p)}{p - (q + b)} \quad (1.2.28)$$

мешавад.

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_0(t-s)} \cdot e^{-a_1 s} \cdot f(x - s; t - s) ds$$

Худуди интегралӣ мазкур аз тағирёбандаҳо иборат буда, инчунин интеграл аз параметр низ вобаста аст ($[71]$, $[48]$). Чи тавре маълум аст дар

ҳолати $a_0 = 0, a_1 = 0$ будан тасвири интегралӣ мазкур аз тарафи олимони муайян шудааст ([20, 21]) ва дар ҳолати a_0, a_1 – ихтиёри адади ҳақиқӣ будан бо истифода аз табдилоти Лаплас – Карсон тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_0(t-s)} \cdot e^{-a_1 s} \cdot f(x-s; t-s) ds \right) dx dt =$$

дар баробарии мазкур гузориши $x-s=u; t-s=v$ –ро истифода бурда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^{\infty} e^{-a_0 v} \cdot e^{-a_1 s} \cdot f(u; v) ds \right) du dv =$$

$$pq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-pu-(q+a_0)v} f(u; v) du dv \int_0^{\infty} e^{-(p+q+a_1)s} \cdot ds =$$

$$\frac{q}{q+a_0} \cdot \left(p(q+a_0) \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-pu-(q+a_0)v} f(u; v) du dv \right) \cdot \left(\int_0^{\infty} e^{-(p+q+a_1)s} ds \right) =$$

Интегралӣ дар қавси якум мавҷудбуда табдилоти Лаплас–Карсон мебошад ва интегралӣ ғайрихоси дар қавси дуюм овардашударо ҳисоб намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & \frac{q}{q+a_0} \cdot F(p; q+a_0) \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q+a_1)s}}{p+q+a_1} \Big|_0^R \right) = \\ & = \frac{q}{q+a_0} \cdot F(p; q+a_0) \cdot \frac{1}{p+q+a_1} \end{aligned}$$

Ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_0(t-s)-a_1s} f(x-s; t-s) ds \Rightarrow \frac{qF(p; q+a_0)}{(p+q+a_1)(q+a_0)} \quad (1.2.29)$$

Олими амрикой А. Бабаханӣ дар монографияи худ бо номи “Назарияи табдилотҳои бисёрченакаи Лаплас ва масъалаҳои сарҳадӣ” изҳори ақида мекунад: “Ҳадафи асосии ин рисола омӯзиши табдилоти бисёрченакаи Лаплас ва тарзҳои мухтасифи ҳисобкунии он мебошад. Якҷанд теоремаҳо ва усулҳои ҳисобкунӣ исбот шудаанд, ҷуфтҳои нави табдилоти Лаплас аз як ва ду ченакҳои маълум пешниҳод карда мешаванд. Дар боби якум чор теоремаи асосӣ исбот карда мешавад ва сипас ҳадди аққал як натиҷа барои ба даст овардани техникаи ба даст овардани табдилоти баръакси Лаплас барои баъзе функсияҳои махсус. Аввалан, мо ин теоремаҳоро бо ду ченак маҳдуд карда, баъдан мо онҳоро ба се ченак васеъ мекунем. Боби дуюм аз теоремаҳо доир ба табдилоти дученакаи Лаплас оғоз мешавад ва якҷанд системаҳое, ки аз ин теоремаҳо ба даст омадаанд, иборат аст. Мо инчунин баъзе теоремаҳои баръаксро исбот мекунем. Дар боби сеюм мо n итератсияи табдилотҳоро барои ба даст овардани табдилоти Лапласи дученака бо ҳам пайваست мекунем. Ниҳоят, баъзе масъалаҳои сарҳадӣ барои муодилаҳои дифференциалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ тавсиф мешаванд.” ([106], сах. 3-4).

Дар китоби Дёч Г чунин таърифи табдилоти Лаплас пешниҳод шудааст: “Агар мо табдилоти Лапласро барои муодилаҳо дар ҳосилаҳои хусусӣ татбиқ намоем барои мо зарур аст, барои функсияи $u(x, t)$ ва ҳосилаҳои он, ки ба муодила шомиланд, табдилоти Лапласро иҷро кунем. Аз баски табдилоти Лаплас ба гирифтани интеграл аз як тағйирёбанда оварда мешавад, он гоҳ ҳангоми татбиқи он ба функсияи $u(x, t)$ ба мо зарур аст, ки тағйирёбандаи x доими бошад. Ба сифати соҳаи тағйирёбии $x \in [0, \infty)$ –ро мегирем. Яъне ба ҳар як қимати муайяни x тасвири алоҳидаи $u(x, t)$ мувофиқ меояд. Ба ҳамин сабаб тасвир на фақат аз s балки аз x низ вобаста аст.” ([29], сах. 128).

Ҳамаи формулаҳои дар рисола овардашударо дар шакли чадвал нишон медиҳем ва то чое огоҳ ҳастем дар таърихи риёзиёт то ҳол ин гуна формулаҳо аз тарафи олимон баррасӣ карда нашудааст (Чадвали 1.2.2.). Бояд гуфт, ки бо истифода аз татбиқи чадвали мазкур мо метавонем ҳалли ҳар гуна масъалаҳои дар соҳаҳои техника, технология ва ғайра мавҷудбударо ҳал кунем. Дар ин чадвал функсияҳои $f(x, t)$ функсияҳои тағирёбандаашон ҳақиқие мебошанд, ки шартҳои табдилоти Лапласро қаноат мекунанд. Яъне функсияҳои додашуда функсияҳои оригинал мебошанд ([1, 41, 38, 50, 63]). Бояд қайд намуд, ки функсияҳои $F(p, q)$ функсияҳои тағирёбандаашон комплексӣ мебошанд ([77, 26, 98, 99]).

Чадвал 1.2.2. Тасвири баъзе интегралҳо

N^o	$f(x, t) \quad (x > 0; \quad t > 0)$	$F(p, q)$
1	$\int_0^{\min(x,t)} e^{-as} f(x-s, t-s) ds$	$\frac{F(p, q)}{p+q+a}$
2	$\frac{1}{c} \int_0^t (e^{-ls} - e^{-ct+(c-l)s}) u_0(x-s) ds; \quad c \neq 0$	$\frac{1}{(q+c)(p+q+l)} U_0(p)$
3	$\int_0^t e^{-(b_0t+a_0s)} u_0(x-s) ds$	$\frac{qU_0(p)}{(q+b_0)(p+q+a_0+b_0)}$
4	$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s; \tau) e^{-a_1s} ds d\tau$	$\frac{A(q)F(p; q)}{q(p+q+a_1)}$
5	$\int_0^t e^{-(bt+s)} u_0(x-s) ds$	$\frac{q}{(q+b)(p+q+1+b)} U_0(p)$
6	$\int_0^t a(t-\tau) u(x, \tau) d\tau$	$\frac{1}{q} A(q) U(p, q)$
7	$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-a_2(t-s-\tau)} f(x-s; \tau) e^{-a_1s} ds d\tau$	$\frac{F(p; q)}{(q+a_2)(p+q+a_1)}$
8	$\int_0^{\min(x,t)} (\delta(t-s) + bh(t-s)) e^{-bs} f(x-s) ds$	$\frac{(q+b)F(p)}{p+q+b}$
9	$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s)) e^{-bs} f(x+s) ds$	$\frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)}$
10	$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s)) e^{-bs} f(x-s) ds$	$\frac{pF(q+b) + (q+b)F(p)}{p+q+b}$

Идомаи чадвали 1.2.2.

11	$\int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s))e^{-bs} f(s)ds$	$F(q+b)$
12	$\int_0^t a(t-\tau) e^{-b\tau} f(x+\tau) \partial\tau$	$\frac{A(q)}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) - (q+b)F(p)}{p - (q+b)}$
13	$\int_0^t a(t-\tau) e^{-b\tau} f(x-\tau) \partial\tau$	$\frac{A(q)}{q+b} \cdot \frac{pF(q+b) + (q+b)F(p)}{p + (q+b)}$
14	$\int_0^t a(t-\tau) e^{-b\tau} (f(x+\tau) + f(x-\tau)) \partial\tau$	$\frac{2A(q)}{q+b} \cdot \frac{p^2F(q+b) - (q+b)^2F(p)}{p^2 - (q+b)^2}$
15	$\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_0(t-s)} \cdot e^{-a_1s} \cdot f(x-s; t-s) ds$	$\frac{qF(p; q+a_0)}{(p+q+a_1)(q+a_0)}$
16	$\int_0^t e^{-a_0(t-s)} \cdot e^{-a_1s} \cdot \delta(x-s) u_0(t-s) ds; \quad x > t$	$\frac{q}{q+a_0} \cdot \frac{pU_0(q+a_0)}{p+q+a_1}$
17	$\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_1t} \cdot u_0(x+t-2s) ds$	$\frac{q}{q+a_1} \cdot \frac{pU_0(q+a_1) - (q+a_1)U_0(p)}{p^2 - (q+a_1)^2}$
18	$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-a_1s} a(t-s-\tau) f_1(x-s) f_2(\tau) ds d\tau$	$\frac{F_1(p)F_2(q)A(q)}{q(p+q+a_1)}$
19	$\int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds -$ $- \int_0^{\min(x;t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds$	$\frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)}$
20	$\int_0^{\min(x,t)} e^{-as} f(x-s, t-s) g(s) ds$	$\frac{G(p+q+a)F(p,q)}{p+q+a}$

БОБИ 2. МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИ БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСӢ

2.1. Муодилаҳои дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусӣ

2.1.1 Мафҳуми асосӣ

Дар самтҳои мухталифи илм ва техника масъалаҳои дучор мешаванд, ки барои ҳалли онҳо муодилаҳои дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусӣ истифодашаванда мебошанд. Муодилаҳои дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусӣ ҳангоми таҳқиқи ҳодисаҳои механикӣ, ҳодисаҳои ҳароратӣ, ҳодисаҳои электрикӣ, ҳодисаҳои оптикӣ, акустика ва ғайраҳо татбиқи васеи амали доранд ([87, 87, 104]).

Ба монанди муодилаҳои дифференсиалии оддӣ, муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ низ дорои тартиби муайян мебошанд. Тартиби муодилаи дифференсиалӣ гуфта дараҷаи калонтарини ҳосиларо, ки дар муодилаи дифференсиалии додашуда мавҷуд аст мегуянд. Масалан $u_x = y, \frac{\partial u}{\partial y} = f(x, y), \dots$ — муодилаҳои дифференсиали бо ҳосилаи хусусии тартиби як буда, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{x}{y}; u_{xx} = xy; u_{yy} = \ln(x + y) \dots$ муодилаҳои дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусии тартиби ду мебошанд. Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки муодилаҳои дифференсиалӣ на фақат тартиби як, ду балки тартиби n — низ шуда метавонанд ([45]). ($n = 1, 2, 3, \dots$) Зикр кардан бо маврид аст, ки ба ғайр аз муодилаҳои дифференсиалии тартибашон бутун муодилаҳои дифференсиалии тартиби касри низ мавҷуд аст.

Намуди умумии муодилаи дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби ду чунин аст:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F(x, y, u, u_x, u_y) = 0 \quad (2.1.1)$$

дар ин ҷо $A(x, y, u), B(x, y, u), C(x, y, u)$ функсияҳои маълуми аз x, y, u вобаста буда, инчунин адад ҳам низ шуда метавонанд ва $u(x, y)$ функсияи ҷустуҷӯшаванда мебошад ([96]).

Таъриф. Функцияи $u(x,y)$ ҳалли муодилаи дифференциалӣ бо ҳосилаи хусусӣ номида мешавад агар онро ҳангоми ба муодила гузоштан ҳар ду тарафи баробари ба айният табдил ёбад.

Муодилаи дифференсиали бо ҳосилаҳои хусусии тартиби ду ба се навъ чудо мешавад: гиперболий, параболӣ ва эллипсӣ. ([96], [45])

1) Ҳангоми $AC - B^2 < 0$ будан муодила дорои навъи гиперболий буда бо истифода аз гузориши $x=x(\alpha, \beta)$, $y=y(\alpha, \beta)$ муодила ба намуди

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Phi_1(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta)$$

табдил меёбад, ки онро намуди умумии муодилаи навъи гиперболий меноманд. ([16]) Яке аз мисолҳои муодилаи навъи гиперболий муодилаи мавҷ мебошад, ки намуди зеринро дорад:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}$$

2) Ҳангоми $AC - B^2 = 0$ будан муодила дорои навъи параболӣ буда бо истифода аз гузориши $x=x(\alpha; \beta)$, $y=y(\alpha; \beta)$ муодила ба намуди

$$u_{\alpha\alpha} = \Phi_2(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta)$$

табдил меёбад, ки онро намуди умумии муодилаи навъи параболӣ меноманд. Яке аз мисолҳои муодилаи навъи параболӣ муодилаи гармигузаронӣ мебошад, ки намуди умумии муодилаи мазкур чунин мебошад:

$$u_t = a^2 u_{xx}$$

3) Ҳангоми $AC - B^2 > 0$ будан муодила дорои навъи эллипсӣ буда бо истифода аз гузориши $x=x(\alpha, \beta)$, $y=y(\alpha, \beta)$ муодила ба намуди

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = \Phi_3(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta)$$

табдил меёбад, ки онро намуди умумии муодилаи навъи эллипсӣ меноманд. ([11, 18])

2.1.2 Муодилаи дифференсиали бо ҳосилаи хусусии тартиби як

Бигзор функцияи $u = u(x, y, z)$ аз се тағирбанда иборат бошад

Таъриф: Муодилаи намуди

$$P(x, y, z, u) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(x, y, z, u) \frac{\partial u}{\partial y} + R(x, y, z, u) \frac{\partial u}{\partial z} = T(x, y, z, u) \quad (2.1.2)$$

муодилаи квазихаттӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби як номида мешавад, ки дар ин ҷо P, Q, R, T — функцияҳои додашуда буд, $u(x, y, z)$ — функцияи ҷустуҷӯшаванда мебошад.

Дар ҳолати функцияҳои додашуда P, Q, R, T аз u вобаста набудан муодилаи (1.2.2) —ро хаттӣ меноманд. Инчунин дар ҳолати $T = 0$ — будан муодилаи (1.2.2) — якҷинса номида мешавад. ([11])

Ҳангоми ҳалли муодилаи дифференсиалии (1.2.2) тартиб додани муодилаи характериристики ҳатми мебошад, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} = \frac{du}{T} \quad (2.1.3)$$

Масалан ҳангоми ҳал намудани муодилаи $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ формулаи (2.1.3) истифодашаванда буда, ҳалли муодила бошад $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ мешавад, ки дар ин ҷо функцияи φ —ихтиёри функцияи дифференсиронидашаванда аст.

2.1.3 Муодилаи дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби ду

Бигзор $u(x, y)$ — функцияи дутағирёбанда ва инчунин функцияҳои A, B, C, a, b, c, f — функцияҳои додашуда бошанд.

Таъриф: Муодилаи намуди

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = f(x, y) \quad (2.1.4)$$

муодилаи дифференсиалии хаттӣ бо ҳосилаи хусусии тартиби ду номида мешавад. Дар ин ҷо $A(x, y), B(x, y), C(x, y), a(x, y), b(x, y), c(x, y), f(x, y)$ — функцияҳои додашуда ва $u(x, y)$ — функцияи ҷустуҷӯшаванда мебошад.

Агар функцияи A, B, C, a, b, c, f — ба ғайр аз x, y инчунин аз u низ вобаста

бошанд он гоҳ муодилаи (1. 2. 4) – квазихаттӣ номида мешавад.

Муодилаи намуди

$$A dy^2 - 2B dx dy + C dx^2 = 0$$

муодилаи характеристикӣ ном дорад. ([43, 45])

2.2. Татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ

Мо метавонем усули ҳисоби оператсиониро дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ, муодилаҳои интегралӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ татбиқ намоем. Бояд қайд намуд, ки бо истифода аз табдилоти Лаплас бисёртағирёбанда баъзе синфи ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ, муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ дида баромада шудааст. ([116, 20, 36]) Бо истифода аз татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусӣ осон ва қулай мебошад. Масалан муодилаи

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f(t)$$

-ро, ки шартҳои ибтидоии он $u(0, t) = \varphi(t)$ мебошад бо осони метавон ҳал намуд. Дар ибтидои ҳал тасвири ҳосила ва функсияҳоро меорем, ки онҳо чунинанд ([20]):

$$u(0, t) = \varphi(t) \rightarrow \Phi(q); f(t) \Rightarrow F(q); \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \Rightarrow p[U(p, q) - \Phi(q)]$$

акнун тасвирҳоро ба муодила гузошта ҳалли муодиларо ҷустуҷӯ мекунем

$$p[U(p, q) - \Phi(q)] = F(q)$$

$$U(p, q) - \Phi(q) = \frac{F(q)}{p}$$

$$U(p, q) = \left\{ \frac{1}{p} \cdot F(q) \right\} + \{ \Phi(q) \}$$

Тасвири ҳардуи қавсҳо барои мо маълум мебошад ([20,21]). Ҳамин тавр ҳалли муодиларо менависем

$$u(x, t) = xf(t) + \varphi(t)$$

Бо истифода аз татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон масъалаҳои мушахасро дида мебароем, ки яке аз он масъалаҳо муодилаи транспорт бо манбаи хаттӣ ба шумор меравад.

2.2.1 Муодилаи транспорт бо манбаи хаттӣ

Олимон барои ҳал намудани муодилаи дифференсиали бо ҳосилаи хусусӣ тарзҳои гуногуни ҳалро истифода мекунанд. Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки усули ҳисоби оператсионӣ дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусӣ истифодашаванда мебошад. Табдилоти Лаплас-Карсон –ро татбиқ намуда ҳалли муодилаи зеринро ҷустуҷӯ мекунем

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} + au = f(x, t) \quad (2.2.1)$$

$$\text{Шартҳои ибтидоӣ ва канориро меорем: } \begin{cases} u(x, 0) = u_0(x); & x > 0 \\ u(0, t) = \varphi(t); & t > 0 \end{cases} \quad (2.2.2)$$

Дар ҳолати $a = 0$ будан ҳалли муодилаи мазкур бо истифода аз усули ҳисоби оператсионӣ аз тарафи олимон дида баромада шудааст ([20]) ва ҳоло мо барои ихтиёрии адади ҳақиқии a ҳалли умумии муодилаи (2.3.1)-ро бо шартҳои додашудаи (2.3.2) дида мебароем. **Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки ҳар яке аз ин функсияҳо бефосила ва дифференсиронидашаванда нисбат ба ҳарду тағирёбанда бошанд ва инчунин шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноат кунанд ([102, 81, 63]).** Сараввал тасвири функсияҳо ва ҳосилаҳоро меорем ([20,21,32])

$$u(x, t) \Rightarrow U(p, q); u(x, 0) = u_0(x) \rightarrow U_0(p); u(0, t) = \varphi(t) \rightarrow \Phi(q);$$

$$f(x, t) \Rightarrow F(p, q); \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \Rightarrow q[U(p, q) - U_0(p)]; \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \Rightarrow p[U(p, q) - \Phi(q)]$$

акун тасвирҳоро ба муодилаи (2.3.1) гузошта ҳосил мекунем

$$p[U(p, q) - \Phi(q)] + q[U(p, q) - U_0(p)] + aU(p, q) = F(p, q)$$

$$U(p, q) = \frac{F(p, q) + p\Phi(q) + qU_0(p)}{p + q + a}$$

$$U(p, q) = \left\{ \frac{F(p, q)}{p + q + a} \right\} + \left\{ \frac{p\Phi(q)}{p + q + a} \right\} + \left\{ \frac{qU_0(p)}{p + q + a} \right\} \quad (2.2.3)$$

Баробарии (2.2.3) ҳалли умумии муодилаи (2.2.1) дар фазои зудӣ буда, функцияи тағирёбандааш комплексӣ ба шумор меравад ва аз се чамъшавандаи қавсҳо иборат аст. ([74], [88], [51], [38]) Чи тавре мо медонем функцияҳои ҳақиқии барои тасвирҳои дар баробарии (2.2.3) мавҷудбуда алақай бар мо маълум аст (Ба ҷадвали 1.2.1 ва 1.2.2 нигаред).

$$1) \left\{ \frac{F(p, q)}{p + q + a} \right\} \Leftarrow \int_0^{\min(x, t)} e^{-as} f(x - s, t - s) ds$$

$$2) \left\{ \frac{p\Phi(q)}{p + q + a} \right\} \Leftarrow e^{-ax} \varphi(t - x)$$

$$3) \left\{ \frac{qU_0(p)}{p + q + a} \right\} \Leftarrow e^{-at} u_0(x - t)$$

акнун ҳалли умумии муодиларо менависем

$$u(x, t) = e^{-ax} \varphi(t - x) + e^{-at} u_0(x - t) + \int_0^{\min(x, t)} e^{-as} f(x - s, t - s) ds$$

Ҳалли мазкурро дар шакли муфасссал чунин менависанд:

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-at} u_0(x - t) + \int_0^t e^{-as} f(x - s, t - s) ds & \text{барои } x > t \\ e^{-ax} \varphi(t - x) + \int_0^x e^{-as} f(x - s, t - s) ds & \text{барои } x < t \end{cases} \quad (2.2.4)$$

2.2.2 Муодилаи дифференсиалии хаттӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби ду

Муодилаи зеринро дида мебароем

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial t} + bu = f(x, t) \quad (2.2.5)$$

Гузориши масъала:

$$\text{Шартҳои ибтидоӣ} \begin{cases} u(x, 0) = u_0(x) \\ u'_t(x, 0) = u_1(x) \end{cases} \quad (2.2.6_1)$$

$$\text{буда ва шартҳои канорӣ} \begin{cases} u(0, t) = \varphi_1(t) \\ u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \end{cases} \quad (2.2.6_2)$$

мебошад.

Бояд қайд намуд, ки муодилаи (2.2.5)-ро бо шартҳои додашудаи (2.2.6) хангоми $a = 0; b = 1; f(x, t) = \sqrt{x+t}$ ва инчунин

$$u(x, 0) = u(0, t) = u'_x(0, t) = u'_t(x, 0) = 0$$

будан олими амрико Р. С. Даҳия ва олими эронӣ Чаъфар Собирӣ бо истифода аз татбиқи табдилоти интегралӣ Лапласи дутағирёбанда ҳал намудаанд ([108], [109], [110]). Олими амрикоӣ Р. С. Даҳия дар мақолааш бо номи “Ҳисобкунии табдилоти n – ченакаи Лаплас” чунин менависад: “Дар ин мақола мо теоремаро дар бораи табдилоти n -ченакаи Лаплас таҳия мекунем. Ҷуфтҳои табдилоти Лапласро дар ченаки n ҳисоб кардан масъалаи мураккаб мебошад. Инҷо ғояҳои навро пешниҳод кардан зарур аст. Табдилоти бисёрченакаи Лаплас дар ҳалли масъалаҳои канорӣ барои муодилаҳои дифференциалии бисёрченака бо ҳосилаҳои хусусӣ васеъ истифода бурда мешавад.” ([111], саҳ. 186 – 188).

Ҳоло мо дар ҳолати умумӣ барои a, b – дилхоҳ адади ҳақиқӣ будан ва дилхоҳ функсияҳо $f(x, t), u_0(x), u_1(x), \varphi_1(t), \varphi_2(t)$ ки ҳар яке аз инҳо шартҳои мувофиқатиро барои муодилаи (2.2.5) қаноат мекунанд ва инчунин шартҳои табдилоти Лаплас-ро низ қаноат менамоянд ([41], [54]) дида мебароем. Ҳамин тавр бо истифода аз татбиқи табдилоти Лаплас-Карсон муодилаи (2.2.5)-ро ҳал мекунем. Ҳаминро талаб кардан зарур аст, ки ҳар яке

аз ин функсияҳо бефосила ва дифференсиронидашаванда нисбат ба ҳарду тағирёбанда бошанд ва инчунин қаноаткунандаи шартҳои табдилоти Лаплас низ бошанд ([22], [108]). Пеш аз ҳалли масъала тасвири ҳосилаи функсияҳо ва функсияҳоро меорем ([20, 53]).

$$u(x, 0) = u_0(x) \rightarrow U_0(p); u(0, t) = \varphi_1(t) \rightarrow \Phi_1(q);$$

$$u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \rightarrow \Phi_2(q); u'_t(x, 0) = u_1(x) \rightarrow U_1(p); u(x, t) \Rightarrow U(p, q);$$

$$f(x, t) \Rightarrow F(p, q)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q); \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Rightarrow q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p);$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \Rightarrow pq[U(p, q) - \Phi_1(q) - U_0(p) + u(0, 0)]; \frac{\partial u}{\partial x} \Rightarrow p[U(p, q) - \Phi_1(q)];$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow q[U(p, q) - U_0(p)]$$

акнун ҳар яке аз ин тасвирҳоро ба муодилаи (2.3.5) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q) + q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p) + \\ & + 2pq[U(p, q) - \Phi_1(q) - U_0(p) + u(0, 0)] + ap[U(p, q) - \Phi_1(q)] + \\ & + aq[U(p, q) - U_0(p)] + bU(p, q) = F(p, q) \\ & p^2U(p, q) - p^2\Phi_1(q) - p\Phi_2(q) + q^2U(p, q) - q^2U_0(p) - qU_1(p) + 2pqU(p, q) \\ & - 2pq\Phi_1(q) - 2pqU_0(p) + 2pqu(0, 0) + apU(p, q) - ap\Phi_1(q) + aqU(p, q) - \\ & - aqU_0(p) + bU(p, q) = F(p, q) \\ & (p^2 + q^2 + 2pq + ap + aq + b)U(p, q) = F(p, q) + p^2\Phi_1(q) + p\Phi_2(q) + \\ & + q^2U_0(p) + qU_1(p) + 2pq\Phi_1(q) + 2pqU_0(p) - 2pqu(0, 0) + ap\Phi_1(q) + \\ & + aqU_0(p) \end{aligned}$$

Ҳамин тавр ҳалли муодиларо дар фазои зудӣ менависем

$$U(p, q) = \frac{F(p, q) + p^2\Phi_1(q) + p\Phi_2(q) + q^2U_0(p) + qU_1(p) + 2pq\Phi_1(q)}{p^2 + q^2 + 2pq + ap + aq + b} +$$

$$+ \frac{2pqU_0(p) - 2pqu(0,0) + ap\Phi_1(q) + aqU_0(p)}{p^2 + q^2 + 2pq + ap + aq + b} \quad (2.2.7)$$

Махраҷи баробарии (2.3.7)-ро ба зарбшавандаҳо чудо намуда сипас амалро идома медиҳем

$$p^2 + q^2 + 2pq + ap + aq + b = (p + q)^2 + a(p + q) + b =$$

$$(p + q)^2 + 2 \cdot (p + q) \cdot \frac{a}{2} + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b = \left(p + q + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)^2$$

$$= \left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)$$

Ҳалли муодиларо дар шакли муфассал менависем

$$U(p, q) = \left\{ \frac{F(p, q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} +$$

$$\left\{ \frac{[p^2 + 2pq + ap]\Phi_1(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} +$$

$$\left\{ \frac{p\Phi_2(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} +$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \frac{[q^2 + 2pq + aq]U_0(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} + \\
& \left\{ \frac{qU_1(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} + \\
& \left\{ \frac{-2pqu(0,0)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} \quad (2.2.8)
\end{aligned}$$

Аз баски табдилоти Лаплас-Карсона тасвири функсияи ҳақиқии дар фазои вақт мавҷудбударо дар фазои зудӣ нишон медиҳад бинобар ин баробарии (2.2.8) ҳалли умумии муодилаи (2.2.5) дар фазои зудӣ буда функсияи тағирёбандааш комплексӣ ба шумор меравад ([85], [86], [50], [120]). Чи тавре мебинем баробарии (2.2.8) аз шаш ҷамъшавандаи қавсҳо иборат аст. Аз баски барои мо ҳалли умумии муодилаи (2.2.5) дар фазои вақт, ки дар ин фазо функсияи тағирёбандааш ҳақиқӣ амал мекунад лозим аст, бинобар ин бо истифода аз табдилоти баъакси Лаплас-Карсон барои ҳар як функсияи дар қавсҳо мавҷудбуда функсияи ҳақиқӣ ҷустуҷӯ мекунем.

$$\begin{aligned}
& 1. \left\{ \frac{F(p, q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} \Leftrightarrow \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^{\min(x,t)} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x-s, t-s) ds
\end{aligned}$$

сараввал ифодаро содда мекунем

$$\begin{aligned}
& \frac{F(p, q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} = \\
& \frac{F(p, q)}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} - \left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)}{(p + q)^2 + a(p + q) + b} \\
& = \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(\frac{F(p, q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \frac{F(p, q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \right)
\end{aligned}$$

чи тавре маълум аст (ба қадвали 1.2.2. нигаред)

$$\frac{F(p, q)}{p + q + a_0} \Leftarrow \int_0^{\min(x, t)} e^{-a_0 s} f(x - s, t - s) ds \quad (2.2.9)$$

мебошад. Бо истифода аз татбиқи формулаи мазкур барои функсияи дар қавси якум мавҷудбуда функсияи ҳақиқӣ менависем

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(\frac{F(p, q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \frac{F(p, q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \right) \Leftarrow \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^{\min(x, t)} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} f(x - s, t - s) ds - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^{\min(x, t)} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} f(x - s, t - s) ds
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^{\min(x,t)} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x-s, t-s) ds$$

$$2. \left\{ \frac{[p^2 + 2pq + ap]\Phi_1(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\}$$

ифодаро содда намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & \frac{[p^2 + 2pq + ap]\Phi_1(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} = \\ & \frac{p\Phi_1(q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{pq\Phi_1(q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} + \\ & + \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{p\Phi_1(q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \\ & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{pq\Phi_1(q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \\ & - \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{p\Phi_1(q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \end{aligned}$$

Чи тавре аз **ҷадвали 1.2.1.** барои мо маълум аст тасвири функсияҳои $e^{-a_1x}\varphi_{1t}'(t-x) + \varphi_1(0)e^{-a_1x}\delta(t-x)$ ва $e^{-a_2x}\varphi_1(t-x)$ чунин мебошанд:

$$\left(e^{-a_1x}\varphi_{1t}'(t-x) + \varphi_1(0)e^{-a_1x}\delta(t-x)\right) \Rightarrow \frac{pq\Phi_1(q)}{p+q+a_1} \quad (2.2.10)$$

$$e^{-a_2x}\varphi_1(t-x) \Rightarrow \frac{p\Phi_1(q)}{p+q+a_2} \quad (2.2.11)$$

Бо истифода аз формулаҳои (2.2.10) ва (2.2.11) функсияи ҳақиқии тасвири дар қавси дуюм мавҷудбударо меёбем

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{[p^2 + 2pq + ap]\Phi_1(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right) \Leftarrow \\
& e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t-x) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t-x) + \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(0) e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \delta(t-x) + \\
& \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t-x) - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t-x) - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(0) e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \delta(t-x) - \\
& \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t-x) \\
& 3. \left\{ \frac{p\Phi_2(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} \Leftarrow
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \right) \varphi_2(t - x)$$

ифодаро содда намуда ҳосил мекунем

$$\frac{p\Phi_2(q)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(\frac{p\Phi_2(q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \frac{p\Phi_2(q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \right)$$

Ҳамин тавр бо истифода аз формулаи (2.2.11) барои функсияи сеюм хулоса мебарорем

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(\frac{p\Phi_2(q)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \frac{p\Phi_2(q)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \right) \Leftarrow$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_2(t - x) - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_2(t - x) \right) =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \right) \varphi_2(t - x)$$

$$4. \left\{ \frac{[q^2 + 2pq + aq]U_0(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\}$$

ифодаро содда намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
& \frac{[q^2 + 2pq + aq]U_0(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} = \\
& \frac{qU_0(p)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{qpU_0(p)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} + \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(\frac{q\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)U_0(p)}{p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} - \frac{qpU_0(p)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \right) - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \cdot \frac{q\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)U_0(p)}{p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}
\end{aligned}$$

Чи тавре аз **ҷадвали 1.2.1.** ва **ҷадвали 1.2.2.** мо мебинем тасвири функсияҳои $e^{-a_3 t} u_{0x}'(x - t) + u_0(0)e^{-a_3 t} \delta(x - t)$ ва $e^{-a_4 t} u_0(x - t)$ чунин мебошанд:

$$\left(e^{-a_3 t} u_{0x}'(x - t) + u_0(0)e^{-a_3 t} \delta(x - t)\right) \Rightarrow \frac{pqU_0(p)}{p + q + a_3} \quad (2.2.12)$$

$$e^{-a_4 t} u_0(x - t) \Rightarrow \frac{qU_0(p)}{p + q + a_4} \quad (2.2.13)$$

Бо истифода аз формулаҳои (2.2.12) ва (2.2.13) барои тасвири дар қавси чорум мавҷудбуда функсияи ҳақиқи меёбем.

$$\left(\frac{[q^2 + 2pq + aq]U_0(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)\left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right) \Leftarrow$$

$$e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0x}'(x-t) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(0) e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x-t) +$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0x}'(x-t) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(0) e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x-t) -$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t)$$

$$5. \left\{ \frac{qU_1(p)}{\left(p + q + \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \left(p + q + \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)} \right\} \Leftarrow$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \right) u_1(x-t)$$

ифодаро содда намуда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
& \frac{qU_1(p)}{\left(p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)\left(p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)} = \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \left(\frac{qU_1(p)}{p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} - \frac{qU_1(p)}{p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \right) = \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot \frac{qU_1(p)}{p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} - \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot \frac{qU_1(p)}{p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}}
\end{aligned}$$

Чи тавре аз формулаи (2.2.13) барои мо маълум аст

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot e^{-\left(\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} u_1(x-t) - \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot e^{-\left(\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} u_1(x-t) = \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} \right) u_1(x-t)
\end{aligned}$$

Яъне

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{qU_1(p)}{\left(p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)\left(p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)} \right) \Leftrightarrow \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)t} \right) u_1(x-t)
\end{aligned}$$

мебошад.

$$6. \left\{ \frac{-2pqu(0,0)}{\left(p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)\left(p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)} \right\} \Leftrightarrow 0$$

сараввал ифодаро содда мекунем

$$\frac{-2pqu(0,0)}{\left(p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)\left(p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot \frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot \frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}}$$

формулаҳои (2.2.11) ва (2.2.13) -ро истифода карда нисбати ин функсияҳо ҳуллоса мебарорем ва чи тавре ба мо маълум аст функсияи Дирак чунин аст ([16], [33], [54], [56], [57]):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{ҳангоми } t = 0 \\ 0 & \text{ҳангоми } t \neq 0 \end{cases}$$

тасвири функсияи Дирак $\delta(t) \rightarrow q$ мебошад ([1], [21], [78]).

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \cdot \left(\frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} - \frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \right) \Leftarrow$$

$$\frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} e^{-\left(\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)x} \delta(t-x) - \frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} e^{-\left(\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)x} \delta(t-x) =$$

$$\frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)x} - e^{-\left(\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}\right)x} \right) \delta(t-x)$$

ё

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \left(\frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} - \frac{pqu(0,0)}{p+q+\frac{a}{2}-\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-b}} \right) \Leftarrow$$

$$\frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x-t) - \frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x-t) =$$

$$\frac{u(0,0)}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \right) \delta(x-t)$$

$$\delta(x-t) = \delta(t-x) = \begin{cases} \infty & \text{при } x = t \\ 0 & \text{при } x \neq t \end{cases} \quad (2.2.14)$$

Ҳалли умумии муодилаи (2.2.5) бо шартҳои додашудаи (2.2.6) чунин аст:
([4 – M])

$$\begin{aligned} u(x,t) = & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t-x) + \\ & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^{\min(x,t)} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x-s, t-s) ds + \\ & e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t-x) + \\ & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(0) e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \delta(t-x) + \\ & \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} * e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t-x) - \\ & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t-x) - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(0) e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \delta(t - x) - \\
& \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t - x) + \\
& (a^2 - 4b)^{-\frac{1}{2}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \right) \varphi_2(t - x) \\
& + e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x - t) + \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0x}'(x - t) + \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(0) e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x - t) + \\
& \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x - t) - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0x}'(x - t) - \\
& \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(0) e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \delta(x - t) -
\end{aligned}$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \right) u_1(x-t)$$

Кадами 1: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x > t$ будан менависем

$$u(x, t) = e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0_x}'(x-t) +$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_{0_x}'(x-t) -$$

$$-\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} u_0(x-t) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)t} \right) u_1(x-t) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^t \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x-s, t-s) ds \quad (2.2.15)$$

Кадами 2: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x < t$ будан менависем

$$\begin{aligned}
 u(x, t) = & e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t - x) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t - x) + \\
 & \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t - x) - \\
 & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_{1_t}'(t - x) - \\
 & - \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \varphi_1(t - x) + \\
 & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)x} \right) \varphi_2(t - x) + \\
 & \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^x \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x - s, t - s) ds \quad (2.2.16)
 \end{aligned}$$

Баробариҳои (2.2.15) ва (2.2.16) ҳалли умумии муодилаи (2.2.5) бо шартҳои додашудаи (2.2.6) мебошанд, ки дар ин баробариҳо $\left(\left(\frac{a}{2}\right)^2 \neq b\right)$ аст. ([4 – М])

Бо истифода аз формулаи (2.2.15) шarti ибтидоии масъаларо ҳосил намудан мумкин аст, ки он чунин аст:

$$u(x, 0) = e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} u_0(x - 0) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} u_0'(x - 0)$$

$$+ \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} u_0(x - 0) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} u_0'(x - 0) -$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} u_0(x - 0) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \right) u_1(x - 0) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^0 \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(x - s, t - s) ds =$$

$$u_0(x) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0'(x) + \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(x) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0'(x) - \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} u_0(x) = u_0(x)$$

Бо истифода аз формулаи (2.2.16) шarti канории масъаларо низ ҳосил намудан мумкин аст, ки онро менависем

$$u(0, t) = e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \varphi_1(t - 0) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \varphi_{1_t}'(t - 0) +$$

$$\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \varphi_1(t - 0) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \varphi_{1_t}'(t - 0) -$$

$$-\frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \varphi_1(t - 0) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) \cdot 0} \right) \varphi_2(t - 0) +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \int_0^0 \left(e^{-\left(\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} - e^{-\left(\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)s} \right) f(0 - s, t - s) ds =$$

$$\varphi_1(t) + \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_{1_t}'(t) + \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(t) -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1'(t) - \frac{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}} \varphi_1(t) = \varphi_1(t)$$

Мисол: Муодиларо ҳал кунед

$$u_{xx} + u_{tt} + 2u_{xt} + u = \sqrt{x+t} \quad (t > x)$$

Шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ чунин мебошанд:

$$u(x, 0) = u(0, t) = u'(x, 0) = u'(0, t) = u(0, 0) = 0$$

Ҳал: Маълум аст, ки муодилаи додашуда ҳолати хусусии муодилаи (2.2.5) буда дар ин ҷо $a=0$, $b=1$, $f(x,t)=\sqrt{x+t}$ ва инчунин шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ баробари нол мебошанд. Аз баски ҳалли муодилаи додашударо мо ҳангоми $(t > x)$ чуствуҷу карда истодаем бинобар ин баробарии (2.2.16)-ро истифода намуда ҳалли муодилаи додашударо меёбем

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{-1}} \int_0^x \left(e^{-(\sqrt{-1})s} - e^{+(\sqrt{-1})s} \right) \sqrt{x-s+t-s} ds = \\ &= \int_0^x \frac{e^{is} - e^{-is}}{2i} \sqrt{x+t-2s} ds \end{aligned}$$

Бо истифода аз формулаи Эйлер баробариро табдил медиҳем

$$u(x, t) = \int_0^x \sin s \sqrt{x+t-2s} ds$$

Ҳамин тавр ҳалли муодила маълум гардид ([38]).

2.3. Муодилаи телеграф

Доир ба ҳалли муодилаи дифференсиалии телеграф олимони зиёд саҳми худро гузоштаанд, аз ҷумла В. А. Илин, Е. И. Моисеев, Е. А. Козлова,

М. Абдулкаримов ва ғайраҳо мебошанд. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ додашуда то ҳол ҳалли умумӣ ва ошкори худро пайдо накардааст. Чи тавре мо медонем ([2], [49], [95]) муодилаи дифференсиалии телеграф намуди зеринро дорад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha \frac{\partial u}{\partial t} + \beta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(t) \quad (2.3.1)$$

Гузориши масъала: Шартҳои ибтидоӣ $u(x, 0) = u_0(x)$, $u'_t(x, 0) = u_1(x)$ буда ва шартҳои канорӣ бошад $u(0, t) = \varphi_1(t)$, $u'_x(0, t) = \varphi_2(t)$ мебошад.

Ҳангоми $\alpha = 0, \beta = 0$ будан муодилаи мазкур аз тарафи олимон дида баромада шудааст ([20], [34], [35]) ва дар ҳолати $\alpha = 0, \beta = -q(x, t)$ будан низ ([2]) муодилаи мазкурро олимон ҳал намудаанд. Бояд қайд кард, ки дар ҳолати $\alpha = 0, \beta$ — адади ҳақиқии мусбат будан низ ҳалли муодилаи мазкур аз тарафи олимон дида баромада шудааст ([34, 35, 36, 44, 81, 108, 109]). Ҳоло мо ҳалли умумии муодилаи (2.3.1)-ро бо шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ додашуда бо истифода аз татбиқи ҳисоби оператсионӣ ҳангоми α — адади ҳақиқии ихтиёри ва $\beta = \frac{\alpha^2}{4}$ будан меёбем. Табдилоти Лаплас-Карсонро татбиқ намуда муодилаи (2.3.1) —ро ҳал мекунем. Ҳаминро талаб кардан зарур аст, ки ҳар яке аз ин функцияҳо бефосила ва дифференсиронидашаванда нисбат ба ҳарду тағирёбанда бошанд ва инчунин шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноат кунанд ([17], [39], [40], [63]). Пеш аз ҳалли масъала тасвири ҳосилаи функция ва функцияҳоро меорем ([20])

$$u(x, 0) = u_0(x) \rightarrow U_0(p), u(0, t) = \varphi_1(t) \rightarrow \Phi_1(q),$$

$$u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \rightarrow \Phi_2(q), u'_t(x, 0) = u_1(x) \rightarrow U_1(p),$$

$$u(x, t) \Rightarrow U(p, q), f(t) \rightarrow F(q)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q); \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Rightarrow q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p);$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow q[U(p, q) - U_0(p)]$$

акнун ҳар яке аз ин тасвирҳоро ба муодилаи (2.3.1) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p) + \alpha q[U(p, q) - U_0(p)] + \frac{1}{4}\alpha^2 U(p, q) \\ = p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q) + F(q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q^2 U(p, q) - q^2 U_0(p) - qU_1(p) + \alpha q U(p, q) - \alpha q U_0(p) + \frac{1}{4}\alpha^2 U(p, q) \\ = p^2 U(p, q) - p^2 \Phi_1(q) - p\Phi_2(q) + F(q) \end{aligned}$$

$$\left(q^2 + \alpha q + \frac{1}{4}\alpha^2 - p^2\right) U(p, q)$$

$$= (q^2 + \alpha q)U_0(p) + qU_1(p) - p^2\Phi_1(q) - p\Phi_2(q) + F(q)$$

$$U(p, q) = \frac{(q^2 + \alpha q)U_0(p) + qU_1(p) - p^2\Phi_1(q) - p\Phi_2(q) + F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \quad (2.3.2)$$

Маълум аст, ки дар ҳолати $p_1 = q + \frac{\alpha}{2}$, $p_2 = -\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)$ будан махраҷ нол мешавад ва аз баски решаи дуюм ба соҳаи наздикшавии интегралӣ Лаплас тааллуқ надорад бинобар ин онро решаи бегона шуморида дар ҳолати $p = q + \frac{\alpha}{2}$ будан сурат кай нол мешавад муайян мекунем

$$\begin{aligned} (q^2 + \alpha q)U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + qU_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 \Phi_1(q) \\ - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_2(q) + F(q) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{(q^2 + \alpha q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)} U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + \frac{q}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)} U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) - \Phi_2(q) \\ + \frac{1}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)} F(q) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_2(q) = & \frac{(q^2 + \alpha q)}{q + \frac{\alpha}{2}} U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + \frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) + \\ & + \frac{F(q)}{q + \frac{\alpha}{2}}\end{aligned}\quad (2.3.3)$$

Баробарии (2.3.3)-ро ба баробарии (2.3.2) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}U(p, q) = & \frac{(q^2 + \alpha q)U_0(p) + qU_1(p) - p^2\Phi_1(q) + F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} + \\ & -p \frac{\left(\frac{(q^2 + \alpha q)}{q + \frac{\alpha}{2}} U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + \frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) + \frac{F(q)}{q + \frac{\alpha}{2}}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2}\end{aligned}\quad (2.3.4)$$

Акнун баробарии (2.3.4) –ро содда мекунем

$$\begin{aligned}U(p; q) = & \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)(q^2 + \alpha q)U_0(p)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} + \\ & \frac{q\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)U_1(p) - p^2\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)\Phi_1(q) + \left(q + \frac{\alpha}{2}\right)F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} + \\ & + \frac{-p\left((q^2 + \alpha q)U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + qU_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - \left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2\Phi_1(q) + F(q)\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)}\end{aligned}$$

Ҳамин тавр ҳалли муодиларо метавон чунин навишт:

$$U(p, q) = \left\{ \frac{q^2 + \alpha q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)U_0(p) - pU_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \right\} +$$

$$\left\{ \frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_1(p) - p U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \right\} + \left\{ \frac{p \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} \right\} +$$

$$+ \left\{ \frac{\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right) F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} \right\} \quad (2.3.5)$$

Аз баски табдилоти Лаплас-Карсон тасвири функцияи ҳақиқии дар фазои вақт мавҷудбударо дар фазои зудӣ нишон медиҳад бинобар ин баробарии (2.3.5) ҳалли умумии муодилаи (2.3.1) дар фазои зудӣ буда, функцияи тағирёбандааш комплекси ба шумор меравад ва функсияҳои аз параметр вобаста мебошад ([110], [111], [54], [55]). Чи тавре мебинем баробарии (2.3.5) аз чор ҷамъшавандаи қавсҳо иборат аст. Аз баски барои мо ҳалли умумии муодилаи (2.3.1) дар фазои вақт, ки дар ин фазо функцияи тағирёбандааш ҳақиқӣ ([64, 65]) амал мекунад лозим аст, бинобар ин бо истифода аз табдилоти баъакси Лаплас-Карсон барои ҳар як функцияи дар қавсҳо мавҷудбуда функцияи ҳақиқӣ ҷустуҷӯ мекунем

$$1) \left\{ \frac{q^2 + \alpha q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_0(p) - p U_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \right\} \Leftarrow$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau$$

$$+ \alpha \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau;$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-a_1 s} f(x-s, t-s) ds \Rightarrow \frac{F(p, q)}{p + q + a_1}; \quad (2.3.6)$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \Rightarrow \frac{A(q)F(p;q)}{q(p+q+a_1)}; \quad (2.3.7)$$

мебошад.

Бо ёрии формулаҳои (2.3.6) ва (2.3.7) тасвири интегралӣ зеринро меёбем

$$\begin{aligned} & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau \\ & \Rightarrow \frac{A(q)}{q+b} \cdot \frac{pU_1(q+b) - (q+b)U_1(p)}{p^2 - (q+b)^2}; \end{aligned} \quad (2.3.8)$$

Инчунин формулаи зеринро низ барассӣ хоҳем намуд

$$\begin{aligned} & \frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_1(p) - pU_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \\ & \Leftarrow \int_0^{\min(x,t)} e^{-\frac{\alpha}{2}t} u_1(x+t-2s) ds \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

Баробариҳои (2.3.8), (2.3.9)-ро истифода намуда функсияи ҳақиқии қавси якуми дар баробарии (2.3.5) мавҷудбударо ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{q^2 + \alpha q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_0(p) - pU_0\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \right\} \Leftarrow \\ & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau \\ & + \alpha \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau; \end{aligned}$$

$$2) \left\{ \frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_1(p) - p U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \right\} \Leftarrow \int_0^{\min(x,t)} e^{-\frac{\alpha}{2}t} \cdot u_1(x + t - 2s) ds$$

Бо истифода аз татбиқи баробарии (2. 3. 9) функцияи ҳақиқии ба тасвири дар қавси мазкур мувофиқояндаро менависем

$$\frac{q}{q + \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) U_1(p) - p U_1\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2} \Leftarrow \int_0^{\min(x,t)} e^{-\frac{\alpha}{2}t} \cdot u_1(x + t - 2s) ds$$

$$3) \left\{ \frac{p \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} \right\} = \left\{ \frac{p \Phi_1(q)}{p + q + \frac{\alpha}{2}} \right\} \Leftarrow e^{-\frac{\alpha}{2}x} \varphi_1(t - x)$$

Сараввал ифодаи дар дохили қавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\frac{p \left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \Phi_1(q) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} = \frac{p \Phi_1(q)}{p + q + \frac{\alpha}{2}}$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.1. нигаред)

$$\frac{p \Phi_1(q)}{p + q + \frac{\alpha}{2}} \Leftarrow e^{-\frac{\alpha}{2}x} \varphi_1(t - x)$$

мебошад ([38]).

$$4) \left\{ \frac{\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right) F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} \right\} \Leftarrow \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\frac{\alpha}{2}(t-\tau)} h(x - s) f(\tau) ds d\tau$$

Сараввал ифодаи дар дохили қавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\frac{\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right) F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - p^2\right)} = \frac{\left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right) F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) - p\right) \left(\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) + p\right)} =$$

$$\frac{H(p)F(q)}{\left(q + \frac{\alpha}{2}\right) \left(p + q + \frac{\alpha}{2}\right)}$$

Бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралӣ намуди

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) \cdot e^{-a_1 s} \cdot f_1(x-s) f_2(\tau) ds d\tau$$

-ро меёбем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) \cdot e^{-a_1 s} \cdot f_1(x-s) f_2(\tau) ds d\tau \right) dx dt$$

гузориши $x-s=u$; $t-s=v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v a(v-\tau) \cdot e^{-a_1 s} \cdot f_1(u) f_2(\tau) ds d\tau \right) du dv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) f_2(\tau) d\tau \right) f_1(u) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

$$= \left(p \int_0^\infty e^{-pu} f_1(u) du \right) \left(q \int_0^\infty e^{-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) f_2(\tau) d\tau \right) dv \right) \cdot \frac{1}{p+q+a_1} =$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v-\tau) f_2(\tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \cdot F_2(q)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$= F_1(p) \cdot \frac{1}{q} A(q) \cdot F_2(q) \cdot \frac{1}{p+q+a_1} = \frac{F_1(p)F_2(q)A(q)}{q(p+q+a_1)}$$

ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум шуд.

Яъне

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) \cdot e^{-a_1 s} \cdot f_1(x-s) f_2(\tau) ds d\tau \Rightarrow \frac{F_1(p)F_2(q)A(q)}{q(p+q+a_1)} \quad (2.3.10)$$

Дар ҳолати $a(t) = e^{-\frac{\alpha}{2}t}$ ва $f_1(x) = h(x)$ — функцияи Хевисайд будан баробарии (2.3.10) намуди зеринро мегирад

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\frac{\alpha}{2}(t-s-\tau)} \cdot e^{-a_1 s} \cdot h(x-s) f_2(\tau) ds d\tau \Rightarrow \frac{H(p)F_2(q)}{(q+\frac{\alpha}{2})(p+q+a_1)} \quad (2.3.11)$$

Ҳамин тавр барои ҳамаи қавсҳои дар баробарии (2.3.5) мавҷудбуда функцияи ҳақиқӣ муайян кардем, акнун ҳалли умумии муодилаи (2.3.1)-ро бо шартҳои ибтидоӣ ва канонӣ додашуда менависем

$$\begin{aligned} u(x,t) = & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau \\ & + \alpha \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau + \\ & + \int_0^{\min(x,t)} e^{-\frac{\alpha}{2}t} \cdot u_1(x+t-2s) ds + \end{aligned}$$

$$+e^{-\frac{\alpha}{2}x}\varphi_1(t-x) + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{\frac{-\alpha}{2}(t-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \quad (2.3.12)$$

Баробарии (2.3.12)-ро дар шакли муфасссал шарҳ медиҳем

Қадами 1: *Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x > t$ будан менависем*

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau + \\ &\alpha \int_0^t \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau + \\ &+ \int_0^t e^{-\frac{\alpha}{2}t} \cdot u_1(x+t-2s) ds + \\ &+ \int_0^t \int_0^{t-s} e^{\frac{-\alpha}{2}(t-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \quad (2.3.13) \end{aligned}$$

Қадами 2: *Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x < t$ будан менависем*

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^x \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau + \\ &+\alpha \int_0^x \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x-s+\tau) e^{-\frac{\alpha}{2}(s+\tau)} ds d\tau + \\ &+ \int_0^x e^{-\frac{\alpha}{2}t} \cdot u_1(x+t-2s) ds + \\ &+e^{-\frac{\alpha}{2}x}\varphi_1(t-x) + \int_0^x \int_0^{t-s} e^{\frac{-\alpha}{2}(t-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau. \quad (2.3.14) \end{aligned}$$

Доир ба функсияи умумикардасудаи сингулярии Хевисайд $h(x)$ таҳқиқотчиён фикрҳои мухталиф иброз мекунам. Бричков Ю. А. ва Прудников А. П. дар монографияи худ ([6], сах. 43-44) таърифи табдилоти Лапласи функсияи умумикардасуда овардаанд:

“Табдилоти Лапласи функсияи умумикардасудаи $f(t) \in L_{a,b}$ – фазои функсияҳои асосӣ, $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ – нуктаҳо дар фазои R^n ,

$$\kappa_{a,b} = \begin{cases} e^{a_v, t_v}, & 0 \leq t_v \leq \infty, \\ e^{b_v, t_v}, & -\infty \leq t_v \leq \infty, \end{cases}$$

ки дар инҷо $v = 1, 2, \dots, n$ ва

$$\kappa_{a,b}(t) = \sum_{v=1}^n \kappa_{a_v, b_v}(t_v).$$

Фазои $L_{a,b}$ аз тамоми функсияҳои беохир дифференсиронидашавандаи киматашон комплексии $\varphi(t)$ дар R^n иборат аст, ки барои дилхоҳ адади ғайриманфии бутуни $k \in R^n$ нобаробариҳои

$$\gamma_k(\varphi) = \sup_{t \in R^n} |\kappa_{a,b}(t) D^k \varphi(t)| < \infty$$

ҷой доранд. Топология дар $L_{a,b}$ ба воситаи оилаи ҳисобии нимнормаҳои $\{\gamma_k\}_{k=0}^{\infty}$ тавлид мешавад. Фазое, ки ба $L_{a,b}$ ҳамроҳшуда аст, фазои функсияҳои умумикардасуда номида шуда, ба воситаи $L'_{a,b}$ ифода карда мешавад.

Барои функсияи умумикардасудаи $f \in D'(R^n)$ табдилоти Лаплас ҷой дорад, агар ақалан як ҷуфти нуктаҳои $a, b \in R^n$ ($a < b$) вуҷуд дорад, ки барои онҳо $f \in L'_{a,b}$.

Табдилоти Лапласи функцияи умумикардасудаи $f \in D'(R^n)$ ба воситаи формулаи

$$L[f] = \langle f(t), e^{-pt} \rangle, p \in \Omega_f$$

муайян карда мешавад. Тарафи рости формулаи охирин маъно дорад, зеро $e^{-pt} \in L_{a,b}$ барои $p \in \Omega_f$ дуруст аст.

Бигзор $f(t)$ – функцияи локалии интегронидашаванда мебошад ва дар як вақт $f(t) \cdot e^{-pt} \in L_1(R^n)$ барои ҳамаи $Re p$ аз соҳаи кушоди зермаҷмӯи $\Omega(R^n)$. Он гоҳ $f(t)$ функцияи умумикардасудами регуляриро аз $L'_{a,b}$ ҳосил мекунад, ки табдилоти Лапласи он бо интегралҳои оддӣ барои $Re p \in \Omega$ баробар мебошад.”

Таърифи додасударо мо дар рисола ба функцияҳои сингулярии умумикардасудаи Хевисайд $h(t)$ ва Дирак $\delta(t)$ татбиқ намудем.

БОБИ 3. МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛӢ

3.1. Муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ

Чи гунае, ки ба мо маълум аст дар табиат ва ҳаёти инсоният масъалаҳои вучуд доранд, ки барои ҳалли онҳо муодилаҳои дифференсиалӣ лозиманд ба монанди ҳисобкунии суръати ҳаракати ҷисм, ҳисобкунии шитоб, муайянкунии энергия ва ҳоказо. Инчунин ҳодисаҳои мавҷуданд, ки барои шарҳи онҳо ва ҳал намудани масъалаҳои ба онҳо тааллуқдошта муодилаи дифференсиалӣ бо ҳосилаи хусусӣ истифодашаванда мебошад ба монанди масъалаи гармигузаронӣ, ҳаракати лаппиш, паҳншавии лаппиш яъне мавҷ, ҳодисаи диффузия ва ҳоказо. Инчунин масъалаҳои низ дар ҳаёт мавҷуданд, ки ҳалли онҳо моро ба муодилаҳои интегралӣ меоранд масалан масъалаи таутохране, ки онро бори нахуст олим Абел таҳқиқ намудааст, ҳар гуна масъалаҳои, ки ба муодилаи дифференсиалии хаттӣ овардашаванда мебошанд ва ҳоказо ([83], [89], [95]).

Таъриф 1: Муодилаи намуди

$$u(x, t) = \int_0^t k(t, \tau) u(x, \tau) d\tau + f(x, t) \quad (3.1.1)$$

муодилаи интегралӣ хаттӣ чинси ду номида мешавад. Дар ин ҷо $k(t, \tau), f(x, t)$ — функцияҳои маълум буда, $u(x, t)$ — функцияи ҷустуҷӯшаванда мебошад.

Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки $k(t, \tau)$ — ядрои муодилаи интегралӣ номида мешавад ([117], [73], [89]). Дар ҳолати $f(x, t) = 0$ — будан муодилаи (3.1.1) — ро муодилаи якҷинса меноманд.

Таъриф 2: Муодилаи намуди

$$\int_0^t k(t, \tau) u(x, \tau) d\tau = f(x, t) \quad (3.1.2)$$

муодилаи интегралӣ хаттӣ чинси як номида мешавад. Дар ин ҷо $k(t, \tau), f(x, t)$ – функцияҳои маълум буда, $u(x, t)$ – функцияи ҷустуҷӯшаванда мебошад.

Дар ҳаёт боз ҳодисаҳои мавҷуданд, ки барои шарҳи онҳо на фақат муодилаи дифференциалӣ ва муодилаи интегралӣ лозим аст, балки муодилае лозим аст, ки хосиятҳои ин ду мафҳумро дар бар гирад ва ин гуна муодилаи муодилаи интегро-дифференциалӣ мебошад. Яъне муодилаҳои интегро-дифференциалӣ муодилаҳои мебошанд, ки функцияи номаълум дар як вақт ҳам дар зери аломати ҳосила ва ҳам дар зери аломати интеграл қарор дорад. Дар таҳқиқ намудани муодилаҳои интегро-дифференциалӣ олимони зеиёде кор ва фаъолияти илми намудаанд ([44], [60], [61], [118]) аз ҷумла М.Гуртин, В.Пипкин ва ғайраҳо. Бори нахуст олимони М.Гуртин ва В.Пипкин масъалаи гармигузаронӣ бо ҳофизаи онро таҳқиқ намуда дар натиҷа муодилаи интегро-дифференциалӣ ҳосил карданд, ки ҳоло муодилаи мазкур ба номи ин ду олим машҳур аст.

Таъриф 3: *Муодилаҳои интегро-дифференциалӣ, ки функцияи номаълумашон аз ду ва зиёда тағирёбанда иборат буда ва он функцияи номаълум дар як вақт ҳам дар зери аломати ҳосила ва ҳам дар зери аломати интеграл қарор дорад муодилаи интегро-дифференциалӣ бо ҳосилаи хусусӣ номида мешавад.*

Ба мисли муодилаҳои дифференциалӣ бо ҳосилаи хусусӣ, муодилаҳои интегро-дифференциалӣ низ дорои навъи параболическӣ, гиперболическӣ ва эллипсӣ мебошанд, ки намудҳои онҳо чунинанд:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + a \frac{\partial u}{\partial t} + bu = c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau + f(x, t) \quad (3.1.3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + bu = c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau + f(x, t) \quad (3.1.4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} a \frac{\partial u}{\partial t} + bu = \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau + f(x, t) \quad (3.1.5)$$

3.2. Муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф

3.2.1 Мафҳуми асосӣ

Сараввал ҳаминро қайд менамоем, ки то ҳол дар дунё ҳалли муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф аз тарафи олимон дида баромада нашудааст. Барои ҳамин мо дар назди худ вазифа гузоштем, ки муодилаи интегро-дифференсиалии телеграфро бо шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ додашуда бо истифода аз усули ҳисоби оператсионӣ ҳал намоем. Намуди умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф чунин аст:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (2b + 1) \frac{\partial u}{\partial t} + b^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau + f(t) \quad (3.2.1)$$

Гузориши масъала: Шартҳои ибтидоӣ

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x) \\ u'_t(x, 0) = u_1(x) \end{cases} \quad (3.2.2_1)$$

буда ва шартҳои канорӣ бошад

$$\begin{cases} u(0, t) = \varphi_1(t) \\ u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \end{cases} \quad (3.2.2_2)$$

мебошад.

Табдилоти Лаплас-Карсонро татбиқ намуда муодилаи (3. 2. 1)-ро бо шартҳои додашудаи (3. 2. 2) ҳал мекунем. Ҳаминро талаб кардан зарур аст, ки ҳар яке аз ин функсияҳо $u_0(x), u_1(x), \varphi_1(t), \varphi_2(t), f(t)$ бефосила ва дифференсиронидашаванда нисбат ба ҳарду тағирёбанда бошанд ва инчунин шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноат кунанд. ([78], [63], [93]) Пеш аз ҳалли

масъала тасвири ҳосила, интеграл ва функсияхоро меорем ([20],[108])

$$u(x, 0) = u_0(x) \rightarrow U_0(p), u(0, t) = \varphi_1(t) \rightarrow \Phi_1(q),$$

$$u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \rightarrow \Phi_2(q), u'_t(x, 0) = u_1(x) \rightarrow U_1(p),$$

$$u(x, t) \Rightarrow U(p, q), f(t) \rightarrow F(q)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q); \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Rightarrow q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p);$$

$$u_t \Rightarrow q[U(p, q) - U_0(p)]$$

$$\int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \{p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q)\}$$

ҳар яке аз ин тасвирҳоро ба муодилаи (3. 2. 1) гузошта баробарии зеринро ҳосил мекунем

$$q^2[U(p, q) - U_0(p)] - qU_1(p) + (2b + 1)q[U(p, q) - U_0(p)] + b^2U(p, q) =$$

$$p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q) + \frac{1}{q}A(q)\{p^2[U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q)\} \\ + F(q)$$

$$q^2U(p, q) - q^2U_0(p) - qU_1(p) + (2b + 1)qU(p, q) - (2b + 1)qU_0(p) \\ + b^2U(p, q)$$

$$= p^2U(p, q) - p^2\Phi_1(q) - p\Phi_2(q) + \left[\frac{1}{q}A(q)p^2U(p, q) - \frac{1}{q}A(q)p^2\Phi_1(q) \right] \\ - \frac{1}{q}A(q)p\Phi_2(q) + F(q);$$

$$\left(q^2 + (2b + 1)q + b^2 - p^2 - \frac{1}{q}A(q)p^2 \right) U(p, q)$$

$$= (q^2 + q(2b + 1))U_0(p) + qU_1(p) - \left(1 + \frac{1}{q}A(q) \right) p^2\Phi_1(q)$$

$$-\left(1 + \frac{1}{q}A(q)\right)p\Phi_2(q) + F(q)$$

Яъне

$$U(p, q) = \frac{-\left(1 + \frac{1}{q}A(q)\right)p^2\Phi_1(q) - \left(1 + \frac{1}{q}A(q)\right)p\Phi_2(q)}{q^2 + (2b + 1)q + b^2 - p^2 - \frac{1}{q}A(q)p^2} +$$

$$+ \frac{(q^2 + (2b + 1)q)U_0(p) + qU_1(p) + F(q)}{q^2 + (2b + 1)q + b^2 - p^2 - \frac{1}{q}A(q)p^2} \quad (3.2.3)$$

мешавад. Баробарии (3. 2. 3) ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ихтиёри ядро дар фазои зудӣ, ки дар ин фазо функсияи тағирёбандааш комплексӣ амал мекунад номида мешавад.

3.2.2 Ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядрои функсияи хаттӣ

Ҳалли умумии муодиларо барои ядрои $a(t) = b^2t + (2b + 1)$ дида мебароем ва чи тавре мо медонем ([20] – [23]) тасвири ядро

$$A(q) = (2b + 1) + \frac{b^2}{q}$$

мебошад. Ҳамин тавр тасвири ядроро ба баробарии (3. 2. 3) гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = \frac{q^2(q^2 + (2b + 1)q)U_0(p) + q^3U_1(p)}{q^2(q^2 + (2b + 1)q + b^2) - p^2(q^2 + (2b + 1)q + b^2)} +$$

$$\frac{-\left(q^2 + q\left((2b + 1) + \frac{b^2}{q}\right)\right)p^2\Phi_1(q) - \left(q^2 + q\left((2b + 1) + \frac{b^2}{q}\right)\right)p\Phi_2(q)}{q^2(q^2 + (2b + 1)q + b^2) - p^2(q^2 + (2b + 1)q + b^2)}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{q^2 F(q)}{q^2(q^2 + (2b+1)q + b^2) - p^2(q^2 + (2b+1)q + b^2)} \\
& = \frac{q^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q^3 U_1(p)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} + \\
& \frac{-(q^2 + (2b+1)q + b^2)p^2 \Phi_1(q) - (q^2 + (2b+1)q + b^2)p \Phi_2(q)}{(q^2 + \alpha q + \beta)(q^2 - p^2)} \\
& + \frac{q^2 F(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)}
\end{aligned}$$

Яъне

$$\begin{aligned}
U(p, q) &= \frac{q^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q^3 U_1(p)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} + \\
& \frac{-(q^2 + (2b+1)q + b^2)p^2 \Phi_1(q) - (q^2 + (2b+1)\alpha q + b^2)p \Phi_2(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} + \\
& \frac{q^2 F(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} \tag{3.2.4}
\end{aligned}$$

Маълум аст, ки дар ҳолати $p = \pm q$ будан махраҷ нол мешавад ва дар ҳолати $p = q$ будан сурат кай нол мешавад муайян мекунем

$$\begin{aligned}
& q^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q^3 U_1(p) - (q^2 + (2b+1)q + b^2)p^2 \Phi_1(q) \\
& - (q^2 + (2b+1)q + b^2)p \Phi_2(q) + q^2 F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& q^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(q) + q^3 U_1(q) - (q^2 + (2b+1)q + b^2)q^2 \Phi_1(q) \\
& - (q^2 + (2b+1)q + b^2)q \Phi_2(q) + q^2 F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{q^2(q^2 + (2b+1)q)}{q(q^2 + (2b+1)q + b^2)} U_0(q) + \frac{q^3}{q(q^2 + (2b+1)q + b^2)} U_1(q) - q \Phi_1(q) \\
& - \Phi_2(q) + \frac{q^2}{q(q^2 + (2b+1)q + b^2)} F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_2(q) = & \frac{q(q^2 + (2b+1)q)}{q^2 + (2b+1)q + b^2} U_0(q) + \frac{q^2}{q^2 + (2b+1)q + b^2} U_1(q) + \\ & + \frac{q^2 F(q)}{q^2 + (2b+1)q + b^2} - q\Phi_1(q)\end{aligned}\quad (3.2.5)$$

Баробарии (3. 2. 5)-ро ба баробарии (3. 2. 4) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}U(p, q) = & \frac{q^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q^3U_1(p)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} + \\ & + \frac{-(q^2 + (2b+1)q + b^2)p^2\Phi_1(q) + q^2F(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} + \\ & + \frac{-p(q(q^2 + (2b+1)q)U_0(q) + q^2U_1(q) - q(q^2 + (2b+1)q + b^2)\Phi_1(q) + qF(q))}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)}\end{aligned}$$

Яъне

$$\begin{aligned}U(p, q) = & \left\{ \frac{q^2 + (2b+1)q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q^2U_0(p) - pqU_0(q)}{q^2 - p^2} \right\} + \\ & \left\{ \frac{q^2}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{qU_1(p) - pU_1(q)}{q^2 - p^2} \right\} + \\ & \left\{ \frac{(pq - p^2)\Phi_1(q)}{q^2 - p^2} \right\} + \left\{ \frac{(q^2 - pq)F(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} \right\}\end{aligned}\quad (3.2.6)$$

Бинобар сабаби он, ки табдилоти Лаплас-Карсон тасвири функсияи ҳақиқии дар фазои вақт мавҷудбударо дар фазои зудӣ нишон медиҳад бинобар ин баробарии (3. 2. 6) ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1) дар фазои зудӣ буда, функсияи тағирёбандааш комплекси ба шумор меравад ([56], [19], [112], [114]). Чи тавре мебинем баробарии (3. 2. 6) аз чор чамъшавандаи қавсҳо иборат аст. Аз баски барои мо ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1) дар фазои вақт, ки дар ин фазо функсияи тағирёбандааш ҳақиқӣ амал мекунад лозим аст бинобар ин бо истифода аз табдилоти баъакси Лаплас-

Карсон барои ҳар як функцияи дар қавсҳо мавҷудбуда функцияи ҳақиқӣ ҷустуҷӯ мекунем:

$$\begin{aligned}
 & 1. \left\{ \frac{q^2 + (2b+1)q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q^2 U_0(p) - pq U_0(q)}{q^2 - p^2} \right\} \Leftarrow \\
 & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) u_0(x+\tau-s) ds d\tau - \\
 & -M \cdot \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau \right. \\
 & \left. - \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau \right)
 \end{aligned}$$

дар ин ҷо

$$M = \frac{b^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}}$$

мебошад.

сараввал ифодаро содда мекунем

$$\begin{aligned}
 & \frac{q^2 + (2b+1)q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q^2 U_0(p) - pq U_0(q)}{q^2 - p^2} = \\
 & \frac{q^2 + (2b+1)q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q^2 U_0(p) - pq U_0(q)}{q^2 - p^2} \\
 & = \frac{q^2 + (2b+1)q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q}{p+q} \cdot \frac{p U_0(q) - q U_0(p)}{p-q}
 \end{aligned}$$

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau)) u_0(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \frac{b^2}{2\sqrt{b + 0,25}} \delta(t-s-\tau) u_0(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} M \delta(t-s-\tau) u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} M \left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau
\end{aligned}$$

бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралӣ мазкурро меёбем, ки дар ин ҷо $M = \frac{b^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}}$ мебошад ([62], [63]).

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) dx dt =$$

Гузориши $x-s=u$; $t-s=v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) du dv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

бигзор $a_1 = 0$ бошад

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \delta'(v-\tau) u_0(u+\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \frac{b^2}{2\sqrt{b+0,25}} \delta(v-\tau) u_0(u+\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds -$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \frac{N_1 b^2}{2\sqrt{b+0,25}} e^{-N_1(v-\tau)} u_0(u+\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds -$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \frac{0,5b^2}{\sqrt{b+0,25}} \delta(v-\tau) u_0(u+\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \frac{0,5N_2 b^2}{\sqrt{b+0,25}} e^{-N_2(v-\tau)} u_0(u+\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds =$$

Дар ин ҷо $N_{1,2} = b + \frac{1}{2} \pm \sqrt{b + \frac{1}{4}}$ мебошад. Чи тавре мо медонем

(ба ҷадвали 1.2.1. ва 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) F(p, q)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{q} \cdot q^2 \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q)s}}{p + q} \Big|_0^R \right) + \\
& + \frac{1}{q} \cdot \frac{b^2}{2\sqrt{b+0,25}} \cdot \left(q - \frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)q}{q + b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \frac{1}{p + q} - \\
& - \frac{1}{q} \cdot \frac{b^2}{2\sqrt{b+0,25}} \cdot \left(q - \frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)q}{q + b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \frac{1}{p + q} = \\
& = \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2} \left(q - \frac{qb^2}{q^2 + 2bq + b^2 + q} \right) \\
& = \frac{q^3 + (2b + 1)q^2}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2}
\end{aligned}$$

ҳамин тавр тасвири интегралҳои мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t - s - \tau)) u_0(x + \tau - s) ds d\tau + \\
& -M \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x + \tau - s) ds d\tau + \\
& +M \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x + \tau - s) ds d\tau \\
& \Rightarrow \frac{q^3 + (2b + 1)q^2}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2} ; \left(M = \frac{b^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right)
\end{aligned}$$

$$2. \left\{ \frac{q^2}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{qU_1(p) - pU_1(q)}{q^2 - p^2} \right\} \Leftarrow$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x+\tau-s) ds d\tau +$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) ds d\tau -$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) ds d\tau$$

Сараввал ифодаи дар дохили кавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\begin{aligned} & \frac{q^2}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{qU_1(p) - pU_1(q)}{q^2 - p^2} \\ &= \frac{q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{q}{p+q} \cdot \frac{pU_1(q) - qU_1(p)}{p-q} \end{aligned}$$

Тасвири интегралӣ зеринро меёбем, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_0(x+\tau-s) ds d\tau +$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau -$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x + \tau - s) ds d\tau$$

бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) dx dt =$$

Гузориши $x-s=u$; $t-s=v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) du dv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \right) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

бигзор $a_1 = 0$ бошад

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v \delta(v-\tau) u_0(u+\tau) d\tau \right) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v M_1 e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} u_0(u+\tau) d\tau \right) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds -$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v M_2 e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} u_0(u+\tau) d\tau \right) du dv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds =$$

Дар ин ҷо $M_{1,2} = \frac{\left(b + \frac{1}{2} \mp \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}}$ мебошад.

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v - \tau) f(u; \tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) F(p, q)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{q} \cdot q \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(p+q)s}}{p + q} \Big|_0^R \right) + \\ & + \frac{1}{q} \cdot \frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{q}{q + b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \frac{1}{p + q} - \\ & - \frac{1}{q} \cdot \frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{q}{q + b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p - q} \cdot \frac{1}{p + q} = \\ & \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \left(\frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{q + b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}} - \frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{q + b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) + \\ & + \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2} = \frac{q^2}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2} \end{aligned}$$

Ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t - s - \tau) u_0(x + \tau - s) ds d\tau +$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x + \tau - s) ds d\tau -$$

$$\frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x + \tau - s) ds d\tau$$

$$\Rightarrow \frac{q^2}{(q+b)^2 + q} \cdot \frac{pU_0(q) - qU_0(p)}{p^2 - q^2}$$

$$3. \left\{ \frac{(pq - p^2)\Phi_1(q)}{q^2 - p^2} \right\} = \left\{ \frac{p\Phi_1(q)}{p + q} \right\} \Leftarrow \varphi_1(t - x)$$

Сараввал ифодаи дар дохили қавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\frac{(pq - p^2)\Phi_1(q)}{q^2 - p^2} = \frac{p(p - q)\Phi_1(q)}{(p - q)(p + q)} = \frac{p\Phi_1(q)}{p + q}$$

Чи тавре бар мо маълум аст ([20], [38])

$$\frac{p\Phi_1(q)}{p + q} \Leftarrow \varphi_1(t - x)$$

мебошад.

$$4. \left\{ \frac{(q^2 - pq)F(q)}{(q^2 + (2b + 1)q + b^2)(q^2 - p^2)} \right\} \Leftarrow$$

$$\frac{1}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x - s)f(\tau) ds d\tau$$

$$\frac{-1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau$$

Барои тасвири функсияи дар қавси (4) мавҷудбуда функсияи ҳақиқӣ ҷустуҷӯ мекунем

$$\begin{aligned} \frac{(q^2 - pq)F(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(q^2 - p^2)} &= \frac{qF(q)}{(q^2 + (2b+1)q + b^2)(p+q)} \\ &= \frac{q}{q^2 + (2b+1)q + b^2} \cdot \frac{H(p)F(q)}{p+q} \end{aligned}$$

Тасвири интегралҳои зеринро меёбем, ки намуди умумии онҳо чунин аст:

$$\begin{aligned} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{\frac{1}{2}b^2\left(b+\frac{1}{4}\right)^{\frac{-1}{2}}}{b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}} - \frac{b+\frac{1}{2}}{\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \\ + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \end{aligned}$$

Чи тавре мебинем барои ёфтани тасвири интегралҳо ва функсияҳо табдилотҳои интегрони истифодашаванда мебошанд ([1],[21],[22]). Бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралҳои мазкурро меёбем

$$\begin{aligned} pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} K_1 e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \right) dx dt + \\ pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} K_2 e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \right) dx dt = \end{aligned}$$

Дар ин ҷо $K_{1,2} = \frac{\pm b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}\mp\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} \mp \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}$ мебошад.

Гузориши $x - s = u; t - s = v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
 & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v K_1 e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} h(u)f(\tau) ds d\tau \right) dudv + \\
 & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v K_2 e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} h(u)f(\tau) ds d\tau \right) dudv = \\
 & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v K_1 e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} h(u)f(\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds + \\
 & pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v K_2 e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} h(u)f(\tau) d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q)s} ds =
 \end{aligned}$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) F(p, q)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} - \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{\frac{1}{q} \cdot q \cdot H(p)F(q)}{q+b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \cdot \frac{1}{p+q} + \\
 & \left(\frac{-b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} + \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{q+b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \cdot \frac{H(p)F(q)}{p+q}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} - \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{H(p)F(q)}{q+b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \cdot \frac{1}{p+q} + \\
&+ \left(\frac{-b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} + \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) \cdot \frac{H(p)F(q)}{q+b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \cdot \frac{1}{p+q} = \\
&= \frac{q}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{H(p)F(q)}{p+q}
\end{aligned}$$

Ҳамин тавр тасвири интеграли мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} K_1 e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau + \\
&\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} K_2 e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \Rightarrow \\
&\frac{q}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{H(p)F(q)}{p+q} ; \left(K_{1,2} = \frac{\pm b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}\mp\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} \mp \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right)
\end{aligned}$$

дар ин ҷо

$$K_1 = \frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}\mp\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} - \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}$$

ва

$$K_2 = \frac{-b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}\left(b+\frac{1}{2}\mp\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)} + \frac{2b+1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}$$

мебошад.

Ҳамин тавр барои ҳамаи қавсҳои дар баробарии (3. 2. 6) мавҷудбуда
функсияи ҳақиқи муайян кардем, акнун ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1)-ро
барои ядрои $a(t) = b^2 t + 2b + 1$ менависем

$$\begin{aligned}
u(x; t) = & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau)) u_0(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& b^2 \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + 0,25}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& b^2 \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x+\tau-s) ds d\tau + \varphi_1(t-x) + \\
& \frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& \frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s) f(\tau) ds d\tau +
\end{aligned}$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x-s)f(\tau) dsd\tau \quad (3.2.7)$$

Ҳамин тавр ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1)-ро ҳангоми ядро функцияи хаттӣ будан муайян намудем ва ҳоло баробарии (3. 2. 7)-ро шарҳ медиҳем

Ҳалли муодиларо ҳангоми $x > t$ будан менависем

$$\begin{aligned} u(x; t) = & \int_0^t \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau)) u_0(x+\tau-s) dsd\tau - \\ & b^2 \int_0^t \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + 0,25}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) dsd\tau + \\ & b^2 \int_0^t \int_0^{t-s} \left(\frac{b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{b + 0,25}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) dsd\tau + \\ & \int_0^t \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x+\tau-s) dsd\tau + \\ & \frac{\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^t \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) dsd\tau - \\ & \frac{\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^t \int_0^{t-s} e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x+\tau-s) dsd\tau - \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^t\int_0^{t-s}\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}h(x-s)f(\tau)dsd\tau +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^t\int_0^{t-s}\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}h(x-s)f(\tau)dsd\tau$$

Ҳалли муодиларо ҳангоми $x < t$ бӯдан менависем

$$u(x;t) = \int_0^x\int_0^{t-s}(\delta'(t-s-\tau))u_0(x+\tau-s)dsd\tau -$$

$$b^2\int_0^x\int_0^{t-s}\left(\frac{b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}}{2\sqrt{b+0,25}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}u_0(x+\tau-s)dsd\tau +$$

$$b^2\int_0^x\int_0^{t-s}\left(\frac{b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}u_0(x+\tau-s)dsd\tau +$$

$$\int_0^x\int_0^{t-s}\delta(t-s-\tau)u_1(x+\tau-s)dsd\tau + \varphi_1(t-x) +$$

$$\frac{\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^{\min(x,t)}\int_0^{t-s}e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}u_1(x+\tau-s)dsd\tau -$$

$$\frac{\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^x\int_0^{t-s}e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}u_1(x+\tau-s)dsd\tau -$$

$$\frac{1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^x\int_0^{t-s}\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}h(x-s)f(\tau)dsd\tau +$$

$$\frac{1}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}}\int_0^x\int_0^{t-s}\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)}h(x-s)f(\tau)dsd\tau$$

3.2.3 Ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядрои $a(t) = (1 - bt)e^{-bt}$

Ҳамин тавр ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1)-ро бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда барои ядрои $a(t) = (1 - bt)e^{-bt}$ дида мебароем ва чи тавре аён аст ядро функсияи яктағирёбанда мебошад ([65], [103]). Чи гунае, ки мо медонем ([20], [21]) тасвири ядро $A(q) = \left(\frac{q}{q+b}\right)^2$ мебошад. Ҳамин тавр тасвири ядроро ба баробарии (3. 2. 3) гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = \frac{(q^2 + (2b + 1)q)U_0(p) + qU_1(p)}{q^2 + (2b + 1)q + b^2 - p^2 - \frac{q}{(q + b)^2}p^2}$$

$$- \frac{\left(1 + \frac{q}{(q + b)^2}\right)p^2\Phi_1(q) - \left(1 + \frac{q}{(q + b)^2}\right)p\Phi_2(q) + F(q)}{q^2 + (2b + 1)q + b^2 - p^2 - \frac{q}{(q + b)^2}p^2}$$

$$= \frac{(q + b)^2(q^2 + (2b + 1)q)U_0(p) + q(q + b)^2U_1(p)}{((q + b)^2 + q)((q + b)^2 - p^2)}$$

$$- \frac{((q + b)^2 + q)p^2\Phi_1(q) - ((q + b)^2 + q)p\Phi_2(q)}{((q + b)^2 + q)((q + b)^2 - p^2)}$$

$$\frac{(q + b)^2F(q)}{((q + b)^2 + q)((q + b)^2 - p^2)}$$

Яъне

$$\begin{aligned}
U(p, q) = & \frac{(q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q(q+b)^2U_1(p)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} + \\
& \frac{-((q+b)^2 + q)p^2\Phi_1(q) - ((q+b)^2 + q)p\Phi_2(q)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} + \\
& \frac{(q+b)^2F(q)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)}
\end{aligned} \tag{3.2.8}$$

мешавад.

Маълум аст, ки дар ҳолати $p = \pm(q+b)$ будан махраҷ нол мешавад ва аз баски $p = -(q+b)$ ба соҳаи наздикшавии интегралҳои Лаплас тааллуқ надорад ([63]) бинобар ин онро решаи бегона мешуморем ва дар ҳолати $p = q+b$ будан сурат қай нол мешавад муайян мекунем

$$\begin{aligned}
& (q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(q+b) + q(q+b)^2U_1(q+b) \\
& - ((q+b)^2 + q)(q+b)^2\Phi_1(q) - ((q+b)^2 + q)(q+b)\Phi_2(q) + \\
& (q+b)^2F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(q+b) + q(q+b)^2U_1(q+b) \\
& - ((q+b)^2 + q)(q+b)^2\Phi_1(q) - ((q+b)^2 + q)(q+b)\Phi_2(q) \\
& + (q+b)^2F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{(q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)}{((q+b)^2 + q)(q+b)}U_0(q+b) + \frac{q(q+b)^2}{((q+b)^2 + q)(q+b)}U_1(q+b) \\
& - \frac{((q+b)^2 + q)}{((q+b)^2 + q)(q+b)}(q+b)^2\Phi_1(q) - \Phi_2(q) \\
& + \frac{(q+b)^2}{((q+b)^2 + q)(q+b)}F(q) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Phi_2(q) = & \frac{(q+b)(q^2 + (2b+1)q)}{((q+b)^2 + q)}U_0(q+b) + \frac{q(q+b)}{((q+b)^2 + q)}U_1(q+b) \\
& - (q+b)\Phi_1(q) + \frac{(q+b)}{((q+b)^2 + q)}F(q)
\end{aligned} \tag{3.2.9}$$

Баробарии (3. 2. 9)-ро ба (3. 2. 8) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
 U(p, q) = & \frac{(q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q(q+b)^2U_1(p)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} + \\
 & \frac{-((q+b)^2 + q)p^2\Phi_1(q) + (q+b)^2F(q)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} - \\
 & - \frac{((q+b)^2 + q)p \left(\frac{(q+b)(q^2 + (2b+1)q)U_0(q+b)}{((q+b)^2 + q)} + \frac{(q+b)F(q)}{((q+b)^2 + q)} \right)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} + \\
 & \frac{((q+b)^2 + q)p \left(\frac{q(q+b)U_1(q+b)}{((q+b)^2 + q)} - (q+b)\Phi_1(q) \right)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)}
 \end{aligned}$$

Яъне

$$\begin{aligned}
 U(p, q) = & \frac{(q+b)^2(q^2 + (2b+1)q)U_0(p) + q(q+b)^2U_1(p)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} \\
 & \frac{-((q+b)^2 + q)p^2\Phi_1(q) + (q+b)^2F(q)}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} - \\
 & - \frac{p((q+b)(q^2 + (2b+1)q)U_0(q+b) + (q+b)F(q))}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)} \\
 & + \frac{p(q(q+b)U_1(q+b) - (q+b)((q+b)^2 + q)\Phi_1(q))}{((q+b)^2 + q)((q+b)^2 - p^2)}
 \end{aligned}$$

мешавад. Ҳамин тавр ҳалро бо тартиби муайян менависем

$$\begin{aligned}
 U(p, q) = & \left\{ \frac{(q+b)(q^2 + (2b+1)q)}{(q+b)^2 + q} \cdot \frac{(q+b)U_0(p) - pU_0(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} \\
 & + \left\{ \frac{q(q+b)}{(q+b)^2 + q} \cdot \frac{(q+b)U_1(p) - pU_1(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} + \left\{ \frac{p\Phi_1(q)}{p+q+b} \right\}
 \end{aligned}$$

$$+ \left\{ \frac{q+b}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{F(q)}{p+q+b} \right\} \quad (3.2.10)$$

Барои ҳар яке аз кафсҳои дар баробарии (3. 2. 10) мавҷудбуда дар алоҳиддаги функсияи ҳақиқи ҷустуҷу мекунем

$$1. \left\{ \frac{(q+b)(q^2+(2b+1)q)}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{(q+b)U_0(p) - pU_0(q+b)}{(q+b)^2-p^2} \right\} \Leftarrow$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau) + 2b\delta(t-s-\tau)) u_0(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$\frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (e^{-l_1(t-s-\tau)} - e^{-l_2(t-s-\tau)}) u_0(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau$$

Дар ин ҷо $l_{1,2} = b + \frac{1}{2} \mp \sqrt{b + \frac{1}{4}}$ мебошад.

Барои ёфтани функсияи ҳақиқи ба тасвир қавси якум мувофиқбуда тасвири интегралӣ зеринро меёбем, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau$$

бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) f(x-s;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) dx dt =$$

Ғузориши $x-s=u; t-s=v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v a(v-\tau) f(u;\tau) e^{-a_1 s} ds d\tau \right) dudv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v a(v-\tau) u_0(u+\tau) e^{-b\tau} d\tau \right) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v-\tau) u_0(u+\tau) e^{-b\tau} d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \cdot \frac{q}{q+b} \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p - (q+b)}$$

мебошад, бинобар ин ҳангоми $a_1 = b$ будан ҳосил мекунем

$$\frac{1}{q} A(q) F(p, q) \cdot \left(-\frac{e^{-(p+q+b)s}}{p+q+a_1} \Big|_0^\infty \right) = \frac{1}{q} A(q) F(p, q) \cdot \frac{1}{p+q+b}$$

Дар ҳолати

$$a(t) = \delta'(t) + 2b\delta(t) + \frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \left(e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)t} - e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)t} \right)$$

будан баробарии мазкур намуди зеринро мегирад

$$\frac{A(q)}{q+b} \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2} =$$

$$\frac{1}{q+b} \left(q^2 + 2bq + \frac{qb^2}{\left(q+b+\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)^2} \right) \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2} =$$

$$\frac{q}{q+b} \cdot \left(q + 2b + \frac{b^2}{(q+b)^2 + q} \right) \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2} =$$

$$\frac{q}{q+b} \cdot \frac{(q+b)^2(q+2b+1)}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2} =$$

$$\frac{(q+b)(q^2 + (2b+1)q)}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2}$$

Ҳамин тавр тасвири интегралли мазкур маълум шуд, ки он чунин аст:

$$\frac{(q+b)(q^2 + (2b+1)q)}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{pU_0(q+b) - (q+b)U_0(p)}{p^2 - (q+b)^2} \Leftarrow$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau) + 2b\delta(t-s-\tau)) u_0(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$\frac{b^2}{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (e^{-l_1(t-s-\tau)} - e^{-l_2(t-s-\tau)}) u_0(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau$$

дар ин ҷо $l_{1,2} = b + \frac{1}{2} \mp \sqrt{b + \frac{1}{4}}$ мебошад.

Ҳамин тавр ба монанди қавси якум барои қавси дуюм низ функсияи ҳақиқи ҷустуҷӯ мекунем.

$$2 \cdot \left\{ \frac{q(q+b)}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{(q+b)U_1(p) - pU_1(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau - \right.$$

$$\left. \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2b+1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} + \frac{1}{2} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+b}\right)(t-s-\tau)} u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \right.$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2b+1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} - \frac{1}{2} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}+b}\right)(t-s-\tau)} u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau \Bigg)$$

$$3. \left\{ \frac{p\Phi_1(q)}{p+q+b} \right\} \Leftarrow e^{-bx} \varphi_1(t-x)$$

Функсияи ҳақиқии дар қавси мазкур мавҷудбуда алақай бар мо маълум мебошад. ([37], [38])

$$4. \left\{ \frac{q+b}{(q+b)^2+q} \cdot \frac{F(q)}{p+q+b} \right\} \Leftarrow$$

$$\left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau +$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \left(\int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \right) e^{-bs} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \Bigg)$$

Барои ёфтани функсияи ҳақиқии ба тасвир қавси чорум мувофиқбуда тасвири интегралӣ зеринро меёбем, ки намуди умумии он чунин аст:

$$\int_0^{\min(x,t)} \left(\int_0^{t-s} l'_1 e^{-l_1(t-s-\tau)} + l'_2 e^{-l_2(t-s-\tau)} \right) e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau$$

дар ин ҷо $l_{1,2} = b + \frac{1}{2} \mp \sqrt{b + \frac{1}{4}}$ ва $l'_{1,2} = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}}$ мебошад.

Бо истифода аз табдилоти Лаплас –Карсон тасвири интегралӣ мазкурро меёбем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} l'_1 e^{-l_1(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau \right) dx dt +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-px-qt} \left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} l'_2 e^{-l_2(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau \right) dx dt =$$

гузориши $x - s = u$; $t - s = v$ –ро истифода карда ҳосил мекунем

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v l'_1 e^{-l_1(v-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(u) f(\tau) ds d\tau \right) dudv +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(u+s)-q(v+s)} \left(\int_0^\infty \int_0^v l'_2 e^{-l_2(v-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(u) f(\tau) ds d\tau \right) dudv =$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v l'_1 e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(v-\tau)} f(\tau) d\tau \right) h(u) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q+b)s} ds +$$

$$pq \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-pu-qv} \left(\int_0^v l'_2 e^{-l_2(v-\tau)} f(\tau) d\tau \right) h(u) dudv \int_0^\infty e^{-(p+q+a_1)s} ds =$$

$$\left(p \int_0^\infty e^{-pu} h(u) du \right) \left(q \int_0^\infty e^{-qv} \left(\int_0^v l'_1 e^{-l_1(v-\tau)} f(\tau) d\tau \right) dv \right) \int_0^\infty e^{-(p+q+b)s} ds +$$

$$\left(p \int_0^\infty e^{-pu} h(u) du \right) \left(q \int_0^\infty e^{-qv} \left(\int_0^v l'_2 e^{-l_2(v-\tau)} f(\tau) d\tau \right) dv \right) \int_0^\infty e^{-(p+q+b)s} ds =$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^v a(v-\tau) f_2(x, \tau) d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \cdot F_2(p, q)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
&= \frac{H(p)}{q} \left(\frac{l'_1 q}{q + b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}} + \frac{l'_2 q}{q + b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) \frac{F(q)}{p + q + b} = \\
&\left(\frac{0,5q}{q + l_1} - \frac{1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{q}{q + l_1} + \frac{0,5q}{q + l_2} + \frac{1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \cdot \frac{q}{q + l_2} \right) \frac{H(p)F(q)}{q(p + q + b)} = \\
&\frac{q \left(q + b + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2}q}{\left(q + b + \frac{1}{2} \right)^2 - \left(\sqrt{b + \frac{1}{4}} \right)^2} \cdot \frac{H(p)F(q)}{q(p + q + b)} = \frac{q(q + b)}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{H(p)F(q)}{q(p + q + b)} = \\
&\frac{q + b}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{H(p)F(q)}{q(p + q + b)} = \frac{q + b}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{F(q)}{q(p + q + b)}
\end{aligned}$$

Ҳамин тавр тасвири интегралӣ мазкур маълум шуд.

$$\begin{aligned}
&\left(\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau + \right. \\
&\left. \int_0^{\min(x,t)} \left(\int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \right) e^{-bs} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \right) \\
&\Rightarrow \frac{q + b}{(q + b)^2 + q} \cdot \frac{H(p)F(q)}{q(p + q + b)} \tag{3.2.11}
\end{aligned}$$

дар ин ҷо $l_{1,2} = b + \frac{1}{2} \mp \sqrt{b + \frac{1}{4}}$ ва $l'_{1,2} = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}}$ мебошад.

Дар баробарии (3. 2. 11) $H(p)$ тасвири функсияи Хевисайд мебошад, ки он чунин маъно дорад: ([16], [63])

$$H(p) \rightarrow h(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \text{ ё } h(t) = 1 \rightarrow H(p); \quad t > 0$$

Ҳамин тавр барои ҳамаи қавсҳои дар баробарии (3. 2. 10) мавҷудбуда функсияи ҳақиқи ёфтем акнун ҳалли умумии муодилаи (3. 2. 1)-ро барои ядрои $a(t) = (1 - bt)e^{-bt}$ бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда менависем

$$u(x, t) = e^{-bx} \varphi_1(t - x) +$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t - s - \tau) u_1(x - s + \tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t - s - \tau) + 2b\delta(t - s - \tau)) u_0(x - s + \tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$\frac{b^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(\frac{1}{2} - \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bt} \cdot u_0(x - s + \tau) ds d\tau -$$

$$\frac{b^2}{2\sqrt{b + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(\frac{1}{2} + \sqrt{b + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bt} u_0(x - s + \tau) ds d\tau -$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2b + 1}{4\sqrt{b + \frac{1}{4}}} + \frac{1}{2} \right) e^{-\left(b + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + b}\right)(t-s-\tau)} u_1(x - s + \tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2b+1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} - \frac{1}{2} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}+b}\right)(t-s-\tau)} u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(b+\frac{1}{2}-\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau + \\
& \frac{2\sqrt{b+\frac{1}{4}}+1}{4\sqrt{b+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(b+\frac{1}{2}+\sqrt{b+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-bs} h(x-s) f(\tau) ds d\tau \quad (3.2.12)
\end{aligned}$$

Зикр кардан бо маврид аст, ки дар ҳолати $b = 0$ будан ядроҳои муодила бо ҳам баробар мешаванд. Яъне $a(t) = 1$ мешавад. Модоме, ки ядроҳо бо ҳам баробар шуданд пас ҳалҳо низ бояд бо ҳам баробар бошанд ва инро нишон медиҳем.

Дар ҳолати $b = 0$ будан баробарии (3. 2. 7) чунин намуд мегирад

$$\begin{aligned}
u(x; t) &= \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau)) u_0(x+\tau-s) ds d\tau - \\
& 0^2 \cdot \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{0+\frac{1}{2}+\sqrt{0+\frac{1}{4}}}{2\sqrt{0+0,25}} \right) e^{-\left(0+\frac{1}{2}+\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& 0^2 \cdot \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{0+\frac{1}{2}-\sqrt{0+\frac{1}{4}}}{2\sqrt{0+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(0+\frac{1}{2}-\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_0(x+\tau-s) ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x+\tau-s) ds d\tau + \varphi_1(t-x) +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\left(0 + \frac{1}{2} - \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{0 + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(0 + \frac{1}{2} - \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x + \tau - s) ds d\tau - \\
& \frac{\left(0 + \frac{1}{2} + \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)^2}{2\sqrt{0 + \frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(0 + \frac{1}{2} + \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} u_1(x + \tau - s) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{0 + \frac{1}{2} - \sqrt{0 + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{0 + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(0 + \frac{1}{2} - \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x - s) f(\tau) ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{0 + \frac{1}{2} + \sqrt{0 + \frac{1}{4}}}{2\sqrt{0 + \frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(0 + \frac{1}{2} + \sqrt{0 + \frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} h(x - s) f(\tau) ds d\tau = \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t - s - \tau)) u_0(x - s + \tau) ds d\tau + \\
& \varphi_1(t - x) + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t - s - \tau) u_1(x - s + \tau) ds d\tau + \\
& + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-(t-s-\tau)} \cdot h(x - s) f(\tau) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-(t-s-\tau)} \cdot u_1(x - s + \tau) ds d\tau \tag{3.2.13}
\end{aligned}$$

Дар ҳолати $b = 0$ будан баробарии (3. 2. 12) чунин намуд мегирад

$$u(x, t) = e^{-0 \cdot x} \varphi_1(t - x) +$$

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x-s+\tau) e^{-0 \cdot (s+\tau)} ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau) + 2b\delta(t-s-\tau)) u_0(x-s+\tau) e^{-0 \cdot (s+\tau)} ds d\tau + \\
& \frac{0^2}{2\sqrt{0+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(\frac{1}{2}-\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-0 \cdot t} \cdot u_0(x-s+\tau) ds d\tau - \\
& \frac{0^2}{2\sqrt{0+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(\frac{1}{2}+\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-0 \cdot t} u_0(x-s+\tau) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2 \cdot 0 + 1}{4\sqrt{0+\frac{1}{4}}} + \frac{1}{2} \right) e^{-\left(0+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+0}\right)(t-s-\tau)} u_1(x-s+\tau) e^{-0 \cdot (s+\tau)} ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{2 \cdot 0 + 1}{4\sqrt{0+\frac{1}{4}}} - \frac{1}{2} \right) e^{-\left(0+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}+0}\right)(t-s-\tau)} u_1(x-s+\tau) e^{-0 \cdot (s+\tau)} ds d\tau + \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\sqrt{0+\frac{1}{4}}} \right) e^{-\left(0+\frac{1}{2}-\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-0 \cdot s} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau + \\
& \frac{2\sqrt{0+\frac{1}{4}}+1}{4\sqrt{0+\frac{1}{4}}} \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-\left(0+\frac{1}{2}+\sqrt{0+\frac{1}{4}}\right)(t-s-\tau)} \cdot e^{-0 \cdot s} h(x-s) f(\tau) ds d\tau = \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} (\delta'(t-s-\tau)) u_0(x-s+\tau) \cdot ds d\tau +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \varphi_1(t-x) + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) u_1(x-s+\tau) \cdot ds d\tau + \\
& + \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-(t-s-\tau)} \cdot h(x-s) f(\tau) ds d\tau - \\
& \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} e^{-(t-s-\tau)} \cdot u_1(x-s+\tau) ds d\tau
\end{aligned} \tag{3.2.14}$$

Ҳамин тавр дар ҳолати баробар будани ядро ҳалҳои баробарро низ пайдо намудем.

3.3. Муодилаи интегро-дифференсиалии ба муодилаи мавҷ овардашаванда

Бори нахуст олими Япония Ё. Фучита муодилаи интегро-дифференсиалии зеринро

$$u(x, t) = f(x) + \int_0^t a(t-\tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau \tag{3.3.1}$$

барои ядрои $a(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1}$ таҳқиқ намудааст, ки барои ин ядро муодилаи мазкур муодилаҳои гармигузаронӣ ва мавҷро интерполятсия менамояд.

([70], [71], [117], [118])

Гузориши масъала: Шарти ибтидоӣ

$$u(x, 0) = f(x) \tag{3.3.2}$$

буда ва шартҳои канорӣ бошанд чунинад:

$$\begin{cases} u(0, t) = \varphi(t) \\ u'_x(0, t) = c(t) \end{cases} \tag{3.3.3}$$

Чи гунае, ки дар боло зикр намудем ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1) барои ядрои

$$a(t) = \frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}; \quad (1 \leq \alpha \leq 2)$$

аз тарафи олимон муайян карда шудааст. ([117])

Ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1)-ро мо барои ядрои

$$a(t) = te^{-bt}$$

бо истифода аз тадбиқи ҳисоби оператсионӣ (табдилоти Лаплас-Карсон) дида мебароем. Усули ҳисоби оператсионӣ барои ҳалли масъалаи мазкур қулай мебошад. (ниг [21], [68]) Чи гунае, ки мебинем дар ҳолати $b = 0$ будан ядро ба

$$a(t) = t$$

баробар мешавад, ки дар ин ҳолат муодилаи (3. 3. 1) ба муодилаи мавҷ табдил меёбад ва инчунин дар ҳолати $a(t) = 1$ будан мо функсияи Ламберт-ро ҳосил мекунем, ([80], [95], [104]) ки дар ин ҳангом

$$te^{-bt} = 1$$

буда, муодилаи (3. 3. 1) ба муодилаи гармигузаронӣ табдил мебад ([11], [83], [85]). Яъне ядрои мазкур муодиларо ҳам ба муодилаи гармигузаронӣ ва ҳам ба муодилаи мавҷ интерполятсия мекунанд. Ҳоло мо ҳалли умумии муодилаи (3.3.1) –ро барои ядрои $a(t) = te^{-bt}$ дар ҳолати $b \neq 0$ дида ҳақиқӣ ва $a(t) = te^{-bt} \neq 1$ будан бо истифода аз тадбиқи ҳисоби оператсионӣ дида мебароем. Пеш аз ҳалли масъала тасвири ҳосила, интеграл ва функцияҳоро меорем ([20], [3 – M], [4 – M])

$$u(x, t) \Rightarrow U(p, q), u(x, 0) = f(x) \rightarrow F(p), u(0, t) = \varphi(t) \rightarrow \Phi(q),$$

$$u'_x(0, t) = c(t) \rightarrow C(q);$$

$$\int_0^t a(t-\tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \{p^2 [U(p, q) - \Phi_1(q)] - p\Phi_2(q)\};$$

Акнун ҳар яке аз ин тасвирҳоро ба муодилаи (3. 3. 1) гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = F(p) + \frac{1}{q} A(q) \{p^2 [U(p, q) - \Phi(q)] - pC(q)\}$$

$$U(p, q) = F(p) + \frac{1}{q} A(q) p^2 [U(p, q) - \Phi(q)] - \frac{1}{q} A(q) pC(q)$$

$$U(p, q) = F(p) + \frac{1}{q} A(q) p^2 U(p, q) - \frac{1}{q} A(q) p^2 \Phi(q) - \frac{1}{q} A(q) pC(q)$$

$$\left(1 - \frac{1}{q} A(q) p^2\right) U(p, q) = F(p) - \frac{1}{q} A(q) p^2 \Phi(q) - \frac{1}{q} A(q) pC(q)$$

Яъне

$$U(p, q) = \frac{F(p) - \frac{1}{q} A(q) p^2 \Phi(q) - \frac{1}{q} A(q) pC(q)}{1 - \frac{1}{q} A(q) p^2} \quad (3.3.4)$$

мешавад.

Баробарии (3. 3. 4) ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1) дар фазои зудӣ мебошад, ки дар ин фазо функсияи тағирёбандааш комплекси амал мекунад. Ҳалли умумии муодиларо дар фазои вақт барои ядрои $a(t) = te^{-bt}$ дида мебароем. Чи тавре мо медонем тасвири ядро чунин аст: $a(t) \rightarrow A(q) = \frac{q}{(q+b)^2}$ (ниг [20], [21]). Тасвири ядроро ба баробарии (3. 3. 4) гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = \frac{F(p) - \frac{1}{q} \frac{q}{(q+b)^2} p^2 \Phi(q) - \frac{1}{q} \frac{q}{(q+b)^2} pC(q)}{1 - \frac{1}{q} \frac{q}{(q+b)^2} p^2} =$$

$$\frac{(q+b)^2 F(p) - p^2 \Phi(q) - pC(q)}{(q+b)^2 - p^2}$$

Яъне

$$U(p, q) = \frac{(q+b)^2 F(p) - p^2 \Phi(q) - pC(q)}{(q+b)^2 - p^2} \quad (3.3.5)$$

мебошад. Чи тавре аён аст дар ҳолати $p = \pm(q+b)$ будан махраҷ ба нол баробар мешавад ва аз баски $p = -(q+b)$ ба соҳаи наздикшавии интегралҳои Лаплас тааллуқ надорад ([63], [6 – М], [106]) бинобар ин мо онро решаи бегона мешуморем ва ҳангоми $p = q+b$ будан сурат қай ба нол баробар мешавад муайян хоҳем кард

$$(q+b)^2 F(q+b) - (q+b)^2 \Phi(q) - (q+b)C(q) = 0$$

$$(q+b)^2 F(q+b) - (q+b)^2 \Phi(q) = (q+b)C(q)$$

$$(q+b)F(q+b) - (q+b)\Phi(q) = C(q)$$

$$C(q) = (q+b)F(q+b) - (q+b)\Phi(q) \quad (3.3.6)$$

дар ин ҳо

$$\Phi(q) = F(q+b) - \frac{C(q)}{q+b}$$

мебошад. Бо истифода аз татбиқи **Қадвали 1.2.2.** функсияи $u(0; t) = \varphi(t)$ –ро муайян мекунем

$$u(0; t) = \varphi(t) = \int_0^t (\delta(t-s) + bh(t-s)) e^{-bs} f(s) ds - \int_0^t e^{-b(t-s)} c(s) ds$$

Барои идомаи ҳал баробарии (3.3.6)-ро ба баробарии (3.3.5) гузошта ҳосил мекунем

$$\begin{aligned}
U(p, q) &= \frac{(q+b)^2 F(p) - p^2 \Phi(q) - p((q+b)F(q+b) - (q+b)\Phi(q))}{(q+b)^2 - p^2} = \\
&= \frac{(q+b)((q+b)F(p) - pF(q+b)) + p\Phi(q)(q+b-p)}{(q+b)^2 - p^2} = \\
&= \left\{ (q+b) \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} + \left\{ \frac{p\Phi(q)}{p+q+b} \right\}
\end{aligned}$$

Яъне

$$U(p, q) = \left\{ (q+b) \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} + \left\{ \frac{p\Phi(q)}{p+q+b} \right\} \quad (3.3.7)$$

мебошад. Баробарии (3. 3. 7) низ ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1) дар фазои зудӣ мебошад. Аз баски баробарии (3. 3. 7) аз ду ҷамъшавандаи қавсҳо иборат аст бинобар ин ҳар яке аз ин қавсҳоро дар алоҳиддаги таҳқиқ намуда барояшон функсияи ҳақиқӣ ҷустуҷӯ мекунем:

$$\begin{aligned}
1) \left\{ (q+b) \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \right\} &\Leftarrow \\
&\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
&+ 2b \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
&+ b^2 \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} h(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau;
\end{aligned}$$

Сараввал ифодаи дар дохили қавс мавҷудбударо табдил медиҳем

$$(q+b) \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} = \frac{q^2 + 2bq + b^2}{q+b} \cdot \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2}$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} a(t-s-\tau) u_1(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau \Rightarrow$$

$$\frac{A(q)}{q+b} \cdot \frac{pU_1(q+b) - (q+b)U_1(p)}{p^2 - (q+b)^2}; \quad (3.3.8)$$

мебошад, бинобар ин ҳосил мекунем

$$\frac{q^2 + 2bq + b^2}{q+b} \cdot \frac{(q+b)F(p) - pF(q+b)}{(q+b)^2 - p^2} \Leftarrow$$

$$\int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$+ 2b \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +$$

$$+ b^2 \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} h(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau; \quad (3.3.9)$$

Дар ин ҷо $\delta(t)$ – функсияи Дирак буда ва $h(t)$ – функсияи Хевисайд мебошад. ([16], [63])

Функсияи ҳақиқии ба тасвири дар қавси дуюм мувофиқбуда низ барои мо маълум аст. ([38])

$$2) \left\{ \frac{p\Phi(q)}{p+q+b} \right\} \Leftarrow e^{-bx} \varphi(t-x); \quad (3.3.10)$$

Функсияи ҳақиқии ҳар ду қавси дар баробарии (3. 3. 7) мавҷудбуда муайян карда шуд. Акнун ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1)-ро менависем

$$\begin{aligned}
u(x, t) = & \int_0^{\min(x, t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& + 2b \int_0^{\min(x, t)} \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& + b^2 \int_0^{\min(x, t)} \int_0^{t-s} h(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau \\
& + e^{-bx} \varphi(t-x);
\end{aligned} \tag{3.3.11}$$

Қадами 1: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x > t$ будан менависем

$$\begin{aligned}
u(x, t) = & \int_0^t \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& + 2b \int_0^t \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& + b^2 \int_0^t \int_0^{t-s} h(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds
\end{aligned} \tag{3.3.12}$$

Қадами 2: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x < t$ будан менависем

$$\begin{aligned}
u(x, t) = & \int_0^x \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau + \\
& + 2b \int_0^x \int_0^{t-s} \delta(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + b^2 \int_0^x \int_0^{t-s} h(t-s-\tau) f(x-s+\tau) e^{-b(s+\tau)} ds d\tau \\
& + e^{-bx} \varphi(t-x);
\end{aligned} \tag{3. 3.13}$$

Ҳамин тавр ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1) барои ядрои $a(t) = te^{-bt}$ маълум гардид.

Бояд қайд намуд, ки дар ҳолати $b = 0$ будан аз баробарии (3.3.11) ҳалли умумии муодилаи (3. 3. 1) –ро барои ядрои $a(t) = t$ ҳосил хоҳем кард, ки он чунин аст:

$$\begin{aligned}
u(x, t) = & \int_0^{\min(x,t)} \int_0^{t-s} \delta'(t-s-\tau) f(x-s+\tau) ds d\tau \\
& + \varphi(t-x);
\end{aligned}$$

Мисол: Муодиларо ҳал кунед

$$u(x, t) = bx + \int_0^t a(t-\tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau$$

Дар ин ҷо шартҳои ибтидоӣ $u(x, 0) = f(x) = bx$, буда ва шартҳои канорӣ бошанд

$$u(0, t) = \varphi_1(t), \quad u'_x(0, t) = \varphi_2(t)$$

мебошанд, ки функцияҳои $a(t), \varphi_1(t), \varphi_2(t)$ – функцияҳои бефосилаи шартҳои табдилоти Лаплас-ро қаноаткунанда ба шумор мераванд. Инчунин ядро $a(t) = te^{-bt}$ мебошад.

Ҳал: Пеш аз ҳал намудани масъалаи мазкур тасвири ҳосила, интеграл ва функцияҳоро меорем ([20], [38], [3 – М])

$$u(x, t) \Rightarrow U(p, q), u(x, 0) = f(x) \rightarrow F(p),$$

$$u(0, t) = \varphi_1(t) \rightarrow \Phi_1(q), u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \rightarrow \Phi_2(q)$$

$$\int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial u(x, \tau)}{\partial x} \partial \tau \Rightarrow \frac{1}{q} A(q) \{p^2 [U(p, q) - \Phi_1(q)] - p \Phi_2(q)\}$$

Акнун ҳар яке аз ин тасвирҳоро ба муодила гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = F(p) + \frac{1}{q} A(q) \{p^2 [U(p, q) - \Phi_1(q)] - p \Phi_2(q)\}$$

$$\left(1 - \frac{1}{q} A(q) p^2\right) U(p, q) = F(p) - \frac{1}{q} A(q) p^2 \Phi_1(q) - \frac{1}{q} A(q) p \Phi_2(q)$$

$$U(p, q) = \frac{F(p) - \frac{1}{q} A(q) p^2 \Phi_1(q) - \frac{1}{q} A(q) p \Phi_2(q)}{1 - \frac{1}{q} A(q) p^2}$$

Баробарии ҳосилшуда ҳалли умумии муодила дар фазои зудӣ мебошад, ки дар ин фазо функсияи тағирёбандааш комплекси амал мекунад. Барои идомаи ҳал тасвири ядро ва функсияи ибтидоиро ба баробарии мазкур гузошта ҳосил мекунем ва чи тавре мо медонем тасвири ядро чунин аст: $a(t) \rightarrow A(q) = \frac{q}{(q+b)^2}$ ([20]). Инчунин аз баски $f(x) = bx$ — аст бинобар ин $f(x) \rightarrow F(p) = \frac{b}{p}$ ([20]) мешавад. Ҳамин тавр ҳосил мекунем

$$U(p, q) = \frac{\frac{b}{p} - \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{(q+b)^2} p^2 \Phi_1(q) - \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{(q+b)^2} p \Phi_2(q)}{1 - \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{(q+b)^2} p^2}$$

$$= \frac{\frac{b(q+b)^2}{p} - p^2 \Phi_1(q) - p \Phi_2(q)}{(q+b)^2 - p^2}$$

Яъне

$$U(p, q) = \frac{\frac{b(q+b)^2}{p} - p^2\Phi_1(q) - p\Phi_2(q)}{(q+b)^2 - p^2} \quad (3.3.14)$$

мебошад. Чи тавре аён аст дар ҳолати $p = \pm(q+b)$ будан махраҷ ба нол баробар мешавад ва ҳангоми $p = q+b$ будан сурат кай ба нол баробар мешавад муайян мекунем

$$\frac{b(q+b)^2}{q+b} - (q+b)^2\Phi_1(q) - (q+b)\Phi_2(q) = 0$$

$$\frac{b}{q+b} - \Phi_1(q) - \frac{\Phi_2(q)}{q+b} = 0$$

ё

$$\Phi_1(q) = \frac{b}{q+b} - \frac{\Phi_2(q)}{q+b} \quad (3.3.15)$$

Аз баробарии (3.3.15) мо метавонем шартӣ ибтидоии ҳалли муодиларо пайдо кунем

$$\Phi_1(q) = \frac{q+b-q}{q+b} - \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{q+b} \cdot \Phi_2(q)$$

$$\Phi_1(q) = 1 - \frac{q}{q+b} - \frac{1}{q} \cdot \frac{q}{q+b} \cdot \Phi_2(q)$$

$$\varphi_1(t) = 1 - e^{-bt} - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds$$

Яъне

$$u(0; t) = 1 - e^{-bt} - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds$$

мешавад.

Баробарии (3. 3. 15)-ро ба баробарии (3. 3. 14) гузошта ҳосил мекунем

$$U(p, q) = b \left\{ \frac{(q+b)^3 - p^3}{p(q+b)((q+b)^2 - p^2)} \right\} + \left\{ \frac{p\Phi_2(q)(p-q-b)}{(q+b)((q+b)^2 - p^2)} \right\}$$

Яъне

$$U(p, q) = \left\{ -\frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} \right\} + \left\{ \frac{b(q+b)^3 - bp^3}{p(q+b)((q+b)^2 - p^2)} \right\} \quad (3.3.16)$$

Акнун бо истифода аз табдилоти баъакси Лаплас-Карсон барои ҳар як функсияи дар қавсҳо мавҷудбуда функсияи ҳақиқи ҷустуҷӯ мекунем.

$$1) \left\{ \frac{-p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} \right\} \Leftarrow - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds \\ + \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds$$

Сараввал ифодаи дар зери қавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} = \frac{\Phi_2(q)}{q+b} - \frac{\Phi_2(q)}{p+q+b} = \frac{\Phi_2(q)}{q+b} - \frac{H(p)\Phi_2(q)}{p+q+b}$$

Чи тавре мо медонем (ба ҷадвали 1.2.2. нигаред)

$$\int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds \Rightarrow \frac{H(p)\Phi_2(q)}{p+q+b}$$

$$\int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds \rightarrow \frac{\Phi_2(q)}{q+b}$$

мебошад. Ҳамин тавр бо истифода аз формулаҳои мазкур функсияи ҳақиқии тасвири дар қавси якум мавҷудбударо менависем

$$\frac{p\Phi_2(q)}{(q+b)(p+q+b)} \Leftarrow \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds - \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds$$

$$2) \left\{ \frac{b(q+b)^3 - bp^3}{p(q+b)((q+b)^2 - p^2)} \right\} \Leftarrow$$

$$1 - e^{-bt} + bx - b \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h_1(x-s) h_2(t-s) ds$$

Сараввал ифодаи дар дохили қавс мавҷудбударо содда мекунем

$$\begin{aligned} \frac{b(q+b)^3 - bp^3}{p(q+b)((q+b)^2 - p^2)} &= \frac{b((q+b)-p)((q+b)^2 + p(q+b) + p^2)}{p(q+b)((q+b)-p)((q+b)+p)} = \\ &= \frac{b(q+b)^2 + 2bp(q+b) + bp^2 - bp(q+b)}{p(q+b)(p+q+b)} = \frac{b(p+q+b)^2 - bp(q+b)}{p(q+b)(p+q+b)} \\ &= \frac{bp + bq + b^2}{p(q+b)} - \frac{b}{p+q+b} = 1 - \frac{q}{q+b} + \frac{b}{p} - \frac{b}{p+q+b} \end{aligned}$$

Яъне

$$\frac{b(q+b)^3 - bp^3}{p(q+b)((q+b)^2 - p^2)} = 1 - \frac{q}{q+b} + \frac{b}{p} - \frac{bH_1(p)H_2(q)}{p+q+b}$$

Чи тавре аён аст баробарии мазкур аз қор ҷаъмшаванда иборат аст, ки функсияи ҳақиқии ҳар яке аз ин ҷаъмшавандаҳо барои мо маълум мебошад ([38] ва ҷадвали 1.2.2.).

$$\left(1 - \frac{q}{q+b} + \frac{b}{p} - \frac{bH_1(p)H_2(q)}{p+q+b} \right) \Leftarrow$$

$$1 - e^{-bt} + bx - \int_0^{\min(x,t)} be^{-bs} h_1(x-s) h_2(t-s) ds$$

дар ин ҷо $h_1(x), x > 0$; $h_2(t), t > 0$ — функсияи Хевисайд мебошад ([16], [63]). Ҳамин тавр функсияи ҳақиқии ҳар ду қавси дар баробарии (3.3.16) мавҷудбуда муайян карда шуд. Акнун ҳалли умумии муодиларо бо шартҳои ибтидоӣ ва канорӣ додашуда менависем

$$u(x, t) = - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds + \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds + 1 - e^{-bt} + bx - b \int_0^{\min(x,t)} e^{-bs} h_1(x-s) h_2(t-s) ds \quad (3.3.17)$$

Қадами 1: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x > t$ будан менависем

$$u(x, t) = - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds + \int_0^t e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds + 1 - e^{-bt} + bx - b \int_0^t e^{-bs} h_1(x-s) h_2(t-s) ds \quad (3.3.18)$$

Қадами 2: Ҳалли умумии муодиларо ҳангоми $x < t$ будан менависем

$$u(x, t) = - \int_0^t e^{-b(t-s)} \varphi_2(s) ds + \int_0^x e^{-bs} h(x-s) \varphi_2(t-s) ds + 1 - e^{-bt} + bx - b \int_0^x e^{-bs} h_1(x-s) h_2(t-s) ds \quad (3.3.19)$$

Ҳамин тавр ҳалли муодилаи мазкур маълум гардид. Аз баски дар ин муодила $u(x, 0) = f(x) = bx$ мебошад, бинобар ин ҳангоми дар баробарии (3.3.19) ба ҷои тағирёбандаи t нол гузоштан $u(x, 0) = bx$ —ро пайдо хоҳем кард.

Хулоса

1. Натиҷаҳои асосии илмӣ кори диссертатсионӣ

Дар рисолаи диссертатсионӣ натиҷаҳои асосии зерин ба даст оварда шудаанд:

1. Ба воситаи табдилоти Лаплас-Карсон тасвири функсияҳо ва интегралҳои, ки татбиқи васеи амали доранд муайян карда шудаанд [9-М], [10-М];
2. Ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии телеграф бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда муайян карда шудааст [2-М], [5-М];
3. Ҳалли умумии муодилаи интегро-дифференсиалии телеграф барои ядрои функсияи хаттӣ (графикаш хати рост) ва функсияи ғайрихаттӣ (графикаш хати қав) бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда муайян карда шудааст [3-М], [6-М];
4. Ҳалли умумии муодилаҳои дифференсиалии хаттӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як ва ду бо шартҳои ибтидоӣ ва канории додашуда ва ҳалли муодилаи интегро-дифференсиалии ба муодилаи мавҷ овардашаванда муайян карда шудааст [1-М], [2-М], [4-М];
5. Чадвали 2 то ҷое оғох ҳастам дар таърихи риёзиёт то ҳол вуҷуд надорад ва барои ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ, муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ ва ғайра васеъ истифодашаванда мебошад [7-М], [8-М], [10-М];

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Таҳқиқоти мазкур аҳамияти назариявӣ ва амали дошта, натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ ва методҳои исботи онҳоро дар ҳолати ҷустуҷӯ намудани ҳали масъалаҳои ибтидоӣ-канорӣ барои муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ ва муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ татбиқи худро ёфтаанд.

А) Руйхати манбаъҳои истифодашуда

- [1]. Андре Анго Математика для электро- и радиоинженеров, Москва-1965 г., 780 с.
- [2]. Абдулкаримов М. Ф. О разрешимости одной задачи граничного управления для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом из класса L_2 . Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию академика НАН Таджикистана Шабозова Мирганда Шабозовича, (Таджикистан. Душанбе, 24-25 июня 2022 г.), с 191-192.
- [3]. Бутузов В. Ф. Несобственные интегралы. //Бутузов В. Ф., Бутузов М. В. –Москва-2016, 44 с.
- [4]. Бицадзе А. В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного, М: Наука, 1969, 234 с.
- [5]. Брычков Ю. А., Таблицы неопределенных интегралов, // Брычков Ю. А., Маричев О. И., Прудников А. П. – М: ФИЗМАТЛИТ-2003.
- [6]. Брычков Ю. А., Прудников А. П. Интегральные преобразования обобщенных функций, Москва 1977, 288 с.
- [7]. Бутров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление.- М: Наука, 1998, 431 с.
- [8]. Сафронова М. А. Теория функций комплексной переменной. Минск БГУИР 2017, 120 с.
- [9]. Волковыский Л. И. Сборник задач по теории функции комплексного переменного: // Волковыский Л. И., Лунц Г. Л., Араманович И., – Учеб. пособие. 4-е изд., испр.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 312с
- [10]. Василего И. П. Вычисление интегралов с помощью вычетов Оренбург-2004, 49 с.
- [11]. Владимиров В. С. Уравнения математической физики –Москва 1976, 512 с.

- [12]. Ван-Дер-Поль Б., Бремер Х. Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласа, перев. с англ., ИЛ, 1952. 243с.
- [13]. Волковський Л. И. Сборник задач по теории функции комплексного переменного: // Волковський Л. И., Лунц Г. Л., Араманович И.,— Учеб. пособие. 4-е изд., испр.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 312 с.
- [14]. Горбузов В. Н. Математический анализ: интегралы, зависящие от параметров, Гродно-2006, 54 с.
- [15]. Десянский В. Н. Кратные интегралы. // Десянский В. Н., Жидких Н. М., Григорьев О.А.— Москва-2005, 78 с.
- [16]. Губатенко В. П. Обобщенные функции с приложениями в теории электромагнитного поля, Саратов «Стило»-2001, 124 с.
- [17]. Гредасова Н. В. Теория функций комплексного переменного. Ч 1, // Гредасова Н. В., Желонкина Н. И., Корешникова М. А., Корчемкина Л. В., Зенков В. И. —Екатеринбург-2018, 384 с.
- [18]. Гредасова Н. В. Теория функций комплексного переменного. Ч 2, // Гредасова Н. В., Желонкина Н. И., Корешникова М. А., Корчемкина Л. В., Зенков В. И. —Екатеринбург-2018, 254 с.
- [19]. Диткин В. А., Кузнецов П. И., Справочник по операционному исчислению, М.-Л., Гостехиздат, 1951, 520 с.
- [20]. Диткин В. А., Прудников А. П. Операционное исчисление по двум переменным и его приложения, Москва -1958, 176 с.
- [21]. Диткин В. А., Прудников А. П. Справочник по операционному исчислению, Москва 1965, 523 с.
- [22]. Диткин В. А., Прудников А. П. Интегральные преобразования и операционное исчисление, Москва 1961, 524 с.
- [23]. Дубков А. А., Агудов Н. В. Преобразования Лапласа, Нижний Новгород-2016, 88с.

- [24]. Дубинов А. Е. W-функция Ламберта и ее применение в математических задачах физики, // Дубинов А. Е., Дубинова И. Д., Сайков С. К. – Москва-2006, 126 с.
- [25]. Дубограй И. В. Техника интегрирования. // Дубограй И. В., Коломейкина Е. В., Шишкина С. И. Москва-2010, 64 с.
- [26]. Диткин В. А., К теории операционного исчисления, ДАН 123, (1958).
- [27]. Диткин В. А., К теории операционного исчисления, ДАН 116, (1957).
- [28]. Диткин В. А. Операционное исчисление, УМН 2, вып 6 (22), (1947).
- [29]. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и z-преобразование. М.: Рипол Классик. 1971, 288 с.
- [30]. Ефимов А. Математический анализ, Част 1, Высшая школа, 1980, 279 с.
- [31]. Зубрина Л. Г, Чостковская О. П. Дополнительные главы высшей математики, САМАРА-2010, с 28-29.
- [32]. Илолов. М. И, Зулфонов Ш. М. Решение интегро-дифференциального телеграфного уравнения методом преобразования Лапласа-Карсона // Известия НАН Таджикистана, №1 (190), 2023 г, с. 7-14.
- [33]. Илолов. М. И, Зулфонов. Ш. М. Начально- Краевая задача для уравнения в частных производных 2-го порядка. // Доклады НАНТ, Т. 66, № 3-4, 127-135 с.
- [34]. Ильин В. А. О граничном управлении на одном конце процессом, описываемым телеграфным уравнением (Текст)/ В.А. Ильин, Е.И. Моисеев // Доклады Академии наук. -2002 –Т. 387. -№5. –С. 600-603.
- [35]. Ильин В. А., Моисеев Е. И. Граничное управление на двух концах процессом, описываемым телеграфным уравнением // Докл. РАН, 2004 Т. 394, №2, с. 154-158.
- [36]. Ильин В. А. Граничное управление процессом колебаний на двух концах в терминах обобщенного решения волнового уравнения с конечной энергий. / В.А. Ильин // Дифференциальные уравнения.- 2000. Т-36. -№11.- с 1513-1528.

- [37]. Илолов М. И., Зулфонов Ш. М. Современные проблемы математики и её приложения. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения академика АНРТ доктора физ-мат наук, профессора Илолов Мамадшо, (Таджикистан. Душанбе, 14-15 марта 2018 г. с.108)
- [38]. Илолов.М.И, Зулфонов.Ш.М Начально- Краевая задача для уравнения в частных производных 2-го порядка. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию профессора Джангибеков Гулходжа, (Таджикистан. Душанбе, 30-31 января 2020 г.)
- [39]. Краснов М. Л. Операционное исчисление. Теория устойчивости, // Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. Н. — Москва-2003, 256с.
- [40]. Краснов М. Л.. Функции комплексного переменного. // Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. Н. — Москва-2003, 256с.
- [41]. Корзников А. Д., Королева О. М. Операционное исчисление, Минск-2021, 86 с.
- [42]. Ковалева Л. А., Чернова О. В., Интегралы, зависящие от параметра, Белгород-2018, 39 с.
- [43]. Ковалева Л. А. Интегралы, зависящие от параметра, Белгород-2018, 64 с.
- [44]. Корн Г. А., Корн Т. М. Справочник по математике. М. : Наука, 1978, 720 с.
- [45]. Конев В. В. Уравнения в частных производных, Томский политехнический университет-2007, 58 с.
- [46]. Криллов А. А., Гвишиани А. Д. Теоремы и задачи функционального анализа. М.: Наука, Физ. Мат. Лит-ры, 1979, 384 с.
- [47]. Колмогоров А. Н. Элементы теории функции и функционального анализа. М.: Наука, физ. Мат. Лит-ры., 1989, 624 с.

- [48]. Като Т. Теория возмущений линейных операторов. – М.: Мир, 1972, 48с.
- [49]. Крицков Л. В. Граничное управление смещением на одном конце при свободном втором для процесса, описываемого телеграфным уравнением с переменным коэффициентом. //Л.В.Крицков, М.Ф.Абдулкаримов// Доклады Академии Наук.- 2013.- Т 450.- с 640-643.
- [50]. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного Москва, “Наука” -1987, 736 с.
- [51]. Лашкарбеков Р. М., Зулфонов Ш. М. Ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалии тартиби як бо усули оператсионӣ, // Лашкарбеков Р. М., Зулфонов Ш. М.,— Маводи конференсияи байналмиллалӣ бахшида ба 70-солагии доктори илмҳои педагогӣ, профессор Нуъмонов. М Душанбе-2019.
- [52]. Лашкарбеков С. М., Зулфонов Ш. М. Ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалии тартиби ду бо усули оператсионӣ, // Лашкарбеков С., Зулфонов Ш. М.,— Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба “Бистсолаи омузиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2020-2040”, Душанбе-2020.
- [53]. Лашкарбеков С. М., Решение уравнения типа Эйлера высших порядков // Лашкарбеков С. М., Лашкарбеков Р. М., Зулфонов Ш. М.—Материалы международной научной конференции, “Комплексный анализ и его приложения”, посвященной “Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования”, Душанбе-2023.
- [54]. Маркушевич А. И. Теория аналитических функций. В 2т. Т 1: Начала теории. // Маркушевич А. И.. – СБб.: Лань, 2009. -496с.
- [55]. Маркушевич А. И. Теория аналитических функций. В 2т. Т 2: Дальнейшее построение теории. / А. И. Маркушевич. – СБб.: Лань, 2009. -624с.

- [56]. Маркушевич А. И. Теория аналитических функций, Гостехиздат, 1950, 220 с.
- [57]. Мартыненко В. С. Операционное исчисление. ИЗДАТЕЛЬСТВО КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1968, 248 с.
- [58]. Минькова Р. М. Дифференциальное исчисление функции одной переменной, Екатеринбург-2006, 56 с.
- [59]. Никольский С. М. Курс математического анализа.—М.: Наука, 1983, Т 1. 468 с.
- [60]. Никольский С. М. Курс математического анализа.—М.: Наука, 1983, Т 2. 448 с.
- [61]. Орлов С. С. Обобщенные решения интегро-дифференциальных уравнений высоких порядков в банаховых пространствах (монография) Иркутск-2014, 88 с.
- [62]. Подолян С. В., Юрченко И. В. Высшая математика, Операционное исчисление и его применение Могилёв 2009, с 46-52 .
- [63]. Плескунов М. А. Операционное исчисление. Екатеринбург- 2014, 146 с.
- [64]. Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного. —М.: Наука, 1984, 432 с.
- [65]. Погребной В. Д. Теория функций действительной переменной. Сумы-2012, 239с
- [66]. Прудников А. П. Вычисление интегралов и преобразование Меллина, // Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И.— *Итоги науки и техн. Сер. Мат. Анал.*, 1989, Том 27, с 3-146
- [67]. Прудников А. П. Интегралы и ряды, // Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И.— Москва -1983, Том 1, 632 с.
- [68]. Прудников А. П. Интегралы и ряды, // Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И.— Москва -1983, Том 2, 620 с.
- [69]. Прудников А. П. Интегралы и ряды, // Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И.— Москва -1983, Том 3, 624 с.

- [70]. Полянин А. Д., Зайцев В. Ф. Справочник по нелинейным уравнениям математической физики: Точные решения, (Физматлит, М., 2002), 578 с.
- [71]. Полянин А. Д. Лекции по нелинейным уравнениям математической физики: Учеб. Пособие. Москва-2023, 254 с.
- [72]. Полянин А. Д. Нелинейные уравнения математической физики: Учеб. Пособие, Ч 2., (ЮРАЙТ, М., 2017). 420 с.
- [73]. Полянин А. Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям (Физматлит, М., 2001), 576 с.
- [74]. Румшицкий Л. З. Преобразование Лапласа и позитивные функции, Учен, Зап. ХГУ 4, 21 (1949), с 101-130.
- [75]. Смирнова В. Б., Морозова Л. Е. Определённый интеграл. Санкт-Петербург, 2011, 99 с.
- [76]. Смирнова В. Б., Морозова Л. Е. Неопределённый интеграл. Санкт-Петербург, 2010, 64 с.
- [77]. Сидоров Ю. В., Федорюк М. В., Шабунин М. И. Лекции по теории функции комплексного переменного. Москва-1989, 478 с.
- [78]. Самойленко А. М., Илолов М. И. К теории эволюционных уравнений с импульсным воздействием. Докл АН СССР, 1991, том 316, номер 4, с 822-825.
- [79]. Семенов Э. И., Косов А. А. Функция Ламберта и точные решения нелинейных параболических уравнений, Известия вузов. Математика 2019, №8, с 13-20.
- [80]. Сергеев С. А., Спиридонов Ф. Ф. Применение функции ламберта W в решении задачи теплопроводности, г. Бийск, 1978, 176 с.
- [81]. Смирнов И. Н. Смешанные задачи для телеграфного уравнения в случае системы, состоящей из двух участков, имеющих разные плотности и разные упругости, но одинаковые импедансы. Одностороннее управление. //Доклады Академии Наук, 2010, том 435, № 1, С. 22-25.

- [82]. Смирнов И. Н. Формула типа Даламбера для колебаний бесконечного стержня, состоящего из двух участков разной плотности, описываемых телеграфным уравнением. //Доклады Академии Наук, 2010, том 433, № 1, С 23-29.
- [83]. Субхонкулов М. А. Остаточный член в тауберовой теореме Харди-Литтльвуда-Карлемана, Известия АН СССР, 1961, Том 25, Выпуск 6, 925-934 с.
- [84]. Троценко Г. А., Жукова О. Г. Операционное исчисление и его применение, Омск-2020, с 45-47.
- [85]. Трацтер К. Дж. Интегральные преобразования в математической физики, М., Гостехиздат., 1956, 224 с.
- [86]. Толстых О. Д. , Гозбенко В. Е. Операционное исчисление и его применение, Иркутск-2008, 180 с.
- [87]. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Част 1. М: «Физико-математической литературы», 1969, 608 с.
- [88]. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Част 2 М: «Физико-математической литературы», 1969, 802 с.
- [89]. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Част 3. М: «Физико-математической литературы», 1969, 658 с.
- [90]. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Част 1. М: «Физико-математической литературы», 1969, 441 с.
- [91]. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Част 2. М: «Физико-математической литературы», 1968, 464 с.
- [92]. Фукс Б. А., Левин В. И. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения, М.-Л., Гостехиздат, 1951, 388 с.
- [93]. Фукс Б.А., Шабат Б. В. Функции комплексного переменного и некоторые его приложения, М.-Л., Гостехиздат, Москва-1964, 390 с.

- [94]. Фок В. А. О разложении произвольной функции в интеграл по функциям Лежандра с комплексным значком, ДАН 39, (1943), с 279-283
- [95]. Фок В. А. О некоторых интегральных уравнениях математической физики, ДАН 36, (1942), 147-151 с.
- [96]. Хватцев А. А., Строчков И. А. Дифференциальные уравнения в частных производных, Псков-2016, 80 с.
- [97]. Харкевич А. А. Неустановившиеся волновые явления, М.-Л., Гостехиздат, 1950, 88 с.
- [98]. Хиршман И. И., Уиддер Д. В., Преобразования типа свертки, М., ИЛ., 1948, 240 с.
- [99]. Чангибеков Г. Асосҳои таҳлили функсионалӣ, Душанбе-2019, 152 с.
- [100]. Шостак Р. Я. Операционное исчисление. М: Высшая школа, 1972, 279 с.
- [101]. Эдвардс Р. Ряды Фурье в современном изложении. М.: Мир.- 1985, Т. 1-2, 664 с.
- [102]. Эфрос А. М., Данилевский А. М. Операционное исчисление и контурные интегралы, Харьков, 1937, 236 с.
- [103]. Яремко Н. Н. Интегральное исчисление функции одного переменного, Пенза-2012, 332 с.
- [104]. Янышев Д. С. Применение функции ламберта W в теории турбулентного трения, Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск №50, УДК 532.526:536.244
- [105]. Якоб О. Преобразование Лапласа к суммированию ряда Фурье и интерполяционных многочленов, ДАН 32, (1941), 390-394 с.
- [106]. Ali Babakhani Theory of multidimensional Laplace transforms and boundary value problems. Iowa State University, 1989, pp 223.
- [107]. Borovskikh A. V. Formulas of boundary control of an inhomogeneous string. I//Differ. Equ., 2007., Vol. 43, no. 1. Pp 69-95.

- [108]. Ditkin V. A., Prudnikov A. P., Operational Calculus in Two Variables and its Applications, Pergamon Press, New York, 1962, 176 c.
- [109]. Dahiya R. S.; Jafar Saberi -Nadjafi, THEOREMS ON n-DIMENSIONAL LAPLACE TRANSFORMS AND THEIR APPLICATIONS, 15th Annual conference of Applied Mathematics. Univ of central Oklahoma, Electronic journal of differential Equations; Conference 02, 1999, pp 61–74.
- [110]. Dahiya R. S. Certain Theorems on n-dimensional Operational Calculus, Compositio Mathematica, Amsterdam (Holland) 18 Fasc, 1,2, (1967).
- [111]. Dahiya R. S. Computation of n-dimensional Laplace Transforms, Journal of Computational and Applied Mathematics 3 (1977).
- [112]. Dahiya R. S. Calculation of Two-dimensional Laplace Transforms pairs-1, Simon Stevin, A Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics 56 (1981).
- [113]. Dahiya R. S. Calculation of Two-dimensional Laplace Transforms pairs-2, Simon Stevin, A Quarterly journal of pure and Applied Mathematics (Belgium) 57 (1983).
- [114]. Dahiya R. S. Laplace Transform pairs of n-dimensions, Internet. J. Math. and Math. SCI 8 (1985) .
- [115]. Dahiya R. S. and Debnath J. C., Theorems on Multidimensional Laplace Transform for Solution of Boundary Value Problems, Computers Math. Applications 18 (1989), no 12.
- [116]. Dahiya R. S. Integro-differential equation which interpolates the heat equation and the wave equation Math.27 (1990), 309-321.
- [117]. Fujita Y. Integro-differential equation which interpolates the heat equation and the wave equation Math.27(1990), 309-323.
- [118]. Fujita Y. Integro-differential equation which interpolates the heat equation and the wave equation (11).- Osaka J. Math v.27 №4, (1990), pp. 797-804.

- [119]. Kozlova E. A. The control problem for the system of telegraph equations, Samara 2011, 162-166.
- [120]. [120] Wright E. M. Solution of the equation $ze^z = a$, Proceedings of the Royal Society Edinburgh 65, 193-203 (1959).

Б) КОРҶОИ МУАЛЛИФ ОИД БА МАВЗЌИ ДИССЕРТАТСИЯ

1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда

- [1-М]. Зулфонов Ш. М. Применение преобразования Лапласа-Карсона к решению начально-краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений [Текст] /Зулфонов Ш. // Доклады НАН Таджикистана, Том. 64, № 3-4, 135-141 с.
- [2-М]. Зулфонов Ш. М. Решение начально-краевой задачи для телеграфного уравнения. [Текст] / Зулфонов Ш. // Доклады НАН Таджикистана, Том. 66, № 1-2, 28-32 с.
- [3-М]. Зулфонов Ш. М. Решение интегро-дифференциального телеграфного уравнения методом преобразования Лапласа-Карсона [Текст] / М. И. Илолов, Ш. Зулфонов //Известия НАН Таджикистана, №1 (190), 2023 г, с. 7-14
- [4-М]. Зулфонов. Ш. М. Начально- Краевая задача для уравнения в частных производных 2-го порядка. [Текст] / М. И. Илолов, Ш. М. Зулфонов // Доклады НАН Таджикистана, Т. 66, № 3-4, 127-135 с.

2) Мақолаҳо ва фишурдаҳои асосии интишорот дар дигар нашрияҳо:

- [5-М]. Зулфонов. Ш. М. Решение начально-краевой задачи для телеграфного уравнения. Материалы международной научной конференции, “Комплексный анализ и его приложения”, посвященной “Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования”, 75-летию Заслуженного работника Таджикистана, чл.корр. НАНТ, доктора

физико-математических наук, профессора И.К.Курбонова и 70-летию доктора физико-математических наук, профессора Дж.С.Сафарова, (г.Бохтар, 19 ноября 2022 г.), 63-65 с.

- [6-М]. Зулфонов Ш. М. Интегро-дифференциальное уравнение телеграфа. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию академика НАНТ Шабозова Мирганда Шабозовича, (Таджикистан. Душанбе, 24-25 июня 2022 г.), 234-237 с
- [7-М]. Зулфонов Ш. М. Применение преобразования Лапласа-Карсона к решению начально-краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения академика НАНТ, доктора физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича., (Таджикистан. Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.).
- [8-М]. Илолов М. И. , Зулфонов Ш. М. Об одной начально-краевой задаче для неоднородного интегро-дифференциального уравнения в частных производных. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова, (Таджикистан. Душанбе, 25-26 июня 2021 г.)
- [9-М]. Илолов.М. И, Зулфонов.Ш. М. Начально- Краевая задача для уравнения в частных производных 2-го порядка. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию профессора Джангибеков Гулходжа, (Таджикистан. Душанбе, 30-31 января 2020 г.).
- [10-М]. Зулфонов.Ш. М., Илолов.М. И Двумерное преобразования Лапласа-Карсона и его риложение. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию доктора физико-математических наук, профессора Тухлиева Камаридина, Худжанд-2024, с.249-251.