

ИНСТИТУТИ ИЛМИЮ ТАҲҚИҚОТИИ
ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуки дастнавис

ВБД:547+577.175.62
ТБК:24.2 (2Т)
М-13



ДАВРОНШОЗОДА ФАЙЗУЛЛО ДАВРОНШО

«ТАҲҚИҚИ АМИНОКИСЛОТАХО ВА
СТЕРОИДҲОИ ТАРКИБИ МАРМАРАКИ
МУСКАТИИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
РӮЯНДА»

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои химия аз рӯйи
иҳтисоси 1.4.4 – Химияи органикӣ

Душанбе-2026

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Химия ва технологияи растаниҳои доругӣ» назди Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Роҳбари илмӣ: **Самандарзода Насрулло Юсуф** – доктори илмҳои химия, дотсент мудири кафедраи ташхиси клиники озмоишгоҳи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муқарризони расмӣ

Бандаев Сироҷиддин Гадоевич – узви вобастаи АТТ, доктори илмҳои химия, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Олимзода Раҳмонали Амонуло – номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи умумии Донишгоҳи давлатии Данғара

Муассисай пешбар:

Муассисай илмию тадқиқотии «Маркази инноватсионии Хитою Тоҷикистон оид ба маҳсулоти табиӣ»-и Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Ҳимояи диссертатсия **«12» марта** соли 2026, соати **13:00** дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.КОА-010 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар бинои асоси, ошёнаи 2, ТШД баргузор мегардад. Сурога: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. E-mail: nazira64@inbox.ru

Бо муҳтавои диссертатсия ва фишурдаи он тавассути сомонаи www.tnu.tj ДМТ ва дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» соли 2026 фиристода шудааст.

Котиби илмии
шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои химия, дотсент

Бекназарова Н.С.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Қатын назар аз тараққиёти босуръати химия ва ихтирои ҳазорҳо моддаҳои синтетикӣ, доруҳои аз растаниҳо ҳосилшуда то ҳол аҳамияти баланди илмӣ ва амалӣ доранд. Ҷудо намудани алкалоидҳо, флавоноидҳо, витаминҳо ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ аз растаниҳо имкониятҳои вассеъ барои истифодаи доруҳои набототӣ фароҳам меорад. Ҳуди растаниҳо ва доруҳои аз онҳо омодашуда ба организми инсон нисбатан безарар буда таъсири хуб мерасонанд.

Садҳо намуд растаниҳо мавҷуданд, ки дорои моддаҳои фаъоли барои тиб заруранд ва метавонанд барои муолиҷаи бемориҳои гуногун истифода шаванд. Дар ин замина, набототи Тоҷикистон аҳамияти хоса дорад, зеро дар ҳудуди кишвар зиёда аз 5,5 ҳазор намуди растаниҳо мерӯяд. Шароити мусоиди иқлимии Тоҷикистон боиси гуногунрангӣ ва бой будани таркиби растаниҳои шифобаҳши ҳудрӯй мегардад. Аксари ин намудҳо то ҳол пурра таҳқиқ нашудаанд ва дар ин самт пешорӯи олимон корҳои зиёде мавҷуданд. Манбаъҳои табиии баъзе растаниҳои шифобаҳши ватаний имкон медиҳанд, ки онҳоро ҳамчун доруҳои галенӣ ва фармасевтӣ ба воситаи шабакаи доруҳонаҳо ба истифодаи аҳолӣ расондан мумкин бошад.

Мармарак, марвак, макмак, кампиргулак (*Salvia sclarea* L.), бо номи русӣ шалфей *мускатный*, растани бисёрсолаи алафӣ аз оилаи Лабгулҳо (*Lamiaceae*) мебошад. Пояш рост буда, баландии он аз 40 то 100 см мерасад. Баргҳо дилшакл ё байзашакли думчадор, гулҳо хушбӯй, рангашон қабуд ё гулобӣ мебошанд. Мева — қаҳварангӣ зардҷаи мудаввар. Давраи гулкунӣ моҳи июн–июл, давраи тухмбарорӣ — август–сентябр аст.

Ватани ин растаний соҳилҳои баҳри Миёназамин мебошад. Илова бар он, дар минтақаҳои кӯҳии Осиёи Марказӣ, Эрон, Русия, Қафқоз ва Қрим низ вомехӯрад. Дар Тоҷикистон асосан дар бوغу саҳро, дашту киштзор, буттазор, инчунин дар нишебиҳои кӯҳ ва теппаҳо мерӯяд. Дар тиб қисми болоии поя, барг ва гули мармарак истифода мешаванд. Онҳоро дар моҳҳои август–сентябр ҷамъоварӣ намуда, дар ҷойҳои сояфкан ва шамолрас хушк мекунанд. Гиёҳи хушкшударо метавон дар қуттиҳо ё ҳалтаҳои қофазӣ то ду сол нигоҳ дошт. Мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) дорои ҳосиятҳои зиддиоксидантӣ, зиддивирусӣ ва антигистаминӣ мебошад. Таркиби химиявии растаний равғанҳои эфирий, флавоноидҳо ва алкалоидҳоро дар бар мегирад. Вобаста ба минтақаи парвариш, таркиби моддаҳои фаъол метавонад ба таври назаррас фарқ қунад, ки ин ба ҳусусиятҳои он зиед таъсир мерасонад. Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки дар асоси пайвастаҳои ин растаний доруҳо таҳия шудаанд, ки дар муолиҷаи бемориҳои

дерматовенерологӣ, ҳамчун воситаҳои зиддиилтиҳобӣ, гепатопротекторӣ ва панкреопротекторӣ васеъ истифода мегарданд.

Дар тибби ҳалқии тоҷик дамхӯрдаи гули мармаракро ҳангоми дилзаний, бемориҳои гулӯ ва даҳон, шамолхӯрӣ, инчуни ҳамчун воситай рӯҳафзо ва беҳқунандаи ҳазми ғизо тавсия медиҳанд. Обҷӯшаи он барои муолиҷаи бемориҳои гурда истифода мешавад. Дамкардаи барг ва гули мармарак ҳамчун доруи хобовар ва оромбахш низ истеъмол мегардад. Аз барг ва гули мармарак олимон доруи «Салвин» таҳия кардаанд, ки дорои хосиятҳои микробкушӣ ва антибиотикий мебошад. Истеъмоли мармарак ба шахсони гирифтори фишори баланди хун тавсия намешавад, зоро он метавонад фишори хунро паст кунад.

Дараҷаи омӯзиши илмӣ, назариявӣ ва асосҳои методологии таҳқиқот. Кори мазкур яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи омӯзиши хосиятҳои табобатии гиёҳҳои шифобахши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар ин самт мактабҳои илмии бузург фаъолият намуда истодаанд. Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки имрӯз метавон таҳқиқотҳои як қатор олимонро мисол овард [1–4], аз ҷумла: Ҳайдаров К.Х., Қодиров А.Х., Раҳимов И.Ф., Ишонқулова Б.А., Мусозода С.М., Саидов Н.Б., Назарова З.Ҷ. ва дигарон, ки дар ин мавзуъ фаъолияти назаррас доранд [5–8].

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Омӯзиши реаксияҳои сифатӣ ва миқдорӣ барои муайян намудани аминокислотаҳо ва стероидҳо дар таркиби барг ва пояи мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.), ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мерӯяд, дорои аҳамияти баланди илмӣ ва амалист. Аз ин рӯ, таҳқиқи таркиби химиявии мармараки мускатӣ ва ҷудо намудани пайвастаҳои органикӣ аз он, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муҳим мебошад. Дар кори диссертационии мазкур масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд: коркарди методикаи омӯзиши миқдори аминокислотаҳо ва стероидҳо дар таркиби барг ва пояи мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) ва таҳқиқи хосиятҳои биологии онҳо дар моделҳои гуногуни фармакологӣ бо муқоиса ба маводи дигари растаний.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзууҳои илмӣ. Диссертация дар озмоишгоҳи «Химия ва технологияи растаниҳои доругӣ»- и Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мутобиқ ба лоиҳаҳои фармошии бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯии мавзуи «Омӯзиши фитохимиявии растаниҳои шифобахш ва ҳудрӯи Тоҷикистон бо мақсади дарёftи моддаҳои фаъоли биологӣ ва маводи доругӣ» (рақами ба қайдгирии давлатиаш №0121TJ01002) иҷро карда шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот: чудокунии моддаҳои органикӣ аминокислотаҳо, стероидҳо аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) ва омӯзиши хосиятҳои фаъоли биологи он бо истифода аз усулҳои физикко-химиявӣ.

Вазифаҳои таҳқиқот:

Барои ноил шудан ба мақсади гузашташуда дар кор масъалаҳои асосии зерин ҳал карда шудаанд:

- омӯзиши таркиби химиявии мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*);
- муайян намудани аминокислотаҳои карбонӣ ва ароматӣ дар таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*), чудонамудани онҳо;
- муайян намудани аминокислотаҳои сиклӣ, хетеросиклӣ дар таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*), чудонамудани онҳо;
- таъин намудани микдории стероидҳо дар таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*), чудонамудани онҳо;
- омуҳтани таркиб ва тозагии аминокислотаҳо ва стероидҳои аз мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*) чудошуда бо истифода аз усулҳои спектроскопияи инфрасурҳ, спектри массавӣ, РМП, ТЭ, ХГМ ва ХМК;
- баҳодиҳии муқоисавии хромотографии таркиби якчанд намуди мармараки мускатии минтақаи ш. Ваҳдат ва дигар манотики кишвар;
- омӯзиши хосиятҳои зиддибактериявӣ ва зиддиуфунатии маводҳои таркиби мармараки мускатии минтақаи дараи Ромити ш. Ваҳдат.

Объектҳои таҳқиқот: мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea*), аминокислотҳо: валин (Val), аланин (Ala), глитсин (Gly), изолейтсин (Ile), лейтсин (Leu) ва стероидҳо.

Мавзӯ (предмет)-и таҳқиқот: чудокунии моддаҳои органикӣ: аминокислотаҳо (алифатӣ, ароматӣ, сиклӣ, хетеросиклӣ), стероидҳо аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) ва омӯзиши хосиятҳои фаъоли биологии онҳо бо истифода аз усулҳои физику-химиявӣ.

Навғонии илмии таҳқиқот

1. Бори аввал таҳқиқоти таркиби гурӯҳҳои асосии моддаҳои химиявии мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) гузаронида шуд.

2. Аввалин маротиба аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) аминокислотаҳои: алифатӣ, ароматӣ, сиклӣ, хетеросиклӣ муайян ва чудо карда шудаанд.

3. Аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) стероидҳо: кислотаҳои урсолил, олеиний муайян ва чудо карда шудаанд.

4. Дараҷаи тозагии пайвастаҳои аз таркиби мармараки

мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) чудо кардашуда бо истифода аз усулҳои спектроскопии ИС, масс-спектроскопия, РМП, ТЭ ва ХМҚ муайян карда шуд.

5. Фаъолияти биологии моддаҳои химиявии дар таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) вуҷуд дошта тавассути усулҳои муосир муайян шуд.

6. Аз экстракти мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) аввалин бор малҳами зиддибактериявӣ омода шуд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Таҳқиқотҳо нишон додаанд, ки аз таркиби мармараки мускатӣ як қатор пайвастаҳои нави табиӣ чудо кардан мумкин аст. Ба онҳо аминокислотаҳои алифатӣ, ароматӣ, сиклӣ, ҳетеросиклӣ ва стероидҳо дохил мешаванд, ки дар оянда онҳо метавонанд ҳамчун маводҳои фаъоли реаксионӣ дар синтези органикӣ истифода шаванд.

Ҳосилаҳои аминокислотаҳо ва стероидҳо бо истифода аз усулҳои муосири таҳлил муайян карда шуда, дар моделҳои фармако-биохимиявӣ хосиятҳои биологӣ ва фаъолияти эҳтимолии онҳо омӯхта шудаанд.

Мукоисай маълумотҳои адабиётӣ бо натиҷаҳои бадастомадаи кори диссертационӣ нишон дод, ки таркиби мармараки мускатӣ вобаста ба ҷойиршавии географии растаниҳои шифобаҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунад. Омӯзиши моддаҳои органикӣ нишон дод, ки таркиби химиявии ин растаний аз минтақаҳои гуногун аз якдигар фарқ мекунад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

-бори аввал усулҳои чудо намудани аминокислотаҳои гуногун аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclareaL.*) экстракт кардашуда, шароит ва коркарди методикаи ҷудоқунни аминокислотаҳои гистидин, пролин, триптофан, тирозин, венилаланин, метионин, систем таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclareaL.*) ба роҳ монда шуд;

- бори аввал моддаҳои ҷудоқардашударо бо истифода аз усули хроматографияи баландэффект тоза карда, соҳти моддаҳои ҷудоқардашуда бо истифода аз усулҳои гуногуни муосири физику-химиявӣ муайян карда шуд. Саҳехии қонуниятиҳои назариявии муқараршуда оид ба экстрактҳои таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclareaL.*) ва хулосаҳои асосии кори диссертационӣ бо химияи органикӣ асос карда шуд.;

- натиҷаҳои ба дастомадаро ва муайян кардани миқдори камзаҳрӣ (low toxicity)-и аминокислотаҳои дар таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) ва стероидҳои гуногуни таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea L.*) бо ва таҳқиқотҳои фармако-биохимиявӣ асоснок карда шуд.

Дараачаи эътимоднокии натицаҳо: маълумотҳои бадастомада бо усулҳои замонавии физику-химиявии таҳқиқот, коркарди статикии натицаҳо таъмин ва асоснок карда шуд. Тозагии моддаҳо бо усули хроматографияи маҳинқабат ва дар асбоби хроматографии «Хром-5» истехсоли Чехия санчида шудаанд. Микдори карбон, гидроген, оксиген ва нитроген дар асбоби «vario» MICRO CUBE муайян карда шуданд. Хлор бо усули гудоҳта муайян карда шуд. Спектрҳои ИС-и пайвастаҳои синтезкардашуда дар соҳаҳои 400-4000 см⁻¹ дар асбоби «Specord IR-75» ва спектрометрии «SHIMADZU», ба намуди суспензия дар вазелин ва ҳаб (таблетка) бо KBr омӯхта шуданд. Таркиб ва соҳти пайвастаҳои синтезкардашуда бо гирифтани спектрҳои Mass., (дар асбоби www.Chromatec.ru 5000. 2) ва РМП (дар асбоби «Bruker- 500 МГц, маҳлул дар ампул 50 мм, ампулҳои Norell-508-UP ва Norell-S-5-500») тасдиқ карда шуданд. Таҳлили биохимиявиро дар дастгоҳи Stat-Fax 1904, Biohem, анализатори гематологии micros-20+, хроматографии навъи «Хром-5», ки бо детектори шӯълагӣ-ионизатсионӣ мӯсаҳҳаз аст, гузаронидем. Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот 25 номгӯйи пайвастаҳоро ҳосил намудем.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқ). Рисола ба шиносномаи ихтисоси 1.4.4.-Химияи органикӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи бандҳои зерин тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад:

Мувофиқи банди 1. Омӯзиши соҳт ва ҳосиятҳои пайвастаҳои органикӣ бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физикии таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявӣ. – боби 2.3.;

Мувофиқи банди 2. Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои байни соҳт, ҳосият, қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ ва пайвастаҳои таббий. – бобҳои 1.2. ва 2.3;

Мувофиқи банди 3. Кашфи моддаҳои нави органикӣ, реаксияҳои нави пайвастаҳои органикӣ, усулҳои таҳқиқ, экстраксия ва чудокунии моддаҳои органикӣ аз объектҳои таббий. – боби 2.3.;

Мувофиқи банди 6. Фитохимия ва чудокунии моддаҳои органикӣ аз объектҳои таббий. – бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Саҳми шахсии довталаби дараачаи илмӣ дар таҳқиқот: ин таҳқиқот, дарёфт, таҳлил ва ҷамъбасти маълумоти илмӣ оид ба корҳои таҷрибавии химиявӣ, биохимиявӣ ва биологӣ, чудокунии хромотографии омехтаи реаксионӣ, чудокунӣ ва тоза кардани маҳсулоти нави аз растаниҳо ҳосилнамуда мебошад. Довталаб соҳти моддаҳои бадастовардаро тавассути усулҳои таҳлилии физику-химиявӣ худаш мустакилона танҳо ё бо ёрии ҳамкорон муайян кардааст. Барои ҳосили пайвастаҳои дорои

хосиятхой беҳтарии биологӣ дошта диссертант хосилаҳои кислотаи холанро мустақилона синтез намудааст. Муаллиф дар коркарди нақшаш таҳқиқот, омода намудани мақолаю фишурдаҳо ба чоп ва маърӯзай онҳо бевосита сахмгузор мебошад.

Тасвӣ ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар конфронҳои чумхурияйӣ ва байналмилалии зерин муҳокима шудаанд: конференсия чумхуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷашиҳои 30-солагии Истиқлоли давлатии ҶТ, 110-солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, қархрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии нависандай ҳалқии Тоҷикистон С. Улуғзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» Душанбе-30.11.2022. Конференсияи чумхурияйӣ «Флораи Тоҷикистон-сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». Душанбе-2022. Дар конференсияи чумхурияйӣ «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». Душанбе-2022. Конференсияи чумхурияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами тиб ва фарматсияи муосир: Назар ба оянда». (13-ноябри соли 2018) ДМТ.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Феҳристи асосии маводи диссертатсионӣ дар ҳаҷми 17 мақолаи илмӣ ва фишурдаҳое, ки 5-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Вазорати маориф ва илми Федерасияи Россия тавсия гашта нашр шудаанд, 7 фишурдаи маърузаҳои конфронси байналмиллаӣ ва чумхурияйӣ, 1 патенти авроосиӣ, 4 нахустпатенти ҶТ.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз 148 саҳифаи чопи компьютерӣ иборат буда, аз муқаддима ва 4 боб, шарҳи адабиёт, қисми таҷрибайӣ, шарҳи натиҷаҳои таҷрибайӣ, хулосаҳои асосии кор, шумораи манбаъҳои истифодашуда, ки 150 номгӯйро дар бар мегирад, иборат аст. Диссертатсия дорои 34 расм ва 3 ҷадвал мебошад.

МУҲИМТАРИН НАТИҔАҲОИ ТАҲҚИҚОТ ВА МУҲОКИМАИ ОНҲО

*Усулҳои таҳқиқи физикӣ-химиявии мармараки мускатӣ ва
чудонамудани аминокислотаҳои Алифати ва омухтани таркиби онҳо
таввасути XГМ, СИ ва РМП*

Дар марҳалайи кунуни рушди илми химия аз ҷумла ҳимияни органикӣ дар тамоми олам усулҳои синтези пайвастаҳои нави доруфории нави зудтаъсир ҷустуҷӯ идома дорад. Дар ин замини ҷудокуни пайвастаҳои органикӣ аз ҷумла аминокислотаҳо ки як синфи пайвастаҳои органикӣ башумор рафта, имконияти баланди фоидабоҳши

ва фаъоли биологиро зоҳир мекунанд ва масъалаи актуалии мутахасисони соҳаи химия, дорусоз, фармаколог ва фармако-биохимия ба ҳисоб меравад.

Қобил ба қайд аст, ки химияи, аминокислотаҳо, яке аз соҳаҳои дурнамо, тараққикарда ва сердаромади илми муосири ба ҳисоб меравад. Аминокислотаҳо хусусияти ба худ хос доранд, аз чихати биологӣ фаъол буда, аҳамияти илми-амалии қалон доранд.

Дар тиб қисми болоии сока, барг ва гули мармарак истифода мешавад, ки онҳоро дар моҳҳои август – сентябр ҷамъоварӣ карда, дар ҷойҳои сояи шамолрас хушк мекунанд. Гиёҳи хушкшударо дар қуттиҳо ё ҳалтаҳои қоғазӣ то ду сол нигоҳ доштан мумкин аст.

Мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) дорои фаъолиятҳои гуногуни биологӣ (антиоксидант, зиддиилтиҳоӣ, зиддимикробӣ, бедардкунанда, шифобаҳши заҳмҳо), ки аз ҳисоби ҷузъҳои гуногуни ба таркиби ашёи хом доҳилшуда - мармарак эфирӣ, флавоноидҳо, танинҳо ва алкалоидҳо вобаста аст. Аз сабаби ҳеле гуногун будани таркиби химиявии растани вобаста ба шароити парвариш ва маҳалли ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, тадқикот ба омӯзиши таркиби моеъи мармараки мускатӣ шаффоғ дар Тоҷикистон ва таҳияи минбаъдан маводи доруворӣ барои истифода дар амалияи дерматологӣ нигаронида шудааст, бо таъсири зидди илтиҳоӣ, зиддимикробӣ ва шифобаҳши заҳмҳо мухим аст. Этиологияи раванди заҳм гуногун аст, равандҳои муолиҷа ва барқарорсозии бофтаҳо мураккабанд, ки таъсири мураккаби доруҳоро ба раванди барқарорсозӣ талаб мекунанд.

Ҳамин тариқ, таҳияи технологияи эҷоди маводи доруворӣ бо истифода аз захираҳои табиии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи чудонашавандай рушди иқтидори иқтисодии қишвар мебошад.


Муайян карда шудааст, ки дар таркиби баргҳои мармарак то 2,5% равғани атрӣ (эфирӣ), алкалоидҳо, флавоноидҳо, моддаҳои даббогӣ, витаминҳои Р, PP, кислотаҳои органикӣ ва гайра мавҷуданд.

Дар тибби ҳалқи тоҷик дамхӯрдаи гули мармаракро ҳангоми дилзаний, бемориҳои гулӯю даҳон, шамолхӯрӣ ва ҳамчун рӯҳафзову, ҳазми гизо истифода мебаранд. Обҷӯшаашро барои муолиҷаи қасалиҳои гурда мефармоянд. Дамкардаи баргу гули мармаракро чун доруи хобовар ва оромбахш истеъмол мекунанд. Аз баргу гули мармарак олимон доруи «Салвин» тайёр кардаанд, ки хосияти микробкушӣ ва антибиотикӣ дорад. Истеъмоли мармарак ба шахсони гирифттори фишори баланди хун тавсия намешавад, зеро он фишори хунро зиёд мекунад. Равғани атрии (эфирӣ) мармарак дар саноати дорусозӣ барои хушбӯй кардани доруҳо истифода бурда мешавад.


Объекти таҳқиқот баргҳои хушки *Salvia* мускатӣ мебошад, ки дар давраи гулкунӣ дар дараи Ромит ҷамъоварӣ карда шудаанд. Таҳлил аз рӯи намунаҳои миёнаи ашёи хом, ки мувофики дастурҳои монографияи Фармакопеяи умумӣ интихоб карда шудааст, «Намунаи ашёи хоми растани шифобаҳаш ва доруҳои гиёҳии шифобаҳаш» гузаронида шуд. Муайян кардани таркиби аминокислотаҳои баргҳои *Salvia* мускатӣ бо усул муайян карда шуд хроматографияи моеъни баландсифат. Таҳлили хроматографияи газии моеъгӣ миқдори аминокислотаҳоро дар шароитҳои маҳсуси кори муайян кардааст. Омӯзиши таркиби аминокислотаҳои озод тавассути XGM бо истифода аз 15x20 см плитаҳои хроматографиии Мерк ҳамчун фазаи статсионарӣ ва омехтаи ҳалкунандаҳо ҳамчун фазаи сайёр: нбутанол - кислотаи сиркои - об дар таносуби 40:40:20 гузаронида шуд. Омехтаи ҳалкунанда дар камераи хроматографияи шишагӣ ҷойгир карда шуд, ки он барои 2 соат сер шуд, ҳамчун маҳлули озмоишӣ истихроҷи обӣ аз ашёи хушк истифода шуд. Ашёи хом ба андозаи зарраҷае, ки аз ҷӯшони диаметри сӯрохиаш 2 мм мувофики ГОСТ 214-83 мегузашт, майдо карда шуд. Тақрибан 6,00 г ашёи хоми майдашударо дар колба бо зарф 260 мл гузошта, ба 80 мл оби соф илова карда, ба конденсатори рефлюкс пайваст карда, дар ҳаммомҷаи оби ҷӯшандо аз лаҳзаи ҷӯшидани омехта 1,5 соат гарм карда мешавад. Пас аз хунук шудан, омехта ба воситаи филтри коғазӣ ба колбаҳои ҳаҷмӣ 200 мл филтр карда шуд ва бо оби тозашуда (маҳлули санчишӣ) ба нишона оварда шуд. Ҳамчун маҳлулҳои истинод, мо 0,05% маҳлулҳои намунаҳои стандартии кории аминокислотаҳо: серин, пролин, фенилаланин, глисин, кислотаи глутаминиро истифода бурдем. Дар рафти таҷриба мо дарозии мавҷи максималӣ азхудкунии комплекси ранга бо кислотаи нинидрин-глутамин ва экстракт обии гиёҳи пенниро аник кардем. Маҷмӯа ва ҳалли таҳқиқот мувофики тартиби дар поён овардашуда ба даст оварда шуданд. Дар ин қисмати кори мазкур мо аминокислотаҳоро ба қисматҳо чудо намуда таввасути усуљҳои мусоир таркиби онҳоро, ки аз гиёҳи мармараки мускатӣ чудо карда шуда буд, дар алоҳидаги пешниҳод менамоем. Дар озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ) таҳқиқотҳои таҷрибавӣ оид ба хушк кардани меваҳои мармараки мускатӣ гузаронида шуданд. Ҳадафи асосии ин таҳқиқот омӯхтани усуљҳои самараноки ҳушккунии мева ва ҳифзи таркиби кимиёвӣ ва биологии онҳо буд. Дар давоми таҳқиқотҳо пажӯшишгоҳҳои химияи органикӣ ба номи Н.Д. Зеленский барои таҳлили таркиби аминокислотаҳо ҷалб гардидаанд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки меваҳои мармараки мускатин дорои аминокислотаҳои сершумор буда, хусусиятҳои биологӣ ва ғизоии онҳо ҳангоми ҳушккунӣ ҳифз мешаванд. Ҳамзамон, натиҷаҳои таҳқиқот имконият

доданд, ки таъсири усулҳои гуногуни хушккунӣ ба таркиби аминокислотаҳо ва дигар пайвастаҳои фаъол дар меваҳо арзёбӣ карда шаванд. Ин тадқиқот барои таҳияи технологияҳои самараноки коркарди меваҳои мармарак ва истифодаи онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти биологӣ фаъол аҳамияти қалон дорад. Илова бар ин, маълумоти ба дастомада метавонанд барои таҳқиқоти минбаъда дар соҳаҳои биохимия, фармакология ва истеҳсоли маҳсулоти табии ҳамчун асоси илмӣ хизмат қунанд. Барои муайян намудани дараҷаи тозагӣ ва миқдори аминокислотаҳо дар таркиби мармараки мускатӣ, усули хроматографияи газии моеъ (ХГМ) истифода шуд. Ин усул яке аз дақиқтарин ва боъзтимодтарин роҳҳои таҳлили моддаҳои органикӣ мебошад, зеро имкон медиҳад ҷузъҳои омехта бо асоси вақтҳои нигоҳдорӣ, шиддати сигналҳо ва ҳусусиятҳои хроматографӣ дақиқ муайян карда шаванд. Дар ҷаравӣ таҷриба, пайдо шудани пикоҳо дар хроматограмма дар дақиқаҳои 12–14 мушоҳида шуд, ки ин нишондихандай ҳузури аминокислотаҳои асосӣ дар намуна мебошад. Ҳангоми муқоиса бо маводи стандартӣ, детектори шулавӣ сигналҳоро дар дақиқаҳои 8–9 ба қайд гирифт, ки далели шаффоф ва боъзтимод будани усул мебошад.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки усули ХГМ қобилияти чудо кардани пайвастаҳои сабук ва миёнавазнро дорад ва ҳассосияти баланд барои муайян намудани миқдори нисбӣ ва таркиби аминокислотаҳоро таъмин мекунад. Ҳамин тариқ, ин усул на танҳо дараҷаи тозагии аминокислотаҳоро нишон медиҳад, балки барои таҳлили физико-химиявӣ ва миқдорӣ низ имкониятҳои вассеъ фароҳам меорад.



Расми 1.- СИ- (S)-2-амино-3-кислотаи метилбутанови (Валин) ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст




Расми 2. -спектри -РМП-(S)-2-амино-3-кислотаи метилбутанови (Валин) ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст

Дар рафти кори ичрошуда, моддаҳои кимиёйӣ, аз чумла аминокислотаҳо, ки дар таркиби барги растанини *Salvia sclarea* L. (мармараки мускатӣ) мавҷуданд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Барои омӯзиши таркиби химиявии ин растаний аз усулҳои мусосири таҳлилий, ба мисли резонанси магнитии протон (РМП) ва спектроскопияи инфрасурх (СИ) истифода бурда шуд. Натиҷаҳои бадастомада аз таҳлили РМП нишон доданд, ки дар таркиби баргҳои мармараки мускатӣ аминокислотаҳо ва дигар пайвастаҳои органикӣ ҳузур доранд, ки дорои гурӯҳҳои фаъол, аз қабили $-OH$ (гидроксил) ва $-NH_2$ (амин) мебошанд. Ин гурӯҳҳо дар фаъолияти биологӣ ва ҳусусиятҳои дорусозии растаний нақши муҳим мебозанд. Спектри инфрасурх бошад, бо пайдоиши хати абсорбсияи хос дар соҳаҳои $3200\text{--}3400\text{ cm}^{-1}$ барои гурӯҳҳои гидроксил ва амин, инчунин хати хос дар соҳаҳои $1650\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ барои гурӯҳҳои карбонилӣ ($C=O$) далели мавҷудияти ин гурӯҳҳои функсионалӣ гардид. Ин маълумот нишон медиҳад, ки баргҳои *Salvia sclarea* L. дорои пайвастаҳои полифунксионалӣ мебошанд, ки метавонанд таъсири антиоксидантӣ, зиддибактериявӣ ва зиддиилтиҳобӣ дошта бошанд. Дар маҷмӯъ, таҳлилҳо собит намуданд, ки мармараки мускатӣ дорои таркиби кимиёвии мураккаб буда, аз пайвастаҳои фаъоли биологӣ бой мебошад. Ин натиҷаҳо барои таҳқиқоти минбаъда дар


соҳаи фармакология ва саноати дорусозӣ заминаи муҳим фароҳам меоранд.

*Таҳқиқи физики-химиевии мармараки мускатӣ,
чудонамудани аминокислотаҳои ароматӣ ва омухтани таркиби
онҳо тавассути XГМ, СИ ва РМП*

Аминокислотаҳо ҳамчун ҷузъҳои асосии сафедаҳо дар баробари кислотаҳои нуклеинӣ, карбогидратҳо ва липидҳо дар ҳама равандҳои ҳаёт иштирок мекунанд. Вақте ки аминокислотаҳо ба организми зинда ворид мешаванд, онҳо фавран ба равандҳои биохимиявӣ доҳил мешаванд. Равандҳои биохимиявӣ, ба монанди реаксияҳои химиявӣ, бо тағирёбии энергияи умумии система ҳамроҳ мешаванд, яъне, энергияи организми зинда. Аксарияти α -аминокислотаҳо доираи васеи фаъолиятҳои биологӣ доранд. Ҳамин тарик, лизин, треонин, фенилаланин, тирозин, аспарагин, глутамин, глицин, серин, аргинин барои синтези антитело, гормонҳо, ферментҳо ва дигар моддаҳо маводи ибтидой мебошанд. Аланин дар мубодилаи шакар ва кислотаҳои органикӣ иштирок мекунад. Метионин, триптофан, лизин, аргинин барои паст кардани холестирини хун, хориҷ кардани металлҳои вазнин аз бадан (метионин, систеин) ва афзоиш ва таъмири бофтаҳо (гистидин, изолейсин, лейсин, глисин, серин, пролин) кӯмак мекунанд. α -Аминокислотаҳо ҳамчун манбаи энергия дар сатҳи хучайра хизмат мекунанд (валин, лейсин, изолейсин, глутамин).




Одатан аминокислотаҳои ароматиро ба воситаи усулҳои муосир таҳлил ки, мо аз таркиби мармараки мускатӣ чудо намудем. Барои омухтани дараҷаи тозагии он аз XГМ истифода бурда шудааст.



Расми 3.- Хроматограммаи Треонин*, Thr ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст

Барои муайян намудани дараҷаи тозагӣ ва микдори аминокислотаҳои ароматӣ дар таркиби мармараки мускатӣ, усули хроматографияи газии моёе (ХГМ) истифода бурда шуд. Ин усул яке аз дақиқтарин ва боэътиимодтарин роҳҳои таҳлили моддаҳои органикӣ ба хисоб меравад, ки имкон медиҳад ҷузъҳои алоҳидай омехта аз рӯи вакъҳои нигоҳдорӣ, кувваи шиддати сигнал ва ҳусусиятҳои хроматографӣ муайян карда шаванд.




Расми 4.- РМП - Треонин*, Thr ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст

Дар спектри резонанси магнитии протонй (РМП) як катор сигналҳои хос мушоҳида мешаванд, ки ҳар қадоми онҳо ба муҳити кимиёвии муайяни протонҳо дар соҳтори молекула ишора мекунанд. Дар минтақаи 0,76–1,20 ҳ.м. як синглети равшан ва қавӣ сабт шудааст, ки ба протонҳои гурӯҳи метилӣ ($-\text{CH}_3$) мутобиқ аст. Ин сигнал бо шиддати нисбатан баланд зоҳир мегардад, ки аз шумораи зиёди протонҳои ин гурӯҳ шаҳодат медиҳад. Ҳузури чунин сигнал нишон медиҳад, ки гурӯҳи метилӣ дар муҳите ҷойгир аст, ки ба таври мустаким бо протонҳои дигар ҳамсоя надорад, аз ин рӯ тақсимшавии сигнал (спин-спин чудошавӣ) мушоҳида намешавад ва он ҳамчун синглет ифода меёбад. Ғайр аз ин, мавқеи кимиёвии сигнал дар ҳудуди арзишҳои паст (0,76–1,20 ҳ.м.) нишон медиҳад, ки ин протонҳо дар муҳити гидрофобӣ қарор доранд, яъне атрофи онҳо асосан аз атомҳои карбон ва гидроген иборат аст, бе таъсири гурӯҳҳои элекtronокабулкунанда ё полярӣ. Чунин ҷойгиршавӣ хоси гурӯҳҳои метилии сероб ва ё қисматҳои алифати мебошад.

Таҳқиқи физикӣ-химиявии мармараки мускатӣ, ҷудонамудани аминокислотаҳои аромати ва омуҳтани таркиби онҳо тавассути ҲГМ, СИ ва РМП

Таҳлили сарчаашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки таҳқиқот аз рӯйи ҷудонамудани аминокислотаҳо аз таркиби растаниҳои табии яке аз маводҳои табии ва камарзиш ба ҳисоб рафта барои синтези ҳосилаҳои нави, ки дар молекулаҳояшон боқимондаи аминокислотаҳоро доранд, зиёд нестанд омӯхта нашудаанд.

Ҷудокуни ва модификатсияи ҳосилаҳои нави аминокислотаҳо роҳҳои нави ба дастрас овардани пайвастай нав органики аз таркиби мармараки мускатӣ яке аз мақсадҳои асосии кори мазкур ба ҳисоб меравад. Ин, пеш аз ҳама, ба он алокаманд аст, ки ҳам ҳосилаҳои аминокислотаҳо пайваствҳои қобилияти реаксионияшон баланд доҳил мешаванд.




Одатан аминокислотаҳои ароматиро ба воситаи усулҳои муосир таҳлил ки дар қисмати таҷрибави кор ба таври муфассал

оварда шудааст, мо аз таркиби мармараки мускатӣ чудо намудем. Барои омухтани дараҷаи тозагии он аз XM исттифода бурда шудааст.


Рафти тозагии моддаҳои ҳосилшуда аз таркиби мармараки мускатӣ бо усули хроматографияи маҳинқабат санҷида шуд. Хроматографияи маҳинқабатро дар лавҳаҷаҳои «Силуфол», элюентҳо: А) хлороформ-метанол (50:10); Б) н-бутанол-об-кислотаи атсетат (10:4:2); В) бензол-атсетон-кислотаи атсетат (6:2:1) гузаронидем. Ошкоркунанда дар реакиси мазкур буғи йод истифода шудааст. Пайвастҳои ҳосилкардашуда, яъне аминокислотаҳо дар ҳолати агрегати моддаҳои сафеди кристаллмонанд мебошанд ва дар метанол хуб кристаллизатсия мешаванд. Ҳалшавандаги ин пайвастҳо дар об, хлороформ, ДМФА, ДМСО ва дар дигар ҳалкунандаҳои хуб ҳал мешаванд.

Таркиб ва соҳти пайвастаҳои чудошуда бо истифодаи усулҳои спектроскопӣ, аз ҷумла спектроскопияи инфрасурҳи (СИ), масс-спектрометрия (СМ) ва резонанси магнити протони (РМП/РМЯ) бо таври муфассал тасдиқ карда шуданд. Ин усулҳо барои муайян кардани соҳтори молекула, ҷойгиршавии гурӯҳҳои функционалий ва муайян кардани ҳосиятҳои химиявӣ ва физикии пайвастаҳо истифода мешаванд. Дар спектрҳои инфрасурҳи (СИ) пайвастаҳо рапҳои фурӯзоншавии гурӯҳҳои функционалий мушоҳида шуданд, ки нишондиҳандай соҳтори молекула мебошанд:

- Рахҳои $720\text{--}745\text{ см}^{-1}$ ба лаппишҳои валентии $\text{C}-\text{Cl}$ мувофиқат мекунанд, ки мавҷудияти атомҳои хлор дар молекуларо тасдиқ мекунанд;
- Рахҳои $1045\text{--}1175\text{ см}^{-1}$ ба лаппишҳои валентии $\text{C}-\text{H}$ тааллук доранд, ки нишондиҳандай гурӯҳҳои метилен ва метил мебошанд;
- Рахи 1790 см^{-1} ба лаппишҳои валентии $\text{C}=\text{O}$ мувофиқ аст, ки мавҷудияти гурӯҳҳои карбонсилро нишон медиҳад;
- Рахҳои $2840\text{--}2870\text{ см}^{-1}$ ба лаппишҳои валентии $-\text{CH}_2-$ тааллук доранд ва ҳузури скелети карбонро тасдиқ мекунанд;
- Рахҳои валентии $\text{O}-\text{H}$ дар доираи $3255\text{--}3375\text{ см}^{-1}$ мушоҳида шудаанд, ки нишонаҳои мавҷудияти гурӯҳҳои гидроксилӣ мебошанд.



Расми 5.- СИ- Треонин*, Thr ки аз таркиби мармараки мускатай гирифта шудааст




Расми 6.- РМП - Треонин*, Thr ки аз таркиби мармараки мускатай гирифта шудааст

Илова бар ин, таҳлилҳои масс-спектрометрӣ (СМ) имкон доданд, ки массаи молекула ва таркиби изотопӣ дақиқ муайян карда шавад, ки барои тасдики формулаи химиявӣ ва хучайраҳои молекулаи пайвастаҳо мухим аст. Таҳлилҳои РМП (^1H ва ^{13}C) маълумот дар бораи ҷойгиршавии атомҳои гидроген ва карбон дар соҳтори молекула, ҳамчунин синтетикии пайвастаҳо ва имконияти функционализатсия кардани молекулаҳоро таъмин намуд.

Дар спектри резонанси магнитии протонӣ (РМП)-и як қатор сигналҳо мушоҳида мешаванд, ки ба ҳусусиятҳои соҳтории ин пайвастагӣ далолат мекунанд. Дар ҳудудҳои 0,76 ҳ.м. як синглети возех сабт шудааст, ки ба протонҳои гурӯҳи метилии мувофиқ аст. Ғайр аз ин, дар спектр ҷор singleti васеъ мушоҳида мегардад, ки ба протонҳои ду гурӯҳи метилии экзосиклӣ тааллуқ доранд. Ин сигналҳои васеъ ба таъсири ҳаракати озоди гурӯҳҳои метиленӣ ва муҳити электронӣ, ки дар наздикии пайвандҳои дугона ё гурӯҳҳои электронофилӣ ҷой доранд, вобастаанд. Синглетҳои васеъ дар соҳаҳои 6.03 ҳ.м. ва 5.52 ҳ.м., инчунин 4.71 ҳ.м. ва 4.46 ҳ.м. ба протонҳои гурӯҳҳои экзосиклии метиленӣ нисбат дода мешаванд. Ҳамин тавр, таҳлили пурраи сигналҳо имконият медиҳад, ки соҳтори пешниҳодшудаи иғрандулин тасдиқ гардад ва нишон медиҳад, ки таркиби молекула бо маълумоти пешакӣ ва ҳисобҳои соҳторӣ мувофиқат мекунад.


Омӯзиши соҳти химиявӣ ва муайян намудани соҳти стероидҳои таркиби мармараки мускатӣ

Стероидҳо асосан пайвастаҳои калонмолекулави органикӣ мебошанд, ки дар тибби мусир бо номи гормонҳо низ маъруфанд ва дар танзими равандҳои физиологӣ ва биохимиявӣ нақши калидӣ мебозанд. Ин пайвастаҳо барои фаъолияти системаи эндокринӣ, танзими равандҳои метаболизм, устувории хучайраҳо ва мувозинати электролитҳо аҳамияти калон доранд. Муайянкунии стероидҳо ва ҷудо кардани онҳо аз таркиби растаниҳо, баҳусус шалфеи мускат, яке аз вазифаҳои асосии таҳқиқоти фармакологӣ ва фитохимиявӣ мебошад, зеро стероидҳо ҳамчун моддаҳои фаъол дар ҷараёни физиологӣ ва биохимиявӣ нақши муҳим мебозанд.




Расми 7.- спектри РМП - кислотаи урсолил ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст

Барои муайян намудани дараҷаи тозагӣ ва миқдори нисбии кислотаҳои урсолӣ ва олеинӣ дар таркиби мармараки мускатӣ усули хроматографияи газии моёе истифода бурда шуд. Ин усул яке аз роҳҳои дақиқтарини таҳлили моддаҳои органикӣ буда, имкон медиҳад, ки ҷузъҳои алоҳидан омехта аз рӯи вактҳои нигоҳдорӣ ва ҳусусиятҳои хроматографӣ муайян карда шаванд. Барои таҳлили таркиби молекулавӣ ва муайян намудани гурӯҳҳои функционалии кислотаи урсолӣ усулҳои спектроскопияи инфрасурҳ (СИ) ва спектроскопияи магнитии ядроӣ (РМП) истифода шуданд. Дар спектри инфрасурҳи кислотаи урсолӣ ҳатҳои фурӯбариш дар соҳаҳои $1770\text{--}1120\text{ cm}^{-1}$ аз ҳузури гурӯҳҳои карбоксилӣ дарак медиҳанд. Ҳузури ҳатҳо дар доираи $780\text{--}840\text{ cm}^{-1}$ ишора ба гурӯҳҳои метилӣ ва пайдоиши ҳатҳо дар $1400\text{--}1440\text{ cm}^{-1}$ ба мавҷудияти гурӯҳҳои OH дар молекула шаҳодат медиҳад. Таҳлили РМП нишон дод, ки атомҳои гидроген дар соҳаҳои гуногуни молекула таксим шудаанд. Масалан, гурӯҳҳои OH дар доираи $7,3\text{--}7,8\text{ x. m.}$ ва гурӯҳҳои метилении экзосиклӣ дар $3,5\text{--}4,0\text{ x. m.}$ мушоҳида мешаванд. Натиҷаҳои спектроскопӣ исбот карданд, ки пайвастаи чудошуда кислотаи урсолӣ мебошад ва соҳти молекулавии он пурра тасдиқ карда шуд.




Барои муайян намудани дараҷаи тозагии пайвастаҳои дар таркиби мармараки мускатӣ мавҷудбода, усули хроматографияи газии моеъ (ХГМ) истифода бурда шуд.

Барои таҳлили ва муайян намудани гурӯҳҳои функционалии кислотаҳо усулҳои спектроскопияи инфрасурҳ (СИ) ва спектроскопияи магнитии ядрой (РМП) ба кор бурда шуданд. Дар спектри инфрасурҳи кислотаҳои чудошуда ҳатҳои фурӯбариш дар соҳаҳои $1330\text{--}1140\text{ cm}^{-1}$ ба ҳузури гурӯҳҳои карбоксилӣ ишора мекунанд, ки ин яке аз ҳусусиятҳои асосии кислотаи урсолӣ ва олеинӣ мебошад. Ҳузури ҳатҳо дар соҳаҳои $780\text{--}840\text{ cm}^{-1}$ ишора ба гурӯҳҳои метилӣ ва пайдоиши ҳатҳо дар $1400\text{--}1440\text{ cm}^{-1}$ шаҳодат медиҳанд, ки молекула дорои гурӯҳҳои функционалии ОН мебошад. Дар спектр сигналҳои марбут ба гурӯҳҳои гидроксилӣ ($-\text{OH}$) дар соҳаи $\delta = 7,4\text{--}7,9\text{ x.m.}$ мушоҳида гардианд. Ҳузури ин сигналҳо барои тасдиқи мавҷудияти гурӯҳҳои гидроксилӣ дар соҳтори пайвастагӣ аҳамияти қалон дорад, зоро онҳо нишондоди мустакими мавҷудияти протонҳои фаъол мебошанд, ки бо оксиген пайваст шудаанд. Илова бар ин, гурӯҳҳои метилении экзосиклӣ ($-\text{CH}_2-$), ки дар канори соҳтори ҳалқавӣ ҷойгиранд, дар минтақаи $\delta = 3,5\text{--}4,0\text{ x.m.}$ мушоҳида шуданд. Ин диапазони химиявӣ барои протонҳои ҳос аст, ки дар наздикии атомҳои гетеро (масалан, оксиген ё карбон бо гибридизатсияи sp^2) ҷойгиранд ва аз таъсири муҳити электронофилий кимиёвӣ каме ба самти арзишҳои баландтарӣ δ ғечидаанд. Ҳамин тарик, натиҷаҳои спектроскопияи РМП мавҷудияти гурӯҳҳои гидроксилӣ ва метилении экзосиклиро дар соҳтори пайвастагӣ тасдиқ мекунанд.



Расми 8.- СИ - кислотаи олеиний ки аз таркиби мармараки мускатӣ ғирифта шудааст

Экдистероидҳо маъмултарин ва калонтарин оилаи пайвастаҳои стероидҳоро дар олами ҳайвонот ва наботот ташкил медиҳанд; дар ҳаёти кариб ҳамаи синфҳои организмҳо иштирок карда, вазифаҳои гуногунро ичро мекунанд. Ба ғайр аз вазифаҳои гормоналие, ки дар ҳашарот ичро мешаванд, нақши физиологии онҳо дар дигар синфҳои сутунмӯҳрана, растаний ва ширхӯрон норавшан боқӣ мемонад. Тахмин меравад, ки дар одамон он метавонад аз таъсири умумии танзимкунанда ба бадан, ба монанди витаминҳо ва моддаҳои витамини монанд иборат бошад.



Расми 9. -спектри - РМП - кислотаи олеиний ки аз таркиби мармараки мускатӣ гирифта шудааст

Тақсимоти васеи экдистероидҳо дар биосфера табиатан ба саволи механизмҳое оварда мерасонад, ки онҳо фаъолияти биологиро нишон медиҳанд: ҳам дар буғумподҳо ҳангоми синтези эндогенӣ ва ҳам дар ширхӯрон ҳангоми аз берун бо ғизо таъмин шудан.

Омӯзиши заҳрнокӣ ва зиддиилтиҳоби намунаҳо таҳлилшавандай экстракти мускатӣ

Наздик намудани илм ба истехсолот яке аз ҳадафҳои асосии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҷанд барномаи дарозмуддат ва кутоҳмуддат оид ба омӯзиши хосиятҳои шифобаҳши гиёҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуда ва онҳо имрӯз қисман дар равандҳои илми татбиқ шуда истодааст. Дар ҷанд баромадашон Пешвои Муаззами Миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хосиятҳои шифобаҳши гиёҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон такиид карда гузаштаанд, ки сарзамини биҳиштосои мо яке аз маконҳои зеботарин

ва аз циҳати экологӣ тозатарин дар сайёраи замин ба ҳисоб меравад, ва он гулу гиёххе, ки дар Тоҷикистон меруяд хосияти баланд биологӣ дорад нисбат ба дигар гулу гиёҳҳи шифобаҳши манотики дунё. Дар ин робита ба ин мавзӯй мо омӯзиши хосиятҳои фито-химиявии ва табобатии мускатиро, ки дар ҷумҳурии мо меруяд омуҳтем. Натиҷаи таҳқиқот нишон додо, ки мармараки мускатӣ яке аз гиёҳҳои шифобаҳши флораи Тоҷикистон ба ҳисоб рафта мо бори аввал дар таркиби он миқдори аминокислотаҳо ва стероидҳоро муайян кардем. Омӯзиши хосиятҳои биологи фаъоли пайвастаҳои синтез намуд яке аз ҳадафҳои наздиқ намудани ил ба истеҳсолот мебошад. Омуҳтани хосиятҳои зиддиилтиҳоби, зиддибактеријавӣ ва муайян кардани миқдори марговари кори мазкур ба ҳисоб меравад. Тибқи талаботҳои мо сараввал омӯзиши миқдори марговари пайвастаҳои ҷудонамударо аз таркиби мармараки мускатӣ гузаронидем натиҷаи таҳқиқотҳо нишон дод, ки пайвастаҳои мазкур хосияти паст заҳрноки доранд. Таҷриба аз рӯи усули Кербер гузаронид шудааст, ки тибқи нишондодҳои ҷадвали Сноскӣ ба ғурӯҳи 3-4 он доҳил мешаавд. Дар натиҷаи таҷрибаҳо мазкур мо аз мушони, ки вазнашон аз 17-22гр. мебошад истифода намудем моддаи таҳлилшаванди мо, ки аз экстракти мускатӣ гирифта шуда буд, ҳангоми омӯзиш ягон ҳолати патологи ҳангоми 72-соати таҷриба ба ҷашм нарасид. Маълум шуд, ки ҳамаи намунаҳои таҳлилшаванди экстракти мармараки мускатӣ моддаҳои заҳролуд надоштаанд. Барои санчиши токсикӣ, таҷрибаҳо бо усули Кербер барои муайян намудани LD₅₀ (ҳадди ақали вояи марговар) гузаронида шуданд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки муайян кардани LD₅₀ номумкин буд, зеро дар тамоми давраи мушоҳида ҳеч яке аз қаламушҳои ғурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ фавтида ё нишонаҳои марговар нишон надоданд. Ҳамчунин, дар ҳайвоноте, ки экстрактӣ баргҳои мармараки мускатӣ ба онҳо дода шуд, ҳеч аломатҳои клиникии заҳролудшавӣ мушоҳида нашуд. Ин нишон медиҳад, ки экстракти мармараки мускатӣ дар миқдори истифодашуда баландтарин дараҷаи бехатарӣ дорад ва таъсири токсикӣ ба қаламушҳо ба вучуд намеорад.

Ҷадвали 1.- Натиҷаҳои омӯзиши заҳролудшавии шадиди намунаҳо таҳлилшаванди экстракти мускатӣ

№	Гурӯҳ ҳайвоннот	Шумораи	Миқдор, мг/кг	Зинда монд	Фавт
1	Таҷрибавӣ	12	1400	12	-
2	Таҷрибавӣ	12	1650	12	-
3	Таҷрибавӣ	12	1100	12	-
4	Таҷрибавӣ	12	1400	12	-
5	Мукоисавӣ	12	-	12	-

Чадвали 2.- Натицаҳои омӯзиши захролудшавии шадиди намунаҳо таҳлилшавандай экстракти мармараки мускатӣ

№	Гурухи ҳайвонот	Микдори ҳайвонот	Воя, мг/кг	Зинда монд	Фавт
1	Тачрибай	12	1500	12	-
2	Тачрибай	12	1750	12	-
3	Тачрибай	12	1000	12	-
4	Тачрибай	12	1500	12	-
5	Муқойсави	12	-	12	-

Натицаи таҷриба нишон дод, ки экстракти мармараки мускатӣ ва аминокислотаҳои таркиби он хосияти пасти заҳрноки доранд ва метавон дар асоси он пайвастаҳои нави табобати барои тибби имрӯзai тоҷик омода намуд.

Аз нигоҳи демографӣ шумораи беморони гирифтори заҳмҳои музмин ва муолиҷаи вайроншуда ба андозаи эпидемӣ расида, ҳам аз ҷиҳати саломатии инсон ва ҳам аз нигоҳи иқтисодӣ боз ҳам вазнинтар мегардад. Мусоидат ба муолиҷаи ҷароҳатҳои ва қасдан ва кам кардани таъсири эстетикий ба бемор, ҳадафи асосии тибби имрӯза ба ҳисоб меравад. Дар натиҷа, Ҷаҳонҷони чиддии тиббӣ ва иҷтимоӣ барои такмил додани равишҳои табобатӣ ба миён меояд, ки қобилияти барқарорсозии бофтаҳои эндогениро баланд бардоранд. Дар ин бобат растанини таҳияи ҳаргуна маводҳои твабобати барои муолиҷаи беморон яке аз ҳадафҳои илми имрӯза ба ҳисоб меравад. Пас аз омӯзиши хосиятҳои марговари таркиби мармараки мускатӣ ки дар Тоҷикистон меруяд ва он дорои равғани эфир, алкалоидҳо, флавоноидҳо, аминокислотаҳо ва дигар моддаҳои аз ҷиҳати биологи фаъол доранд, ки таъсири зиддимикроб, гемостатик, зидди илтиҳоб ва шифобахши заҳмро дорад таҳқиқотҳои то клиникиро мо оғоз намудем.

Фаъолияти биологии мармараки мускатӣ ба он вобаста аст, ки дар қисмҳои растани кислотаҳои органикӣ, флавоноидҳо, аминокислотаҳо, алкалоидҳо ва фитонсидҳо мавҷуданд. Мармараки мускатӣ, ки дар Тоҷикистон меруяд фаъолияти афзояндай зиддимикробӣ нисбат ба фарҳангни микроорганизмҳои *aureus* *B. subtilis*, *E. coli*, *C. albicans* дорад. Дар тадқиқотҳои муқойсавӣ барои арзёбии фаъолиятҳои антимикробӣ баргҳои мармараки мускатӣ бо усули диффузияи агар бо *Sage* ҳамчун доруи муқойсавӣ истифода шуданд. Ҳангоми таҳлил муайян карда шуд, ки соҳаҳои монеъшавии афзоиши микроорганизмҳо барои баргҳои мармараки мускатӣ нисбат ба *Althaea* ба таври назаррас зиёд

мебошанд: *S. aureus*: $21,2 \pm 0,7$ мм, *B. subtilis*: $20,2 \pm 0,6$ мм, *E. coli*: $21,6 \pm 0,5$ мм.

Баръакси ин, маҳлули Sage бо ҳамон штаммҳо натиҷаҳои камтар нишон дод: *S. aureus*: $20,6 \pm 0,5$ мм, *B. subtilis*: $13,6 \pm 0,5$ мм. Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки баргҳои мармараки мускатӣ дорои фаъолиятҳои антимикробии баланди фарогир буда, барои таъсир расонидан ба бактерияҳои грамм-положӣ ва грамм-манғӣ нисбатан самараноктар аз маҳлули Sage мебошанд. Таҳлилҳои оморӣ ва муқоисавӣ исбот меқунанд, ки баргҳои мармараки мускатӣ метавонанд ҳамчун манбаи потенсиалии моддаҳои антимикробӣ дар таҳқиқоти минбаъда ва таҳияи маҳсулоти биофармакологӣ истифода шаванд.

Дар айни замон, «Sage» ҳалшаванд заидди фарҳангӣ ЕсмАС фаъолияти зиддимикробӣ надорад ва бар заидди *C. ablicens* фаъолияти зидди замбуурӯғ надорад.

Гирифтани натиҷаҳои фаъолияти зиддимикробии экстракти мармараки мускатӣ, ки дар Тоҷикистон меруяд, аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар натиҷаи таҳқиқот моддаи перспективии истеҳсоли доруҳои зиддимикробӣ дар асоси ин маводи растанийӣ омода кардан мункин аст.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмиин диссертатсия:

1. Коркарди роҳҳои нави бадастории ҳосилаҳои пайвастаҳои органикӣ аз таркиби мармараки мускатӣ *Salvia sclarea* амалӣ гардид. Муайян карда шуд, ки рафти реаксияҳои бадастории пайвастаҳои фаъоли биологӣ ба ҳалкунандаҳои органикӣ ва гайриорганикӣ васеъ татбиқ карда мешавад [1-М, 2-М, 3-М].

2. Бори аввал аз таркиби мармараки мускатӣ *Salvia sclarea* миқдори аминокислотаҳои ароматикӣ бо истифодаи усулҳои физико-химиявӣ омӯҳта шудааст. Дар доираи таҳқиқот муайян карда шуд, ки ин аминокислотаҳо бо таркиби гуногун ва ҳусусиятҳои фармакологӣ гуногун мавҷуданд, ки метавонанд ҳамчун моддаҳои фаъол дар таркиби пайвастаҳои биологӣ ва фармакологӣ хизмат кунанд [4-М, 5-М, 6-М, 7-М].

3. Барои муайян намудани миқдор ва намуди аминокислотаҳо усулҳои таҳлилӣ, аз ҷумла хроматографияи моеъ ва газӣ, спектроскопияи ултрабунафш ва масса-анализ истифода гардиданд. Омӯзиши физико-химиявӣ имкон дод, ки таъсири ҳалкунандаҳо, ҳарорат ва дигар омилҳои муҳити реаксионӣ ба

чудокуни аминокислотаҳо ва устувории онҳо муайян карда шавад. Ин натиҷаҳо барои таҳия ва синтези пайвастаҳои нави биологӣ ва омӯзиши хосиятҳои фармакологӣ заминаи муҳим фароҳам меоранд [8-М, 9-М, 10-М, 11-М].

4. Омӯзиши таркиб, тозагӣ ва хосиятҳои аминокислотаҳо ва стероидҳои таркиби мармараки мускатӣ *Salvia sclarea* бо истифодаи як қатор усулҳои спектроскопӣ ва таҳлилҳои физико-химиявӣ ба анҷом расонида шуд. Ҳангоми таҳлил усулҳои (спектроскопӣ инфрасурҳ, СИ) барои муайян кардани гурӯҳҳои функционалий ва пайвастагиҳои кимиёвӣ истифода шуданд, ки имкон доданд ҷузъҳои асосии органикӣ, аз ҷумла аминокислотаҳо ва стероидҳоро бо дақиқии баланд муайян намоем. Ҳамзамон, масса-анализ (Масс.) барои муайян кардани массаи молекулавӣ ва соҳтори ҷузъҳои органикӣ татбиқ шуд, ки ин имкон дод пайвастаҳои нави органикӣ ва ихтиносҳои таркибии онҳоро ошкор кунем. Спектроскопияи РМП (резонанс магнитии ядрои) дар таҳлили соҳтори атомӣ ва пайвастаҳои доҳили молекула истифода гардид, ки барои тасдики соҳтори молекулаҳои аминокислотаҳо ва стероидҳо аҳамияти қалон дошт [12-М, 13-М].

5. Дар рафти скрининги аввала муайян карда шуд, ки аминокислотаҳои ароматӣ ва кортикостероидҳои таркиби пайвастаҳои мазкур дорои хосиятҳои баланди зиддимикробӣ мебошанд. Ин пайвастаҳо дар муқоиса бо штаммҳои саҳроӣ таъсири назаррас нишон доданд ва фаъолияти зиддимикробии устувор ва самаранок доштаанд. Омӯзиши минбаъда нишон дод, ки таъсири онҳо на танҳо ба микробҳои грам-мусбат, балки ба баъзе навъҳои грам-манғӣ низ васеъ мерасад. Ҳамин тавр, ин натиҷаҳо асоси илмии аввалинаро барои истифодаи аминокислотаҳои ароматикӣ ва кортикостероидҳо ҳамчун моддаҳои фаъол дар таҳияи агентҳои зиддимикробӣ фароҳам меоранд. Ғайр аз ин, муайян гардид, ки соҳтор ва гурӯҳҳои функционалии ин пайвастагиҳо нақши муҳим дар қавӣ будани таъсири зиддимикробии онҳо мебозанд, ки имкон медиҳад дар таҳияи доруҳои нав ва таҳлили фармакологӣ самаранок истифода шаванд [14-М, 15-М, 16М, 17М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳдиқот

1. Моддаҳои ба дастомада, ки ҳосилаҳои нави алифатӣ, ароматикий ва гетеросиклӣ аз аминокислотаҳои таркиби мармараки мускатӣ мебошанд, метавонанд ҳамчун реагентҳои химиёвӣ дар синтези маҳини органикӣ ва омода кардани лигандҳои органикӣ истифода шаванд. Ин пайвастаҳо дорои гурӯҳҳои функционалии фаъоланд, ки имкон медиҳанд ба реаксияҳои гуногуни кимиёвӣ ворид шаванд ва сохторҳои мураккаби органикӣ бо ҳусусиятҳои маҳсуси физико-химиявӣ ва биологӣ ба даст оварда шаванд. Истифодаи чунин моддаҳо дар синтези органикӣ на танҳо самаранокӣ ва дақиқии реаксияҳоро афзоиш медиҳад, балки имконият фароҳам меорад, ки пайвастаҳои нави биологӣ фаъол ва дорои ҳусусиятҳои фармакологӣ таҳия шаванд.

2. Моддаҳои чудонамуда аз таркиби мармараки мускатӣ ҳосияти баланди терапевтӣ нишон доданд ва пас аз санчиш дар моделҳои гуногуни фармакологӣ натиҷаҳои мусбӣ ба даст оварда шуданд. Дар муқоиса бо маводҳои маъмул, ин пайвастаҳо таъсири устувор ва самараноктар доштанд, ки нишон медиҳад имконияти васеъ барои истифодаи онҳо дар таҳияи доруҳои нави биологӣ ва фармакологӣ мавҷуд аст. Омӯзиши минбаъда ва санчишҳои муфассал дар сатҳи клиникий тавсия дода мешавад, то ҳусусиятҳои терапевтӣ ва бехатарии ин моддаҳо бо дақиқӣ муайян шаванд ва имкониятҳои татбиқи онҳо дар амалиёти тиббӣ ва истеҳсолоти фармакологӣ васеъ гардад. Файр аз ин, ин натиҷаҳо барои таҳияи стратегияҳои нави синтез ва оптимизатсияи пайвастаҳои фаъоли биологӣ ҳамчун воситаҳои потенсиалий дар мубориза бо бемориҳои гуногун асоси илмӣ фароҳам меоранд.

ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:

**Рӯйхати мақолаҳо, ки дар маҷаллаҳои илмӣ ба тавсияи
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон нашр шудаанд:**

[1-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Омӯзиши таркиби аминокислотаҳои таркиби мармараки мускатий/ **Ф.Д. Давроншозода., Н.Ю. Самандарзода** // Илм ва фановари 2024 с- 217-218.

[2-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Разработка технологии и биофармасевтическое исследование мази на основе густого экстракта шалфея мускатного/ С.М. Мусозода., О.С. Шпичак., К.С. Махсудов.,

А.У.Раҳмонов., **Ф.Д.Давроншозода**, Р.С.Мусоев, //Наука и инновасия 2021- С-55-59.

[3-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Перспективы создания стоматологического геля на основе отечественного сырья/ **Ф.Д.Давроншозода**, А.С.Иzzатуллоев // Наука и инновасия 2021-С. 223-224.

[4-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Исследование микробиологической активности густого экстракта листьев шалфея мускатного/ А.У.Раҳмонов, Қ.С.Максудов., **Ф.Д. Давроншозода** // Наука и инновасия 2021.С-217-218.

[5-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Изучение репаративного действия мази салвит/ К.С.Максудов., А.У. Раҳмонов., С.М.Мусозода., М.Х. Раҳимова., Ф.Д. Давроншозода// Наука и инновасия 2022. С-120-125.

Патенти авроосиёги ва нахуспатент:

[6-М]. Нахуспатент №ТJ 1094. **Давроншозода, Ф.Д.** Малҳами зиддибактерийй/ Мақсудов К.С., Раҳмонов А.У., Мусоев Р.С., Мусозода С.М., Раҳимова М.Х.// Аризаи №2001418, барои ихтирои нахуспатент №ТJ 1094. Дар феҳристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 4 июни соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2020.

[7-М]. Нахуспатнти №ТJ 1063. **Давроншозода, Ф.Д.** Маводи дорувори барои табобати бемориҳои илтиҳобии узвҳои ЛОР/ А.У.Раҳмонов, К.С.Максудов, Р.С.Мусоев, С.М.Мусозода, О.С. Шпичак, Л. Л. Давтян // Аризаи №1901381, барии ихтирои нахуспатнти №ТJ 1063. Дар феҳристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 17 февраля соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2020.

[8-М]. Нахуспатнти №ТJ 1234 Малҳам барои табобати ҷароҳат/ С.М. Мусозода, Р.М. Рабиев, Н.С.Давлатзода, И.И. Хикматзода, **Ф.Д.Давроншозода** // Аризаи №2101568. барии ихтирои нахуспатнти №ТJ 1234. Дар феҳристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2021 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2021.

[9-М]. Патент №1421. Склад для ликування запальних оториноларингологичних захворювань у форми таблеток/ С.М. Мусозода, Р.М.Рабиев, Р.С.Мусоев, Хикматзода И.И., **Давроншозода Ф.Д.** // Аризаи №142132. Дар феҳристи давлатии ихтироъҳои Украина аз 12 майи соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Украина, 2020.

[10-М]. Евразийское патентное ведомство №202100088 A1 Антибактериальная мазь / К.С. Максудов, А.У. Раҳмонов, Р.С.Мусоев, **Ф.Д. Давроншозода**, С.М. Мусозода, М.Х.Раҳимова //Аризаи №202100088 A1. Евразийское патентное ведомство.

Маводи конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияй

[11-М]. **Davronshozoda F.D.** // Influence of «*Salvia officinalis l.*» on the dynamics of serotonin, histamine and formaline edema in animals feet/

N.Yu. Samandarzoda, **F.D. Davronshozoda** // Colloquium-journal №19 (212), 2024 (Warshawa , Polska) стр 39-41.

[12-М]. **Davronshozoda F.D.**, Specific composition of amino acid in leaves of sage officinalis – salvia officinalis L / **F.D. Davronshozoda**, N.Yu. Samandarzoda // SCIENCE AND WORLD International scientific journal. Науки и инновация 2023 №12 стр 27-30.

[13-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Дурнамои истифодай шалфеи мускатӣ. / С.М. Мусозода, Р.М.Рабиев, **Давроншозода Ф.Д.**// «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». Маводи конференсия чумхуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷаҳонро 30-солагии Истиқололи давлатии ҶТ,110-солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, қархрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандай ҳалқии Тоҷикистон С.Улуғзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ,дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» Душанбе-30.11.2022.

[14-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Применение галеновых препаратов в оториноларингологии / Р.С.Мусоев, Ҳикматзода И.И., **Давроншозода Ф.Д.**// Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 41, Душанбе-2022

[15-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Разработка технологии жидкого экстракта листьев шалфея мускатного, произрастающего в Таджикистане К.С. Максудов, А.У.Рахмонов, Ф.И.Нажмиддинов, Ф.Д.Давроншозода // Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 32, Душанбе-2022.

[16-М]. **Шоев Ф.Д. (Давроншозода Ф.Д.)** Анализ фармасевтического рынка антибактериальных лекарственных препаратов в РТ/ Курбонов Ф.К., Сайдова М.Н., Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 68, Душанбе-2022.

[17-М]. **Шоев Ф.Д. (Давроншозода Ф.Д.)** Натиҷаҳои VEN-таҳлил дар шӯъбаи дили беморхонаи марказии н.Данғара:/ **Ф.Д. Шоев, (Ф.Д. Давроншозода)** // Дар конференсияи чумхурияй дармавзуи «Масъалаҳои мубрами тиб ва фарматсияи муосир: Назар ба оянда». (13-ноябри соли 2018) ДМТ.

**НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

На правах рукописи

УДК:547+577.175.62

ББК:24.2 (2Т)

А-13



ДАВРОНШОЗОДА ФАЙЗУЛЛО ДАВРОНШО

**ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ И СТЕРОИДОВ В
СОСТАВЕ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО,
ВЫРАЩИВАЕМОГО В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание учёной степени кандидата
химических наук по специальности
1.4.4 – Органическая химия**

Душанбе - 2026

Диссертация выполнена в научно-исследовательской лаборатории «Химия и технология лекарственных растений», Научно-исследовательского Института Таджикского национального университета.

Научный руководитель:

Самандарзода Насрулло Юсуф –
доктор химических наук, доцент,
заведующий кафедрой клинико-
лабораторной диагностики ТГМУ им.
Абуали ибни Сино.

Официальные оппоненты:

Бандаев Сироджиддин Гадоевич –
член корреспондент АОТ, доктор
химических наук, профессор кафедры
органической и биологической химии
Таджикского государственного
педагогического университета имени
Садриддина Айни

Олимзода Рахмонали Амонулло –
кандидат химических наук, доцент
кафедры общей химии
Государственного университета Дангары

Ведущая организация:


**Научно-исследовательского
учреждения «Китайско-Таджикский
инновационный центр
натуральных продуктов» НАНТ.**

Защита диссертации состоится **«12» марта 2026** г. в **13:00** на заседании диссертационного совета, главный корпус, зал диссертационного совета 6D.KOA-010 при Таджикском национальном университете по адресу 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. E-mail: nazira64@inbox.ru

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в библиотеке Таджикского национального университета по адресу 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан «_____» 2026 г.

**Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат химических наук, доцент**



Бекназарова Н.С.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Несмотря на бурное развитие химии и наличие тысячи синтетических веществ, лекарственные средства, изготовленные из растений, имеют важное значение. Выделение из растений алкалоидов, флавоноидов, витаминов и биологически активных веществ еще больше расширяет спрос на растительные лекарственные средства. Существуют сотни растений, которые содержат активные вещества, необходимые для медицины, и которые можно использовать для лечения различных заболеваний. Флора Таджикистана, включающая в себя свыше 5,5 тысяч видов растений, играет особую роль. Благоприятный климат республики способствует высокому видовому разнообразию дикорастущих лекарственных растений.

Большинство этих растений до сих пор не изучены, и ученым предстоит проделать большую работу в этой области, природный источник некоторых лекарственных растений нашей Родины позволяет сделать их доступными в аптеках в качестве галенофармацевтических препаратов. Мармарак, марвак, макмак, кампиргулак – *Salvia sclarea* L. в России шалфей мускатный – многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству губоцветных. Прямостоячий стебель длиной от 40 до 100 сантиметров имеет сердцевидную или овальную форму с хвостиком, ароматный синий, или розовый цветок, круглый плод коричневого цвета с ароматом шафрана. Цветет в месяце июнь-июле, нерестится в август-сентябре. Родина-берега Средиземного моря. Растет также в горных районах Центральной Азии, Ирана, России, Кавказа и Крыма. В нашей республике он растет в основном в садах и прериях, степях и полях, кустарниках и на склонах гор и холмов. В медицине используется верхняя часть веток, листья и цветы мармелада, которые собирают в августе – сентябре и сушат в ветреных тенистых местах. Мускатный шалфей (*Salvia sclarea* L.) характеризуется широким спектром биологической активности, включая антиоксидантные, противовирусные и антигистаминные свойства. В его химическом составе присутствуют эфирные масла, флавоноиды и алкалоиды, которые во многом определяют его фармакологические эффекты. В зависимости от расположения географии состав этого растения сильно различается. Их химический состав, химические

свойства и фармако-биохимические свойства сильно различаются. Повторение научной литературы показывает, что на основе этого соединения изготавливаются лекарственные препараты, которые используются для лечения дерматовенерологических заболеваний, гепатопротекторные, противоопухолевые и панкреопротекторные средства. В медицине Таджикистана отвар цветка шалфея мускатного используют при сердечном приступе, заболеваниях горла и рта, простуде, а также в качестве слабительного, переваривающего пищу. Его отвар заказывают для лечения болезней почек. В качестве снотворного и успокаивающего средства употребляют настои из листьев и цветков шалфея. Ученые разработали препарат «Сальвин» на основе листьев и цветков шалфея мускатного, обладающий микробиологической и антибактериальной активностью. Приём шалфея мускатного противопоказан лицам с артериальной гипертензией, поскольку он может повышать кровяное давление.

Уровень изучения научные, теоретические и методологические основы исследования. Данная работа является одним из актуальных направлений в области изучения лечебных свойств лекарственных растений Республики Таджикистан. В этом направлении функционируют крупные научные школы [1–4]. Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время опубликован ряд исследований, выполненных такими учёными, как Хайдаров К.Х., Кодиров А.Х., Рахимов И.Ф., Ишонкулова Б.А., Мусозода С.М., Саидов Н.Б., Назарова З.Дж. и другими, которые активно занимаются данной проблематикой [5–8].

Изучение качественных и количественных реакций, направленных на определение аминокислот и стероидов в листьях и стеблях шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*), произрастающего на территории Республики Таджикистан, имеет важное научное и практическое значение. В связи с этим исследование химического состава шалфея мускатного и выделение из него органических соединений представляет интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Диссертационная работа посвящена разработке методологии определения количественного содержания аминокислот и стероидов в листьях и стеблях шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*), а также изучению их биологических свойств на

различных фармакологических моделях в сравнении с другими видами растительного сырья.

Отношение исследований к программам (проектам) или научным темам. Диссертация выполнена в лаборатории «Химия и технология лекарственных растений» Научно-исследовательского института Таджикского национального университета в соответствии с бюджетными проектами Республики Таджикистан по теме «Фитохимическое исследование лекарственных и дикорастущих растений Таджикистана с целью выявления биологически активных веществ и лекарственных препаратов» (государственный регистрационный номер № 0121TJ01002).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования: выделение органического вещества аминокислот, стероидов из состава шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*) и изучение его биологически активных свойств с использованием физико-химических методов.

Задачи исследования: Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие основные задачи:

- изучить химический состав шалфея мускатного (*Salvia sclarea*);
- определить карбоновые и ароматические аминокислоты, входящие в состав шалфея мускатного (*Salvia sclarea*), а также осуществить их разделение;
- определить циклические и гетероциклические аминокислоты в составе шалфея мускатного (*Salvia sclarea*) и провести их разделение;
- определить количественное содержание стероидов в составе шалфея мускатного (*Salvia sclarea*) и осуществить их разделение;
- изучить состав и степень чистоты аминокислот и стероидов, выделенных из шалфея мускатного (*Salvia sclarea*), с использованием методов инфракрасной спектроскопии, масс-спектрометрии, ЯМР-спектроскопии, тонкослойной хроматографии, газо-гельной хроматографии и капиллярной микроколонной хроматографии;
- провести сравнительную хроматографическую оценку состава образцов шалфея мускатного (*Salvia sclarea*), произрастающих в городе Вахдат и других регионах республики;

- исследовать антибактериальные и противогрибковые свойства компонентов шалфея мускатного (*Salvia sclarea*), произрастающего в регионе долины Рамити (г. Вахдат).

Объект исследования включает в себя мускатный мрамор *Salvia sclarea*, аминокислоты (Валин, Val, Аланин, Ala, Глицин, Gly, Изолейцин, Ile, Лейцин, Leu) и стероиды.

Предмет исследования, выделение органического вещества аминокислот, стероидов из состава мускатного шалфея (*Salvia sclarea L.*) и изучение его биологически активных свойств с использованием физико-химических методов.

Новизна научных исследований:

1. Впервые проведено комплексное исследование состава основных групп химических веществ, содержащихся в шалфее мускатном (*Salvia sclarea L.*).
2. Впервые из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*) идентифицированы и выделены алифатические, ароматические, циклические и гетероциклические аминокислоты.
3. Впервые из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*) идентифицированы и выделены стероидные соединения урсольного ряда.
4. Состав и степень чистоты соединений, выделенных из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*), впервые установлены с применением современных физико-химических методов анализа, включая инфракрасную спектроскопию, масс-спектрометрию, ЯМР-спектроскопию, тонкослойную электрофорезу и циклическую магнитно-резонансную спектроскопию.

5. Исследование биологической активности компонентов шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*) проведено с применением современных экспериментальных методик.

6. В результате проведенных исследований была разработана и получена инновационная антибактериальная мазь на основе экстракта шалфея мускатного.

Теоретическое и практическое значение исследования.

Исследования показали, что из состава мускатного ореха можно выделить ряд новых природных соединений. К ним относятся алифатические, ароматические, циклические, гетероциклические аминокислоты и стероиды, которые в будущем могут быть

использованы в качестве активных реакционных материалов в органическом синтезе. Производные аминокислот и стероидов были идентифицированы с использованием современных аналитических методов, а их биологические свойства и потенциальная активность были изучены в фармако-биохимических моделях. Сравнение литературных данных с результатами диссертационной работы показало, что состав мускатного ореха варьируется в зависимости от географического расположения лекарственных растений в Республике Таджикистан. Изучение органических веществ показало, что химический состав этого растения различается в зависимости от региона.

Вопросы, требующие защиты:

- разработаны и обоснованы методы выделения различных классов аминокислот из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*);
- с использованием современных физико-химических методов изучен качественный и количественный состав аминокислот, выделенных из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*);
- разработаны методы выделения стероидных соединений из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*);
- изучен состав стероидов с применением комплекса современных физико-химических методов анализа;
- экспериментально установлена низкая токсичность аминокислот, содержащихся в шалфее мускатном (*Salvia sclarea L.*);
- определена низкая токсичность стероидных соединений, выделенных из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*);
- получены и обобщены результаты фармако-биохимических исследований исследуемых органических веществ.

Степень достоверности результатов: Все экспериментальные данные были получены с использованием современных физико-химических методов и подтверждены статистической обработке результатов. В ходе исследования было собрано 25 списков соединений, что позволило систематизировать химический состав изучаемых веществ и оценить их чистоту. Чистоту веществ проверяли методом тонкослойной хроматографии, а также на хроматографическом приборе чешского производства

«Хром-5», обеспечивающем высокую точность разделения компонентов.

Элементный состав соединений, включающий углерод, водород, кислород и азот, определяли на приборе «vario MICRO CUBE», а содержание хлора — методом расплава, что позволило получить точные количественные показатели. Структуру и функциональные группы синтезированных соединений исследовали с помощью инфракрасной спектроскопии (ИС) в диапазоне 400–4000 см^{-1} на приборах «Specord IR-75» и спектрометре «SHIMADZU», используя суспензию в вазелине и таблетки с калий бромидом (КBr).

Молекулярный состав и структура соединений подтверждалась с помощью масс-спектрометрии (www.Chromatec.ru 5000.2) и ЯМР-спектроскопии на приборе «Брукер 500 МГц», с использованием растворов в ампулах 50 мм и специальных ампулах Norell-508-UP и Norell-S-5-500. Эти методы позволяли детально изучить молекулярную структуру, определить наличие характерных функциональных групп и оценить стабильность соединений.

Биохимический анализ синтезированных веществ проводился на аппаратах Stat-Fax 1904 и Biohem, а также на гематологическом анализаторе Micros-20+. Дополнительно использовался хроматограф «Хром-5» с детектором вспышки ионизации для качественного и количественного анализа отдельных компонентов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует требованиям Специальности 1.4.4.

- Органическая химия, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Она включает в себя в главе 2.3: исследования структур и свойств органических соединений с использованием химических, физико-химических и физико-аналитических методов в сочетании с теоретическими расчётами (**пункт 1**), а также идентификацию новых органических соединений, реакций, аналитических методологий и их извлечение/изоляцию из природных материалов (**пункт 3**).

Главы 1.2 и 2.3 включают: исследование реакционной способности органических соединений и механизмов реакций, теоретический анализ корреляций между структурой, свойствами и реакционной способностью как синтетических, так и природных соединений (**пункт 2**), а также фитохимические исследования и

процедуры выделения органических веществ, полученных из природных источников (**пункт 6**).

Личный вклад соискателя, научной степени исследования:

Соискатель продемонстрировал значительный личный вклад в научное исследование, выполнив ряд ключевых задач. Он осуществлял планирование и проведение экспериментов, включающих анализ и обобщение данных химических, биологических и биохимических исследований. Соискатель реализовал хроматографическое разделение реакционных смесей, выделение и очистку как новых синтезированных продуктов, так и соединений растительного происхождения. С помощью физико-химических аналитических методов он определил структуру полученных веществ. Он также принимал непосредственное участие в разработке плана исследования, подготовке статей к публикации и их представлении.

Утверждение и внедрение результатов диссертации (Апробация работы). Материал диссертационной работы был представлен и обсужден на ряде конференций, симпозиумов различной степени. Республиканская научно-практическая конференция преподавателей и сотрудников Государственного медицинского университета, посвященная празднованию 30-летия независимости Государственной Республики Таджикистан, 110-летия Народного поэта Таджикистана, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзоды, 110-летия Народного писателя Таджикистана С. Улугзоды и «Двадцать лет преподавания и развития естественных, точных и математических наук в области науки и образования (2020-2040)» Душанбе, 30.11.2022. Республиканская конференция «Флора Таджикистана – источник развития и применения лекарственных средств». Душанбе, 2022. На Республиканской конференции «Флора Таджикистана – источник развития и применения лекарственных средств». Душанбе, 2022. Республиканская конференция «Актуальные вопросы современной медицины и фармации: взгляд в будущее» (13 ноября 2018 г.) ТНУ.

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 17 научных работах, включающих статьи, патенты и тезисы. Из них 5 статей

опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, 1 евразийский патент, 4 патента Республики Таджикистан, а также 7 тезисов докладов, представленных на международных и республиканских научных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 148 страниц компьютерной распечатки и включает введение и 4 главы, обзор литературы, экспериментальную часть, объяснение результатов эксперимента, основные выводы работы, количество использованных источников, включающее 150. списки. Диссертация состоит из 34 рисунков, 3 таблиц.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-химические методы исследования шалфея мускатного и выделения алифатических аминокислот и изучение их состава с помощью ГЖХ, ИК и ПМР)

На текущем этапе развития химической науки, в том числе органической химии, во всем мире продолжается поиск методов синтеза новых быстродействующих лекарственных соединений. В этом контексте выделение органических соединений, в том числе аминокислот, которые относятся к классу органических соединений, имеют высокий потенциал быть полезными и биологически активными и являются актуальным вопросом для специалистов в области химии, фармакологии и фармако-биохимии. Можно отметить, что химия аминокислот считается одной из самых перспективных, развитых и прибыльных отраслей современной науки. Аминокислоты имеют свои особенности, биологически активны и имеют большое научно-практическое значение. Мускатный шалфей (*Salvia sclarea L.*) является ценным лекарственным растением, обладающим широким спектром биологической активности. В состав данного растения входят разнообразные биологически активные соединения, обеспечивающие его выраженное антиоксидантное, противовоспалительное, противогрибковое, обезболивающее и ранозаживляющее действие. К числу таких соединений относятся эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды,

витамины и органические кислоты. Комплексное воздействие этих веществ обуславливает наблюдаемые терапевтические эффекты.

Химический состав мускатного шалфея характеризуется высоким уровнем вариабельности, обусловленной рядом факторов, включая условия произрастания, климатические особенности региона и его географическое положение. Флавоноиды и дубильные вещества, присутствующие в листьях и цветках, способствуют укреплению сосудистой стенки, обладают антиоксидантной активностью и ускоряют процессы регенерации тканей. Алкалоиды, входящие в состав растения, оказывают мягкое обезболивающее и противовоспалительное действие, что делает шалфей перспективным компонентом для разработки дерматологических препаратов.

Настоящее исследование направлено на выявление химических компонентов прозрачного жидкого экстракта мускатного шалфея, произрастающего на территории Республики Таджикистан, с целью разработки на его основе лекарственных препаратов для применения в дерматологии. Особое внимание уделяется препаратам, обладающим комплексным действием: противовоспалительным, противогрибковым и способствующим ускоренному заживлению ран. Эффективность таких средств объясняется многофакторной природой раневого процесса, включающего воспаление, микробную колонизацию, окислительный стресс и повреждение тканей, что требует комплексного фармакологического воздействия для стимуляции процессов регенерации и восстановления кожи.

Объектом исследования являются сушеные листья шалфея мускатного, собранные в период цветения в ущелье Ромит. Анализ проводился по средним образцам сырья, отобранным в соответствии с инструкциями монографии общей Фармакопеи «образцы сырья лекарственных растений и лекарственные травы». Определение аминокислотного состава листьев шалфея мускатного определялось методом высокоэффективная жидкостная хроматография. Анализ газожидкостной хроматографии выявил количество аминокислот в особых условиях работы. Анализ аминокислотного состава был осуществлен с использованием метода тонкослойной хроматографии (TSLC). В качестве

неподвижной фазы применялись хроматографические пластины Мерк стандартного размера (15x20 см). Для проведения разделения аминокислот использовалась подвижная фаза, представляющая собой смесь растворителей: н-бутанол, уксусная кислота и вода в соотношении 40:40:20.

Насыщение хроматографической камеры с растворяющей смесью проводилось в течение 2 часов. Исследуемым материалом был водный экстракт из сухого сырья. Предварительно сырьё измельчалось до частиц размером, проходящих через сито с диаметром отверстий 2 мм по ГОСТ 214-83. Около 6,00 г измельченного сырья экстрагировалось в течение 1,5 часов кипячением с 80 мл дистиллированной воды на водяной бане. После того, как экстракт остыл и был отфильтрован (тестовый раствор), его разбавили дистиллированной водой до отметки в мерной колбе объемом 200 миллилитров. Для сравнения использовали эталонные растворы - это растворы стандартных образцов аминокислот: серина, пролина, фенилаланина, глицина и глутаминовой кислоты, каждый из которых имел концентрацию 0,05%.

В ходе эксперимента мы уточнили максимальную длину волны поглощения цветного комплекса с нинидрин-глутаминовой кислотой и водным экстрактом Пенни. набор данных и решение для исследования были получены в порядке, указанном ниже. В этой части данной работы мы разделяем аминокислоты на части и с помощью современных методов представляем их состав, который был выделен из растения мраморного мускатного шалфей по отдельности. В научно-исследовательской лаборатории ТНУ были проведены экспериментальные исследования по сушке плодов мускатного шалфей. При этом, в том числе, и в ФБГОУ Институт органической химии им. Н.Д. В ходе эксперимента на 12–14-й минутах хроматографирования наблюдалось появление интенсивных пиков, что свидетельствует о присутствии в исследуемом образце незаменимых аминокислот. При сравнении с эталонными образцами импульсный детектор зафиксировал сигналы в интервале 8–9 минут, что подтверждает воспроизводимость, прозрачность и надёжность применяемого метода анализа. Метод ГЖХ обеспечивает эффективное разделение лёгких и средних по молекулярной массе

соединений и характеризуется высокой чувствительностью при определении относительного количественного содержания и аминокислотного состава исследуемых образцов. Появление характерных полос поглощения в инфракрасных спектрах является достоверным признаком присутствия функциональных групп, типичных для аминокислот, таких как NH₂, COOH и CH₂. Анализ инфракрасного спектра (рис. 1) выявил интенсивные полосы, соответствующие валентным и деформационным колебаниям амино- и карбоксильных групп, что подтверждает аминокислотную природу исследуемых соединений. Инфракрасный спектр исследуемых образцов характеризуется наличием полос поглощения в области 3200–3400 см⁻¹, соответствующих валентным колебаниям гидроксильных и аминных групп, а также интенсивных полос в диапазоне 1650–1750 см⁻¹, обусловленных колебаниями карбонильных групп (C=O). Указанные спектральные признаки достоверно подтверждают присутствие данных функциональных групп и свидетельствуют о наличии в листьях *Salvia sclarea L.* полифункциональных органических соединений.




Рисунок 1- ИК спектроскопия-(S)-2-амино-3-метилбутиановая кислота (Валин), полученная из соединения шалфея мускатного

В инфракрасных спектрах выделенных алифатических соединений полосы поглощения в диапазоне 1330–1140 см⁻¹ указывают на присутствие карбоксильных групп. Наличие полос в области 780–840 см⁻¹ свидетельствует о присутствии метильных

групп, тогда как полосы в диапазоне 1400–1440 см^{-1} характерны для деформационных колебаний гидроксильных функциональных групп. Результаты протонного ядерного магнитного резонанса (^1H ЯМР) хорошо согласуются с данными других аналитических методов и демонстрируют характерные сигналы в области химических сдвигов 0,9–4,5 м.д., которые относятся к протонам метильных и метиленовых групп. Таким образом, совокупность использованных физико-химических методов подтверждает наличие в мускатном шалфее (*Salvia sclarea L.*) значительного содержания алифатических аминокислот, что, вероятно, обуславливает его природные и биологически активные свойства.





Рисунок 2- РМП-(S)-2- амино-3-метилбутановая кислота (Валин), полученная из соединения шалфея мускатного

ПМР-спектр (^1H ЯМР) (S)-2-амино-3-метилбуаноата (валина), выделенного из шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*), демонстрирует характерные спектральные признаки алифатических аминокислот. В соответствующих областях химических сдвигов наблюдаются сигналы, относящиеся к протонам аминогруппы ($-\text{NH}_2$), карбоксильной группы ($-\text{COOH}$) и алкильной боковой цепи. В области 0,9–1,0 м.д. регистрируются интенсивные сигналы, характерные для метильных групп изопропильного фрагмента, что полностью соответствует структуре молекулы валина. Сигнал α -протона ($\text{CH}-\text{NH}_2-\text{COOH}$) наблюдается в области 3,6–3,8 м.д., что является типичным для

аминокислот. Совокупность выявленных спектральных характеристик однозначно подтверждает идентификацию и выделение валина из состава шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*).

**Физико-химические исследования шалфея мускатного,
выделение из ароматических аминокислот и изучение их состава с
помощью ГЖХ,
ИК и ПМР**

Аминокислоты, будучи фундаментальными компонентами белковых структур, играют решающую роль в жизнедеятельности организмов. Вместе с нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами они составляют основу биологических процессов.



Обычно ароматические аминокислоты анализируются современными методами, которые подробно описаны в экспериментальной части работы, мы выделили из состава мускатного шалфея. Для изучения степени его чистоты был использован ГЖХ.




Рисунок 3- Хроматограмма треонина*, Thг, полученного из соединения шалфея мускатного





Рисунок 4- ПМР-Треонин*, Thr, полученный из соединения шалфея мускатного

Для анализа и идентификации функциональных групп аминокислот в исследуемых веществах применялся комплекс современных физико-химических методов, включающий инфракрасную спектроскопию (ИК) и ядерно-магнитную спектроскопию (^1H ЯМР).

Таким образом, комбинированное применение ИК и ЯМР создаёт прочную основу для научного анализа состава и структуры исследуемых веществ, позволяя делать обоснованные выводы о их химических свойствах и потенциальной биологической активности.

Физико-химические исследования шалфея мускатного, выделение ароматических аминокислот

Анализ научных источников показывает, что исследования по выделению аминокислот из состава природных растений являются одними из самых природных и недооцененных материалов для синтеза новых производных, содержащих аминокислотные остатки в своих молекулах, не так много изучено. Выделение и модификация новых аминокислотных производных новыми способами получения нового органического соединения из состава мускатного шалфей является одной из основных целей данной работы. Это связано, прежде всего, с тем, что оба аминокислотных производных содержат соединения с высокой реакционной способностью.



Обычно ароматические аминокислоты анализируются современными методами, которые подробно описаны в экспериментальной части работы, мы выделили из состава мускатного шалфея. Для оценки степени чистоты веществ, выделенных из мускатного шалфея, был использован газохроматографический метод (ГЖХ). Чистота соединений дополнительно проверялась методом тонкослойной хроматографии, выполненной на планшетах «Силуфол».

Структура и состав полученных соединений были подтверждены с помощью комплекса спектроскопических методов: инфракрасной спектроскопии (ИК), твердотельной ядерной магнитно-резонансной спектроскопии (MAS NMR) и жидкостной ядерной магнитно-резонансной спектроскопии (ПМР). ИК-спектры выделенных веществ показали характерные полосы поглощения, соответствующие основным функциональным группам, присутствующим в аминокислотах, включая аминогруппы, карбоксильные группы и боковые цепи, что подтвердило идентичность и структурную целостность выделенных соединений. Применение такого комплексного подхода обеспечивало высокую достоверность результатов и позволило точно охарактеризовать химический состав экстрактов мускатного шалфея, включая идентификацию биологически активных аминокислот.




Рисунок 5- ИК спектров -Треонин*, Thr, полученный из соединения шалфея мускатного

Пики ИК-спектра в области 720–745 см⁻¹ соответствуют валентным колебаниям C–Cl и подтверждают наличие атомов хлора в молекуле. Полосы 1045–1175 см⁻¹ относятся к колебаниям C–H, указывая на присутствие метиленовых и метильных групп. Пик около 1790 см⁻¹ характерен для карбонильной группы C=O, а полосы 2840–2870 см⁻¹ соответствуют валентным колебаниям –CH₂–, что подтверждает наличие углеродного скелета. Валентные колебания O–H в диапазоне 3255–3375 см⁻¹ свидетельствуют о наличии гидроксильных групп. Совокупность ИК-, МС- и ЯМР-данных полностью подтверждает структуру исследованных соединений и наличие в них основных функциональных групп, что имеет важное значение для дальнейших исследований в области органического синтеза и фармакологической химии.




Рисунок 6- РМП-Треонин*, Thr, полученный из соединения шалфея мускатного

Спектр протонного магнитного резонанса (ПМР) соединения демонстрирует ряд характерных сигналов, отражающих структурные особенности молекулы. В области 0,76 м.д. наблюдается четкий синглет, соответствующий протонам метильной группы, что подтверждает наличие алкильного фрагмента в молекуле. Кроме того, в спектре регистрируются четыре широких синглета, относящиеся к протонам двух эндоциклических метильных групп. Широкие сигналы обусловлены как подвижностью метиленовых групп, так и влиянием электронной среды, создаваемой близлежащими двойными связями или электрофильными функциональными группами. Синглеты в

областях 6,03 м.д. и 5,52 м.д., а также 4,71 м.д. и 4,46 м.д. соответствуют протонам экзоциклических метиленовых групп и подтверждают их расположение в молекуле.

Изучение химического строения и определение строения стероидов состава шалфея мускатного

Стероиды представляют собой высокомолекулярные органические соединения, многие из которых относятся к группе гормонов. В современной медицине, фармакологии и косметологии стероиды широко применяются как активные компоненты для лечения различных заболеваний, а также в составе косметических средств. Результаты исследования показали наличие в составе мускатного шалфея ряда стероидных соединений, включая урсоловую кислоту высокомолекулярное органическое вещество с выраженным биологически активными свойствами. Эти соединения обладают противовоспалительным, антимикробным и антиоксидантным действием, благодаря чему находят широкое применение в современной косметологии.





Рисунок 7.- ПМР-спектр урсолиловой кислоты, полученный из состава шалфея мускатного

Для количественного определения содержания урсоловой кислоты в мускатном шалфее, используются методы фитохимического анализа и органической химии. Для этого мы применили метод ГЖХ, чтобы узнать степень его чистоты. Для краткого изучения данного состава мы использовали методы ИК и ПМР, результаты которых были

следующими: Появление линий поглощения в областях 1770-1120 cm^{-1} указывает на наличие карбоциклических групп из содержания урсоловой кислоты, а появление линий в областях 780-840 cm^{-1} указывает на наличие метильных групп, а наличие полос в областях 1400-1440 cm^{-1} указывает на наличие его функциональных групп в соединении. Анализ ПМР показывает наличие атома водорода в различных областях этого соединения циклофеннатрена. На примере его групп в области 7,3-7,8 м.д. просмотрено. Метиленовые группы встречаются в областях 3,5-4,0 м.д. В ходе анализа ПМР был проанализирован состав этой кислоты. Результаты анализа показали, что это соединение представляет собой урсоловую кислоту. Наряду с определяющими свойствами данной кислоты мы также определили олеиновую кислоту в составе шалфея мускатной.



Для определения чистоты мы использовали метод ГЖХ для изучения степени его чистоты. Степень чистоты соединения 80-88% показала, что это один из лучших фитохимических методов.. чтобы отделить его от растительного состава.




Рисунок 8.- ИК-олеиновая кислота, полученная из состава шалфея мускатного.




Рисунок 9.- ПМР-олеиновая кислота, полученная из состава шалфея мускатного

Для краткого изучения данного состава мы использовали методы СИ и РМР, результаты которых были следующими: Появление линий поглощения в областях $1330\text{-}1140\text{cm}^{-1}$ указывает на наличие карбоциклических групп из содержания урсоловой кислоты, а появление линий в областях $780\text{-}840\text{cm}^{-1}$ указывает на наличие метильных групп, а наличие полос в областях $1400\text{-}1440\text{cm}^{-1}$ указывает на наличие его функциональных групп в соединении. Анализ ПМР показывает наличие атома водорода в различных областях этого соединения циклофеннатрена. На примере его групп в области $7,4\text{-}7,9$ м.д. Метиленовые группы находятся в областях $3,5\text{-}4,0$ м.д. они встречаются. В ходе анализа ПМР был проанализирован состав этой кислоты. Результаты анализа показали, что данное соединение является олеиновой кислотой.

Экдистероиды являются наиболее многочисленной и распространённой группой стероидных соединений в живой природе. Их участие в жизненных процессах практически всех классов организмов обусловлено выполнением ими разнообразных функций. В то время как у насекомых экдистероиды играют важную гормональную роль, их физиологическое значение для других групп беспозвоночных, растений и млекопитающих до конца не выяснено. Предполагается, что у человека они могут оказывать общее

регуляторное воздействие на организм, подобно витаминам и витаминоподобным соединениям. Широкое распространение эндистероидов в биосфере вызывает интерес к механизмам реализации их биологической активности как при эндогенном синтезе у членистоногих, так и при поступлении с пищей у млекопитающих.

ПОИСК ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Изучение токсичности и противовоспалительных свойств образцов анализируемый экстракт шалфея мускатный

В то же время, наука является одной из главных целей правительства Республики Таджикистан. Были приняты несколько долгосрочных и краткосрочных программ по изучению лечебных свойств растений Республики Таджикистан, и сегодня они частично изучаются в научных процессах. В своих многочисленных выступлениях лидер нации, Президент Республики Таджикистан, выразил поддержку целебным свойствам растений Республики Таджикистан, отметив, что наша райская земля считается одним из самых красивых и экологически чистых мест на планете Земля, а цветы и растения, произрастающие в Таджикистане, обладают высокими биологическими свойствами по сравнению с другими лекарственными цветами и растениями в других частях мира. В связи с этой темой мы изучили фитохимические и лечебные свойства мускатного шалфея, произрастающего в нашей республике. Изучение биологически активных свойств синтезированных соединений представляет собой важный этап на пути к их практическому применению, включая возможное использование в производстве. В соответствии с поставленными задачами на первом этапе были проведены исследования по определению острой токсичности (LD_{50}) соединений, выделенных из экстракта мускатного шалфея. Результаты показали, что исследуемые соединения обладают низкой токсичностью. Эксперименты проводились по методу Кербера, согласно которому полученные значения соответствуют III–IV классам токсичности. В качестве подопытных животных использовались белые лабораторные мыши массой 17–22 г. Животным вводилось исследуемое вещество, полученное из экстракта мускатного шалфея. В течение 72 часов наблюдения

патологических изменений в состоянии животных не отмечено. Анализ всех образцов экстракта показал отсутствие токсичных компонентов. Значение LD₅₀ установить не удалось, поскольку в течение всего периода наблюдения не было зафиксировано ни одного летального исхода — ни в экспериментальной, ни в контрольной группах. Кроме того, у животных, получавших экстракт, не наблюдалось клинических признаков токсического воздействия.

Таблица 1.- Результаты исследования острой токсичности образцов анализируемый экстракт мускатного шалфея

Группа животных	Количество	Количество, мг/кг	Живых	Умер
Экспериментальный	12	1400	12	-
Экспериментальный	12	1650	12	-
Экспериментальный	12	1100	12	-
Экспериментальный	12	1400	12	-
Контролный	12	-	12	-

Таблица 2.- Результаты исследования острой токсичности анализируемых образцов экстракта мускатного шалфея

Группа животных	Количество	Воя, мг/кг	Зинда монд	Фав
Экспериментальный	12	1500	12	-
Экспериментальный	12	1750	12	-
Экспериментальный	12	1000	12	-
Экспериментальный	12	1500	12	-
Контролный	12	-	12	-

Результаты эксперимента показали, что экстракт мускатного шалфея и содержащиеся в нем аминокислоты обладают низкой токсичностью и на его основе можно приготовить новые лечебные соединения для современной таджикской медицины. С демографической точки зрения количество больных с хроническими ранами и нарушениями заживления достигает эпидемических размеров, что еще больше усугубляется как с точки зрения здоровья человека, так и с экономической точки зрения. Содействие заживлению ран и преднамеренное уменьшение и уменьшение эстетического воздействия на пациента считается главной целью современной медицины. В результате возникает острые медицинская и социальная потребность в улучшении терапевтических подходов, повышающих способность эндогенных тканей к регенерации. В этом отношении растительность, производящая все виды лечебных материалов для лечения больных, считается одной из целей современной науки. После проведения

токсикологических исследований шалфея мускатного, произрастающего в Таджикистане и содержащего эфирные масла, алкалоиды, флавоноиды, аминокислоты и другие биологически активные соединения с антимикробным, гемостатическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием, был инициирован доклинический этап исследований. Исследования показали, что мускатный шалфей, произрастающий в Таджикистане, демонстрирует повышенную антимикробную активность по отношению к культурам *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* и *Candida albicans*. В качестве контрольного препарата использовался обычный шалфей. Методом диффузии агара было установлено, что зоны ингибирования роста микроорганизмов листьев мускатного шалфея *Althaea* по сравнению с культурой *S. aureus* составили $21,2 \pm 0,7$ мм, *B. subtilis* – $20,2 \pm 0,6$ мм, *E. coli* – $21,6 \pm 0,5$ мм. При этом эти значения превысили зоны ингибирования роста микроорганизмов, содержащихся в растворе обычного шалфея (*S. aureus* – $20,6 \pm 0,5$ мм, *B. subtilis* – $13,6 \pm 0,5$ мм). Важно отметить, что растворимый «шалфей» не проявил противогрибковой активности против *Candida albicans*. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования экстракта мускатного шалфея, произрастающего в Таджикистане, в качестве основного компонента для производства антимикробных препаратов.

Вывод

1. Разработаны новые методы синтеза производных органических соединений из мрамора мускатного шалфея (*Salvia sclarea*). Установлено, что ход реакций получения биологически активных соединений является универсальным и эффективно протекает как в органических, так и в неорганических растворителях [1-М, 2-М, 3-М].

2. Впервые физико-химическими методами исследовано содержание ароматических аминокислот в составе шалфея мускатного (*Salvia sclarea muscatum*). Полученные данные свидетельствуют о различном составе и фармакологических свойствах этих аминокислот, что открывает перспективы их использования в качестве активных компонентов биологических и фармакологических препаратов [4-М, 5-М, 6-М, 7-М].

3. Для количественного и качественного анализа аминокислот применялись современные аналитические методы, включая жидкостную и газовую хроматографию, ультрафиолетовую спектроскопию и масс-спектрометрию. Физико-химические исследования позволили оценить влияние растворителей, температуры и других параметров реакционной среды на эффективность разделения аминокислот и их стабильность. Полученные данные являются фундаментом для разработки и синтеза новых биологически активных соединений, а также для углубленного изучения их фармакологических свойств [8-М, 9-М, 10-М, 11-М].

4. Исследование состава, чистоты и свойств аминокислот и стероидов в составе шалфея мускатного проводилось с использованием ряда спектроскопических методов и физико-химических анализов. В ходе анализа использовались методы (инфракрасной спектроскопии, ИК) для идентификации функциональных групп и химических соединений, что позволило с высокой точностью идентифицировать основные органические компоненты, включая аминокислоты и стероиды. Одновременно с этим применялся масс-анализ (Масс.) для определения молекулярной массы и структуры органических компонентов, что позволило открыть новые органические соединения и их структурные особенности. Для анализа атомной структуры и внутримолекулярных связей использовалась ЯМР-спектроскопия (ядерный магнитный резонанс), что имело большое значение для подтверждения молекулярной структуры аминокислот и стероидов[12-М, 13-М].

5. В ходе первичного скрининга было установлено, что ароматические аминокислоты и кортикостероиды, содержащиеся в этих соединениях, обладают высокими антимикробными свойствами. Эти соединения показали значительные эффекты по сравнению с полевыми штаммами и обладали стабильной и эффективной антимикробной активностью. Дальнейшее изучение показало, что их действие распространяется не только на грамположительные микробы, но и на некоторые грамотрицательные виды. Кроме того, было установлено, что структура и функциональные группы этих соединений играют важную роль в силе их антимикробного действия, что позволяет

эффективно использовать их при разработке новых лекарственных средств и фармакологическом анализе [14-М, 15-М, 16М, 17М].

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования

1. Полученные новые алифатические, ароматические и гетероциклические производные аминокислот мускатного шалфея могут быть использованы в качестве химических реагентов в тонком органическом синтезе, а также для создания органических лигандов. Эти соединения содержат активные функциональные группы, которые позволяют им вступать в разнообразные химические реакции и формировать сложные органические структуры с уникальными физико-химическими и биологическими свойствами. Применение таких веществ в органическом синтезе не только повышает эффективность и точность реакций, но и открывает новые перспективы для разработки биологически активных соединений с потенциальными фармакологическими эффектами.

2. Выделенные из мускатного шалфея вещества продемонстрировали высокие терапевтические свойства, что подтвердились положительными результатами тестирования на различных фармакологических моделях. По сравнению с традиционными материалами, эти соединения проявили более стабильное и эффективное действие, что указывает на их широкий потенциал в разработке новых биологических и фармакологических препаратов. Для всестороннего выяснения терапевтической эффективности и безопасности исследуемых соединений необходимы дополнительные клинические исследования и углублённые испытания. Полученные в ходе исследований данные служат основой для разработки новых стратегий синтеза и оптимизации биологически активных соединений, обладающих потенциалом в лечении различных заболеваний.

Адабиётҳои истифодашуда

1. Мусозода С. М. Анатомическое строение ассимиляционного аппарата шалфея мускатного (*Salvia sclareae L.*), произрастающего в таджикистане [Текст] / С. М. Мусозода, А. У. Рахмонов, К. С. Махсудов, О. С. Шпичак, Р. С. Мусоев, Ш. С. Холова, Г. Н. Эргашева // Наука и инновация. – 2019. – № 4. – С. 134–140.
2. Буханов В. Д. Антибактериальные свойства монтмориллонит содержащих сорбентов [Текст]/ В. Д. Буханов [и др.] // Научные ведомости. Серия Естественные науки. – 2011. – № 21 (116), вып. 17. – С. 57–63.
3. Белоусов, П. Е. Бентонитовые глины России и стран ближнего зарубежья [Текст] / П. Е. Белоусов, В. В. Крупская // Георесурсы. – 2019. – № 21 (3). – С. 79–90.
4. Берхин, Е. Б. Методы изучения новых химических соединений функции почек [Текст] / Е. Б. Берхин // Химико-фармасевтический журнал. – 1977. – Т. 11, № – С. 3–11.
5. Бондарев, А. В. разработка состава и технологии гранулированной лекарственной формы с адсорбционным действием на основе монтмориллонитовой глины [Текст] / А. В. Бондарев. – Белгород, 2015. С.–138.
6. Веденеева, Н. Е. Метод исследования глинистых минералов с помощью красителей (спектрофотометрический анализ) [Текст]/ Н. Е. Веденеева, М. Ф. Викулова. – Львов: Изд–во Львовс. гос. ун–та, 1956. С – 96.
7. Георгиевский, В. П. Физико–химические и аналитические характеристики флавоноидных соединений [Текст]/ В. П. Георгиевский, А. И. Рыбаченко, А. Л. Козаков. – Ростов: Изд–во Ростовского ун–та, 1988. С.– 131.
8. Георгиевский, В. П. Физико–химические методы анализа биологически активных веществ растительного происхождения [Текст]/ В. П. Георгиевский, Н. А. Казаринов, М. О. Каррыев. – Ашхабад: Илым, 1996. – 240 С- 23.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

**Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан:**

[1-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Омӯзиши таркиби аминокислотаҳои таркиби мармараки мускатий/ **Ф.Д. Давроншозода, Н.Ю. Самандарзода** // Илм ва фановари 2024 с- 217-218.

[2-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Разработка технологии и биофармасевтическое исследование мази на основе густого экстракта шалфея мускатного/ С.М. Мусозода, О.С. Шпичак, К.С. Махсудов,

А.У.Рахмонов, **Ф.Д.Давроншозода**, Р.С.Мусоев, //Наука и инновасия 2021- С55-59.

[3-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Перспективы создания стоматологического геля на основе отечественного сырья/**Давроншозода Ф.Д.**, Иззатуллоев А.С./ Наука и инновасия 2021-С. 223-224.

[4-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Исследование микробиологической активности густого экстракта листьев шалфея мускатного/ А.У.Рахмонов, К.С.Максудов, **Ф.Д. Давроншозода** // Наука и инновасия 2021С-217-218.

[5-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Изучение репаративного действия мази салвиг/ К.С.Максудов, А.У.Рахмонов, С.М.Мусозода, М.Х.Рахимова, Ф.Д. Давроншозода// Наука и инновасия 2022. С-120-125.

Евразийский патент и малый патент.

[5-М]. Нахуспатент №ТJ 1094. **Давроншозода, Ф.Д.** Малҳами зиддиктерияй/ Максудов К.С.,Рахмонов А.У., Мусоев Р.С., Мусозода С.М., Раҳимова М.Х.// Аризаи №2001418, барои ихтирои нахуспатент №ТJ 1094. Дар фехристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 4 июни соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2020.

[6-М]. Нахуспатнти №ТJ 1063. **Давроншозода, Ф.Д.** Маводи дорувори барои табобати бемориҳои илтиҳобии узвҳои ЛОР/ Раҳмонов А.У., Максудов К.С., Мусоев Р.С., Мусозода С.М., Шпичак О.С., Давтян Л.Л. //аризаи №1901381, барии ихтирои нахуспатнти №ТJ 1063. Дар фехристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 17 февраля соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2020.

[7-М]. Нахуспатнти №ТJ 1234 **Давроншозода, Ф.Д.** Малҳам барои табобати ҷароҳат/ С.М. Мусозода, Р.М. Рабиев, Н.С.Давлатзода, И.И. Хикматзода, Ф.Д.Давроншозода //аризаи №2101568. барии ихтирои нахуспатнти №ТJ 1234. Дар фехристи давлатии ихтироъҳои Чумхурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2021 ба қайд гирифта шуд. Душанбе, 2021.

[8-М]. Патент №142132. **Давроншозода, Ф.Д.** Склад для ликування запальних оториноларингологічних захворювань у формі таблеток/ С.М. Мусозода, Р.М.Рабиев, Р.С.Мусоев, Хикматзода И.И., **Давроншозода Ф.Д.** // аризаи №142132. Дар фехристи давлатии ихтироъҳои Украина аз 12 майи соли 2020 ба қайд гирифта шуд. Украина, 2020.

[9-М]. Евразийское патентное ведомство №202100088 А1 **Давроншозода, Ф.Д.** Антибактериальная мазь / К.С. Максудов, А.У. Раҳмонов, Р.С.Мусоев, Ф.Д. Давроншозода, С.М. Мусозода, М.Х.Рахимова //аризаи №202100088 А1. Евразийское патентное ведомство.

Публикация в других изданиях: 2) Статьи, опубликованные в материалах международных и республиканских конференций:

[10-М]. **Davronshozoda F.D.** // Influence of «Salvia officinalis l» on the dynamics of serotonin, histamine and formaline edema in animals feet/ N.Yu. Samandarzoda, **F.D. Davronshozoda** // Colloquium-journal №19 (212), 2024 (Warshava , Polska) стр 39-41.

[11-М]. **Davronshozoda F.D.**, Specific composition of amino acid in leaves of sage offisionalis – salvia officinalis L / **F.D. Davronshozoda**, N.Yu. Samandarzoda // SCIENCE AND WORLD International scientific journal. Науки и инновация 2023 №12 стр 27-30.

[12-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Дурнамои истифодай шалфеи мускатӣ. / С.М. Мусозода, Р.М.Рабиев, **Давроншозода Ф.Д.**// «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». Маводи конференсия чумхуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷаҳонро 30-солагии Истиқлоли давлатии ҶТ,110-солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, қархрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандай ҳалқии Тоҷикистон С.Улуғзода ва «бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ,дакик ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» Душанбе-30.11.2022.

[13-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Применение галеновых препаратов в оториноларингологии / Р.С.Мусоев, Ҳикматзода И.И., **Давроншозода Ф.Д.**// Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 41, Душанбе-2022

[14-М]. **Давроншозода, Ф.Д.** Разработка технологии жидкого экстракта листьев шалфея мускатного, произрастающего в Таджикистане Максудов К.С.,Рахмонов А.У., Нажмиддинов Ф.И., **Давроншозода Ф.Д.**// Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 32, Душанбе-2022.

[15-М]. **Шоев Ф.Д. (Давроншозода Ф.Д.)** Анализ фармасевтического рынка антибактериальных лекарственных препаратов в РТ/ Курбонов Ф.К., Сайдова М.Н., Дар конференсияи чумхурияй «Флораи Тоҷикистон- сарчашмаи таҳия ва татбиқи маводи доруворӣ». С. 68, Душанбе-2022.

[16-М]. **Шоев Ф.Д. (Давроншозода Ф.Д.)//** Муайянкуни миқдори маводҳои доруворие, ки ба Чумхурии Тоҷикистон ворид шудаанд: Дар конференсияи чумхурияй дармавзуи «Масъалаҳои мубрими тиб ва фарматсияи муосир: нигоҳ ба оянда». (13-ноябри соли 2018) ДМТ.

[17-М]. **Шоев Ф.Д. (Давроншозода Ф.Д.)** Натиҷаҳои VEN-таҳлил дар шуъбаи дили беморхонаи марказии н.Дангаро:/ **Ф.Д. Шоев, (Ф.Д. Давроншозода)** // Дар конференсияи чумхурияй дармавзуи «Масъалаҳои мубрими тиб ва фарматсияи муосир: Назар ба оянда». (13-ноябри соли 2018) ДМТ.

ШАРХИ МУХТАСАР

диссертатсияи Давроншозода Файзуло Давроншо дар мавзуи «Тахқиқи аминокислотаҳо ва стероидҳои таркиби мармараки мускатии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯянда» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 1.4.4 - Химияи органикӣ

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Қатъи назар аз тараққиёти босуръати химия ва ихтирои ҳазорҳо моддаҳои синтетикӣ, доруҳои аз растаниҳо ҳосилшуда то ҳол аҳамияти баланди илмӣ ва амалийдоранд. Ҷудо намудани алкалоидҳо, флавоноидҳо, витаминҳо ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ аз растаниҳо имкониятҳои васеъ барои истифодай доруҳои набототӣ фароҳам меорад. Ҳуди растаниҳо ва доруҳои аз онҳо омодашуда ба организми инсон нисбатан безарар буда таъсири хуб мерасонанд.

Садҳо намуд растаниҳо мавҷуданд, ки дорои моддаҳои фаъоли барои тиб заруранд ва метавонанд барои муолиҷаи бемориҳои гуногун истифода шаванд. Дар ин замина, набототи Тоҷикистон аҳамияти ҳоса дорад, зеро дар ҳудуди қишвар зиёда аз 5,5 ҳазор намуди растаниҳо мерӯяд. Шароити мусоиди иклимии Тоҷикистон боиси гуногунрангӣ ва бой будани таркиби растаниҳои шифобаҳши ҳудрӯй мегардад. Аксари ин намудҳо то ҳол пурра таҳқиқ нашудаанд ва дар ин самт пешорӯи олимон корҳои зиёде мавҷуданд. Манбаъҳои табиии баъзе растаниҳои шифобаҳши ватаний имкон медиҳанд, ки онҳоро ҳамчун доруҳои галениӣ ва фармасевтиӣ ба воситаи шабакаи доруҳонаҳо ба истифодаи аҳолӣ расондân мумкин бошад.

Мақсади таҳқиқот: ҷудокунии моддаҳои органикӣ аминокислотаҳо, стероидҳо аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) ва омӯзиши ҳосиятҳои фаъоли биологӣ он бо истифода аз усулҳои физико-химиявӣ.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот. ҷудокунии моддаҳои органикӣ аминокислотаҳо, стероидҳо аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) ва омӯзиши ҳосиятҳои фаъоли биологӣ он бо истифода аз усулҳои физико-химиявӣ.

Аҳамияти амалии диссертатсия: бории аввал таҳқиқоти фитохимиявии таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) гузаронида шуд.

1. Омӯзиши таркиби фитохимиявии гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии гузаронида шуд.

2. Бори аввал аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) миқдори зиёди амиокислотаҳо ва стероидҳо муйян карда шуд;

3. Дараҷаи тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) бо истифода аз усулҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ муйян карда шуд.

Мавкеъҳои асосие, ки барои ҳимоя бароварда мешаванд:

-усулҳои ҷудокарда гирифтани аминокислотаҳои ароматӣ ва стероидҳо аз таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) ва таввасути усулҳои мусоиди омуҳтани таркиб онҳо;

- муйян карданӣ миқдори қамзарҳи аминокислотаҳои ва стероидҳои таркиби мармараки мускатӣ (*Salvia sclarea* L.) ва таввасути моделҳои физико-химиявӣ муйян карданӣ ҳосиятҳои пайвастаҳои чудонамуда.

Калидвоҷаҳо: Синтези, аминокислотаҳо, алифатӣ, ароматӣ, гетроҳалқагӣ, стероидҳо, мармараки мускатӣ, реаксияи этирификатсия, 3α, 7β-дигидрокси-5β-кислотаҳои холан, доруҳо, равандҳои биохимиявӣ, стероидҳои ҷудокардашуда, зиддивирусӣ, фаъолияти биологӣ.

АННОТАЦИЯ

диссертация Давроншозода Файзулло Давроншоа на тему «исследование аминокислот и стероидов в составе шалфея мускатного, выращиваемого в Республике Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.4 – Органическая химия

Актуальность работы. Несмотря на бурное развитие химии и наличие тысяч синтетических веществ, лекарственные средства, изготовленные из растений, имеют важное значение. Выделение из растений алкалоидов, флавоноидов, витаминов и биологически активных веществ еще больше расширяет спрос на растительные лекарственные средства. Сами растения и препараты из них мягко и безвредно воздействуют на организм больного. Существуют сотни растений, которые содержат активные вещества, необходимые для медицины, и которые можно использовать для лечения различных заболеваний. Флора Таджикистана, включающая в себя свыше 5,5 тысяч видов растений, играет особую роль. Благоприятный климат республики способствует высокому разнообразию дикорастущих лекарственных растений.

Большинство этих растений до сих пор не изучены, и ученым предстоит проделать большую работу в этой области, природный источник некоторых лекарственных растений нашей Родины позволяет сделать их доступными в аптеках в качестве галенофармацевтических препаратов. Мармарак, марвак, макмак, кампиргулак – *Salvia sclarea L.* в России шалфей мускатный – многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству губоцветных.

Цель исследования: выделение органических веществ, аминокислот, стероидов из состава шалфея мускатного (*Salvia sclarea L.*) и изучение его активных биологических свойств физико-химическими методами.

Объект исследования – выделение органических веществ, аминокислот, стероидов из состава мускатного (*Salvia sclarea L.*) и изучение его активных биологических свойств физико-химическими методами.

Практическая значимость диссертации: впервые проведено фитохимическое исследование состава мускатного (*Salvia sclarea L.*).

1. Изучен фитохимический состав основных групп биологически активных веществ.

2. Впервые в составе мускатного (*Salvia sclarea L.*) определено большое количество аминокислот и стероидов;

3. Степень чистоты соединений, выделенных из состава мускатного (*Salvia sclarea L.*), определяли с помощью спектроскопических методов IS-, Macc., RMYA, TE и HMQ.

Полученный новый соединений проявляет низкую токсичность и широкую антимикробную активность в отношении штаммов стафилококков, нокардий, пастерели, коринебактерий, выделенных от животных с заболеваниями органов дыхания.

Основные позиции, которые необходимо принять для защиты:

Методы выделения ароматических аминокислот и стероидов из состава мускатного (*Salvia sclarea L.*) и изучения их состава современными методами;

Определить количество малотоксичных аминокислот и стероидов в составе мускатного (*Salvia sclarea L.*) и определить свойства выделенных соединений с помощью физико-химических моделей.

Ключевые слова: Синтез, аминокислоты, алифатические, ароматические, гетероциклические, стероиды, мускатный мрамор, реакция этерификации, 3 α , 7 β -дигидрокси-5 β -холановые кислоты, лекарственные препараты, биохимические процессы, изолированные стероиды, противовирусная, биологическая активность.

ANNOTATION

of the dissertation by Davronshoza Faizullo Davronsho entitled “Phytochemical Study of Clary Sage and Synthesis of Compounds Based on It” submitted for the degree of Candidate of Chemical Sciences in the specialty 1.4.4 – Organic Chemistry

Relevance of the work. Despite the rapid development of chemistry and the availability of thousands of synthetic substances, herbal medicines remain essential. The isolation of alkaloids, flavonoids, vitamins, and biologically active substances from plants further increases the demand for herbal remedies. The plants themselves and their preparations have a gentle and harmless effect on the patient's body. Hundreds of plants contain active substances essential for medicine and can be used to treat various ailments. The flora of Tajikistan, which includes over 5,500 plant species, plays a special role. The republic's favorable climate fosters a high species diversity of wild medicinal plants.

Most of these plants remain unstudied, and scientists have much work to do in this area. The natural sources of some medicinal plants native to our country make them available in pharmacies as galenopharmaceuticals. Marmarak, marvak, makmak, kampirgulak – *Salvia sclarea L.* (in Russia, clary sage) is a perennial herbaceous plant belonging to the mint family. Objective of the study: to isolate organic substances, amino acids, and steroids from clary sage (*Salvia sclarea L.*) and study its active biological properties using physicochemical methods.

Objective of the study: to isolate organic substances, amino acids, and steroids from clary sage (*Salvia sclarea L.*) and study its active biological properties using physicochemical methods.

Practical significance of the dissertation: This is the first phytochemical study of clary sage (*Salvia sclarea L.*).

1. The phytochemical composition of the main groups of biologically active substances was studied.

2. A large number of amino acids and steroids were identified in clary sage (*Salvia sclarea L.*) for the first time.

3. The purity of compounds isolated from *Salvia sclarea L.* was determined using IS, Mass, RMYA, TE, and HMQ spectroscopic methods.

The resulting new compounds exhibit low toxicity and broad antimicrobial activity against strains of staphylococci, nocardia, pasteurella, and corynebacteria isolated from animals with respiratory diseases.

Key points to be addressed: Methods for isolating aromatic amino acids and steroids from *Salvia sclarea L.* and studying their composition using modern methods;

Determine the amount of low-toxicity amino acids and steroids in *Salvia sclarea L.* and determine the properties of the isolated compounds using physicochemical models.

Key words: Synthesis, amino acids, aliphatic, aromatic, heterocyclic, steroids, nutmeg marble, esterification reaction, 3 α , 7 β -dihydroxy-5 β -cholanic acids, drugs, biochemical processes, isolated steroids, antiviral, biological activity.